

OFFERTA FORMATIVA DELLA SEDE DI TIROCINIO

Contesto	
<p>Tutor clinico Contatti e riferimenti</p>	<p>Nome LAURA Cognome SANDRONI Telefono 011 2402486 e-mail laura.sandroni@unito.it</p>
<p>Struttura/servizio Nominativo, ubicazione, ecc N°locali, n° posti letto, Orari apertura al pubblico, Orari di lavoro, Figure professionali</p> <p>Risorse strumentali Servizi agli studenti (mensa, biblioteca, accesso internet, ecc)</p>	<p>SC Medicina per intensità di cure 2 c/o OSG BOSCO 2° piano 30 posti letto 13-14.30 / 19-20.30 Tre turni: 7-14.35 / 14.30-22.35 / 22.25-7.10 1 CPSE – 12 CPS di cui 2 Tutor Clinici (Università Statale/Cattolica) – 11 OSS di cui 8 a t.p. – 1 Vicario – 6 Medici Geriatri – 1 amministrativo a t.p. Cartella infermieristica unica informatizzata/cartacea Terapia informatizzata Linee guida e protocolli aziendali reperibili su INTRA ASL Accesso a INTRA ASL e a Internet</p>
<p>Contatti e riferimenti</p>	<p>Indirizzo P.zza del Donatore del Sangue n. 3 Torino Telefono 011 2402486 Fax 011 2402487 e-mail geriatria.osgb@aslto2.piemonte.it</p>
<p>Come raggiungere il servizio Mappa percorso Mezzi pubblici</p>	<p>Linee 2, 4, 50, 57, 75</p>

Allegato 1

Problemi di salute / Problemi clinici / Percorso diagnostico terapeutici prevalentemente trattati

Selezionare (X) i problemi di salute prevalenti e indicare le patologie più frequenti

Disabilità, malattie ad alto grado di tutela	X
---	----------

--

Malattie Cardiovascolari	X
---------------------------------	----------

--

Malattie Cerebrovascolari	X
----------------------------------	----------

--

Malattie Endocrinologiche, metaboliche	X
---	----------

--

Malattie Intestinali / digestive	X
---	----------

--

Malattie Neuromuscolari	X
--------------------------------	----------

--

Malattie Oncologiche	X
-----------------------------	----------

--

Malattie Osteoarticolari	X
---------------------------------	----------

--

Malattie Respiratorie	X
------------------------------	----------

--

Malattie Traumatologiche / incidenti	X
---	----------

--

Allegato 2

Diagnosi Infermieristiche prevalentemente trattate

Selezionare (X) le caselle relative alle Diagnosi Infermieristiche e ai fattori correlati di interesse (riferimenti bibliografici: L.J.Carpenito-Diagnosi infermieristiche – 5th. ed. C.E.A. Edizioni, 2010)

Ansia	X
<p>Fattori correlati</p> <p>Situazionali (personali, ambientali)</p> <ul style="list-style-type: none"> X Minaccia reale o percepita all'integrità biologica (per malattia, violenza, procedure invasive, stato terminale) X Cambiamento ambientale reale o percepito (trasloco, ospedalizzazione, pensionamento, condizione di rifugiato, reclusione, calamità naturali, rischi per la sicurezza...) <p>Fasi di sviluppo</p> <ul style="list-style-type: none"> X Persona anziana: minaccia al concetto di se secondaria a perdite sensoriali, motorie, problemi finanziari, cambiamenti legati al pensionamento 	
Attività, intolleranza all'attività	X
<p>Fattori correlati</p> <p>Fisiopatologici</p> <ul style="list-style-type: none"> X Sistema cardiaco (insufficienza cardiaca, valvolare, aritmie, infarto del miocardio, cardiopatia congenita, angina) X Sistema respiratorio (bronco pneumopatia cronica ostruttiva, atelectasia, dispnea broncopolmonare) X Sistema circolatorio (anemia, ipovolemia, arteriopatia periferica) <p>Aumento del fabbisogno metabolico per</p> <ul style="list-style-type: none"> X Malattie croniche (renali, infiammatorie, neurologiche, epatiche, muscolo scheletriche) X Inadeguatezza delle fonti energetiche (per obesità, dieta inadeguata, malnutrizione) <p>Situazionali (personali, ambientali)</p> <ul style="list-style-type: none"> X Aumento del fabbisogno metabolico (per utilizzo di ausili come deambulatore /stampelle /tutori, stress, dolore, barriere ambientali come ad es. scale, estremi climatici, inquinamento dell'aria) X Inadeguata motivazione (secondaria ad utilizzo di ausili, paura di cadere, depressione, obesità, dolore, dispnea) <p>Fasi di sviluppo</p> <ul style="list-style-type: none"> X Processo di invecchiamento con diminuzione della forza e del tono muscolare, comparsa di deficit sensoriali 	
Comunicazione, compromissione e Comunicazione verbale, compromissione (incapacità a pronunciare le parole ma è in grado di comprendere)	X
<p>Fattori correlati</p> <p>Fisiopatologici</p> <ul style="list-style-type: none"> X Patologia del sistema nervoso (es miastenia grave, distrofia muscolare, malattia di Alzheimer) <p>Situazionali (personali, ambientali)</p> <ul style="list-style-type: none"> X Mandata disponibilità di apparecchio acustico o suo malfunzionamento <p>Fasi di sviluppo</p> <ul style="list-style-type: none"> X Persona anziana (perdite uditive) X Compromissione cognitiva per (specificare patologia) 	

Confusione mentale acuta	X
<p>Fattori correlati</p> <p>Fattori di rischio</p> <p>Improvvisa insorgenza di ipossia cerebrale o disturbi del metabolismo cerebrale per</p> <ul style="list-style-type: none"> X Squilibri idroelettrolitici (disidratazione, ipovolemia, acidosi/alcalosi, iper/ipo calcemia, ipopotassiemia, ipo/iper natremia, ipo/iper glicemia) X Disturbi cardiovascolari (infarto miocardio, insufficienza cardiaca congestizia, aritmie, blocco cardiaco, arterite temporale) ematoma subdurale) X Disordini respiratori (BPCO, embolia polmonare, TBC, polmonite) X Infezioni (sepsi, meningite, encefalite, infezione delle vie urinarie nell'anziano) <p>Situazionali (personali, ambientali)</p> <ul style="list-style-type: none"> X Dolore, fecaloma, immobilità, 	
Coping inefficace	X
<p>Fattori correlati</p> <p>Fisiopatologici</p> <ul style="list-style-type: none"> X Complessità del regime di autocura, variazioni neurologiche nell'encefalo (Morbo di Alzheimer, infarto cerebrale, sclerosi multipla, malattie in stadio terminale) <p>Trattamenti</p> <ul style="list-style-type: none"> X Separazione dalla famiglia e dalla casa (ospedalizzazione, ricovero in struttura sanitaria residenziale, ecc) <p>Fasi di sviluppo</p> <ul style="list-style-type: none"> X Persona anziana: inadeguatezza delle risorse psicologiche per modificazioni fisiche, reazioni degli altri verso l'anziano, pensionamento, cambiamento di residenza, di condizioni economiche 	
Cura di sé, deficit (alimentazione)	X
<p>Incapacità di (specificare):</p> <ul style="list-style-type: none"> X tagliare gli alimenti e/o aprire le confezioni X portare il cibo alla bocca 	
<p>Fattori correlati</p> <p>Trattamenti</p> <ul style="list-style-type: none"> X Uso di dispositivi esterni (apparecchio gessato, tutori ortopedici, infusione endovenosa...) <p>Situazionali (personali, ambientali)</p> <ul style="list-style-type: none"> X Deficit cognitivi X Dolore X Scarsa motivazione X Affaticamento X Confusione mentale 	

Cura di sé, deficit (bagno/igiene personale) Ridotta e/o incapacità di (specificare): <input checked="" type="checkbox"/> lavare il proprio corpo o parti <input checked="" type="checkbox"/> procurarsi l'acqua <input checked="" type="checkbox"/> regolare la temperatura o il flusso dell'acqua <input checked="" type="checkbox"/> percepire il bisogno di cure igieniche	X
Fattori correlati Fisiopatologici <input checked="" type="checkbox"/> Arti non funzionanti o mancanti Trattamenti <input checked="" type="checkbox"/> Uso di dispositivi esterni (apparecchio gessato, tutori ortopedici, infusione endovenosa...) Situazionali (personali, ambientali) <input checked="" type="checkbox"/> Deficit cognitivi <input checked="" type="checkbox"/> Dolore <input checked="" type="checkbox"/> Scarsa motivazione <input checked="" type="checkbox"/> Affaticamento <input checked="" type="checkbox"/> Confusione mentale Fasi di sviluppo <input checked="" type="checkbox"/> Diminuita capacità motoria e visiva o a debolezza muscolare	
Cura di sé, deficit (bagno/igiene personale) Ridotta e/o incapacità di (specificare): <input checked="" type="checkbox"/> mettersi o togliersi vestiti, allacciare i vestiti <input checked="" type="checkbox"/> curare il proprio aspetto <input checked="" type="checkbox"/> acquistare o cambiare capi di vestiario <input checked="" type="checkbox"/> o il flusso dell'acqua <input checked="" type="checkbox"/> percepire il bisogno di cure igieniche	X
Fattori correlati Trattamenti <input checked="" type="checkbox"/> Uso di dispositivi esterni (apparecchio gessato, tutori ortopedici, infusione endovenosa...) Situazionali (personali, ambientali) <input checked="" type="checkbox"/> Deficit cognitivi <input checked="" type="checkbox"/> Dolore <input checked="" type="checkbox"/> Scarsa motivazione <input checked="" type="checkbox"/> Affaticamento <input checked="" type="checkbox"/> Confusione mentale Fasi di sviluppo <input checked="" type="checkbox"/> Diminuita capacità motoria e visiva o a debolezza muscolare	
Cura di sé, deficit (eliminazione urinaria e fecale) Incapacità o mancanza di volontà per (specificare): <input checked="" type="checkbox"/> servirsi del gabinetto/comoda <input checked="" type="checkbox"/> trasferirsi sul gabinetto/comoda <input checked="" type="checkbox"/> eseguire pratiche igieniche adeguate <input checked="" type="checkbox"/> pulire il gabinetto o la comoda <input checked="" type="checkbox"/> sistemare gli indumenti per servirsi del gabinetto	X
Fattori correlati Trattamenti <input checked="" type="checkbox"/> Uso di dispositivi esterni (apparecchio gessato, tutori ortopedici, infusione endovenosa...) <input checked="" type="checkbox"/> Affaticamento e dolore post operatori	

<p>Situazionali (personali, ambientali)</p> <ul style="list-style-type: none"> <input checked="" type="checkbox"/> Deficit cognitivi <input checked="" type="checkbox"/> Dolore <input checked="" type="checkbox"/> Scarsa motivazione <input checked="" type="checkbox"/> Affaticamento <input checked="" type="checkbox"/> Confusione mentale <p>Fasi di sviluppo</p> <ul style="list-style-type: none"> <input checked="" type="checkbox"/> Diminuita capacità motoria e visiva o a debolezza muscolare 	
<p>Cura di sé, deficit (strumentale) Difficoltà a (specificare) X assumere i farmaci</p>	X
<p>Fattori correlati</p> <p>Trattamenti</p> <ul style="list-style-type: none"> <input checked="" type="checkbox"/> Uso di dispositivi esterni (apparecchio gessato, tutori ortopedici, infusione endovenosa...) <p>Situazionali (personali, ambientali)</p> <ul style="list-style-type: none"> <input checked="" type="checkbox"/> Deficit cognitivi <input checked="" type="checkbox"/> Dolore <input checked="" type="checkbox"/> Scarsa motivazione <input checked="" type="checkbox"/> Affaticamento <input checked="" type="checkbox"/> Confusione mentale <p>Fasi di sviluppo</p> <ul style="list-style-type: none"> <input checked="" type="checkbox"/> Diminuita capacità motoria e visiva o a debolezza muscolare 	
<p>Dolore acuto (Grave fastidio o disagio che dura da 0 a 6 mesi)</p>	X
<p>Fattori correlati</p> <p>Fisiopatologici</p> <p>Trauma tissutale e spasmi muscolari riflessi secondari a</p> <ul style="list-style-type: none"> <input checked="" type="checkbox"/> Disordini viscerali (cardiaci, renali, epatici, intestinali, polmonari) <input checked="" type="checkbox"/> Cancro <input checked="" type="checkbox"/> Disordini vascolari (vasospasmo, occlusione, flebite, vasodilatazione/cefalea) <input checked="" type="checkbox"/> Infiammazione di nervi, tendini, capsula articolare, articolazioni, muscoli, strutture articolari. <p>Situazionali (personali, ambientali)</p> <ul style="list-style-type: none"> <input checked="" type="checkbox"/> Immobilità/posizionamento inappropriato <input checked="" type="checkbox"/> Punti di pressione (es.ingessatura o bendaggio stretti) 	
<p>Dolore cronico (Continuo/ intermittente che dura da più di 6 mesi)</p>	X
<p>Fattori correlati</p> <p>Fisiopatologici</p> <p>Trauma tissutale e spasmi muscolari riflessi secondari a</p> <ul style="list-style-type: none"> <input checked="" type="checkbox"/> Disordini viscerali (cardiaci, renali, epatici, intestinali, polmonari) <input checked="" type="checkbox"/> Cancro <input checked="" type="checkbox"/> Disordini vascolari (vasospasmo, occlusione, flebite, vasodilatazione/cefalea) <input checked="" type="checkbox"/> Effetti di un tumore su (specificare) <input checked="" type="checkbox"/> Dolori addominali, diarrea, vomito secondari a gastroenterite, ulcera gastrica, influenza. <p>Situazionali (personali, ambientali)</p> <ul style="list-style-type: none"> <input checked="" type="checkbox"/> Immobilità/posizionamento inappropriato 	

Immobilizzazione, sindrome da	X
Fattori correlati Fisiopatologici X Riduzione del sensorio Trattamenti X Trazione/gesso/tutore ortopedico X Immobilità prescritta Situazionali (personali, ambientali) X Dolore Fasi di sviluppo X Persona anziana: ridotta agilità motoria, debolezza muscolare, demenza presenile	
Incontinenza fecale	X
Fattori correlati Fisiopatologici X Compromissione delle funzioni cognitive X Iperdistensione rettale per stipsi cronica	
Incontinenza urinaria da sforzo	X
Fattori correlati Fasi di sviluppo X Persona anziana: perdita di tono muscolare	
Incontinenza urinaria da urgenza	X
Fattori correlati Trattamenti X Periodo successivo a cateterismo vescicale a permanenza Fasi di sviluppo X Persona anziana: diminuita capacità vescicale	
Incontinenza urinaria funzionale	X
Fattori correlati Fisiopatologici X Diminuzione di stimoli vescicali/compromessa capacità di riconoscerli per trauma, infezione, tumore cerebrale, parkinsonismo, sclerosi multipla, neuropatia alcolica, malattie demielinizzanti, ictus cerebrale, demenza progressiva Trattamenti XRiduzione del tono vescicale per uso di antistaminici, terapia immunosoppressiva, adrenalina, diuretici, anticolinergici, tranquillanti, sedativi, miorilassanti Situazionali (personali, ambientali) X Barriere ambientali per l'accesso al bagno (gabinetto distante, letto troppo alto, scarsa illuminazione, spondine laterali, ambiente non familiare) Fasi di sviluppo X Persona anziana: perdite motorie/sensitive	

Infezione, rischio di	X
<p>Fattori correlati</p> <p>Fisiopatologici</p> <p>X Compromissione delle difese dell'ospite per cancro, malattie respiratorie, ematologiche, periodontali, malattie epatiche, artrite, diabete mellito, malattie ereditarie, AIDS, alcolismo, immunosoppressione (secondaria a- specificare)</p> <p>Situazionali (personali, ambientali)</p> <p>X Contatto con agenti contaminanti (infezioni nosocomiali o di comunità)</p> <p>Fasi di sviluppo</p> <p>X Persona anziana: maggiore vulnerabilità per diminuzione della risposta immunitaria, condizione debilitante, malattia cronica)</p>	
Insonnia	X
<p>Fattori correlati</p> <p>Fisiopatologici</p> <p>X Compromissione dell'eliminazione fecale o urinaria (per diarrea, disuria, ritenzione, incontinenza, stipsi, pollacchiuria)</p> <p>Situazionali (personali, ambientali)</p> <p>X Eccessivo dormire di giorno</p> <p>X Dolore cronico</p> <p>X Modifiche ambientali (specificare) dislocazione</p>	
Integrità mucosa orale, compromissione	X
<p>Fattori correlati</p> <p>X Inadeguata igiene orale</p> <p>X Incapacità di provvedere all'igiene orale</p>	
Lesione, rischio di	X
<p>Fattori correlati</p> <p>Fisiopatologici</p> <p>X Alterazioni delle funzioni cerebrali per ipossia (vertigini, sincope)</p> <p>X Alterazioni della mobilità (ictus cerebrale, artrite, parkinsonismo, perdita di un arto, compromissione della vista/udito)</p> <p>X Ipotensione ortostatica</p> <p>X Inadeguata consapevolezza dei rischi ambientali (confusione mentale)</p> <p>Trattamenti</p> <p>X Lungo allettamento</p> <p>X Effetti sulla mobilità/sensorio (sedativi, miorilassanti...specificare)</p> <p>X Gesso, stampelle, deambulatore, bastone</p> <p>Situazionali (personali, ambientali)</p> <p>X Ambiente non familiare (es. Ospedale)</p> <p>X Scarpe inadatte,</p> <p>X Andatura instabile</p> <p>Fasi di sviluppo</p> <p>X Persona anziana: alterata capacità di giudizio (per deficit cognitivi), stile di vita sedentario, perdita di forza muscolare</p>	

Liquidi, eccessivo volume di	X
<p>Fattori correlati</p> <p>Fisiopatologici</p> <ul style="list-style-type: none"> X Compromissione dei meccanismi regolatori (per insufficienza renale acuta/cronica, disfunzioni endocrine, anomalie sistemiche metaboliche, lipoedema) X Ipertensione portale, diminuzione della pressione colloidale-osmotica e ritenzione di sodio (per epatopatia, cancro, cirrosi, ascite) X Anomalie venose e arteriose (vene varicose, vasculopatia periferica, Trombosi, flebite, immobilità, linfoedema, infezioni, trauma, neoplasie) <p>Situazionali (personali, ambientali)</p> <ul style="list-style-type: none"> X Ristagno venoso declive/venostasi (per immobilità, prolungata stazione eretta/posizione seduta, gesso/fasciatura stretta) <p>Fasi di sviluppo</p> <ul style="list-style-type: none"> X Persona anziana: compromissione del ritorno venoso per aumento delle resistenze periferiche e diminuzione dell'efficienza valvolare 	
Liquidi, insufficiente volume di	X
<p>Fattori correlati</p> <p>Fisiopatologici</p> <ul style="list-style-type: none"> X Perdite (febbre, aumento del metabolismo, drenaggio accentuato, ferite, peritonite, diarrea, emorragia) <p>Situazionali (personali, ambientali)</p> <ul style="list-style-type: none"> X Vomito/nausea X Uso eccessivo di lassativi o clisteri, diuretici, alcol, caffeina <p>Fasi di sviluppo</p> <ul style="list-style-type: none"> X Persona anziana: aumentata vulnerabilità a ridotta riserva idrica, ridotta sensazione di sete 	
Memoria, compromissione	X
<p>Fattori correlati</p> <p>Fisiopatologici</p> <ul style="list-style-type: none"> X Alterazioni del SNC (per malattia cerebrale degenerativa, ictus cerebrale, lesione/trauma cranico) 	
Mobilità, compromissione /rischio di	X
<p>Fattori correlati</p> <p>Fisiopatologici</p> <ul style="list-style-type: none"> X edemi <p>Situazionali (personali, ambientali)</p> <ul style="list-style-type: none"> X dispnea X dolore <p>Fasi di sviluppo</p> <ul style="list-style-type: none"> X Persona anziana: diminuzione dell'agilità e debolezza muscolare 	
Mobilità nel letto, mobilità con la sedia a rotelle, compromissione /rischio Vedere mobilità, compromissione, rischio	X



Nutrizione inferiore al fabbisogno, rischio di	X
<p>Fattori correlati</p> <p>Fisiopatologici</p> <ul style="list-style-type: none"> X Disfagia (per ictus cerebrale, M.di Parkinson, palatoschisi, distrofia muscolare, paralisi cerebrale, paralisi facciale, SLA, disturbi neuromuscolari) X Diminuzione dell'appetito (per alterazioni dello stato di coscienza) X Inappetenza e diarrea (per infezione da protozoi) X Vomito, inappetenza e alterazioni della digestione (per pancreatite) <p>Situazionali (personali, ambientali)</p> <ul style="list-style-type: none"> X Incapacità di masticare (per adentulia, carie, protesi non adatta) X Diarrea 	
Respirazione, inefficace funzionalità, rischio	X
<p>Fattori correlati</p> <p>Fisiopatologici</p> <ul style="list-style-type: none"> X Secrezioni eccessive o dense (per infezione, infiammazione, allergia, patologie cardiopolmonari, fumo) 	
Stipsi	X
<p>Fattori correlati</p> <p>Trattamenti</p> <ul style="list-style-type: none"> X Effetti collaterali di farmaci (specificare) <p>Situazionali (personali, ambientali)</p> <ul style="list-style-type: none"> X Diminuzione della peristalsi (per immobilità, gravidanza, stress, mancanza di esercizio fisico) 	

Allegato 3

PROBLEMI COLLABORATIVI PRELEVALEMENTEMENTE TRATTATI
 Selezionare (X) le caselle relative ai problemi collaborativi di interesse
 (riferimenti bibliografici: L.J.Carpenito-Diagnosi infermieristiche - 5th. ed. C.E.A. Edizioni, 2010)

Rischio di complicanze (RC) per disfunzione cardiaca/ vascolare	
RC per emorragia	X
RC per aritmie	X
RC per edema polmonare	X
RC per trombosi venosa profonda	X
RC per ipovolemia	X
RC per embolia polmonare	X
Rischio di complicanze (RC) per disfunzione respiratoria	
RC per ipossiemia	X
RC per atelectasia/polmonite	X
RC per costrizione tracheobronchiale	X
RC per pneumotorace	X
Rischio di complicanze (RC) per disfunzione metabolica/immunitaria/ematopoietica	
RC per ipo/iperglicemia	X
RC per squilibri elettrolitici	X
RC per sepsi	X
RC per acidosi (metabolica, respiratoria)	X
RC per alcalosi (metabolica, respiratoria)	X
RC per infezioni opportunistiche	X
Rischio di complicanze (RC) per disfunzione renale / urinaria	
RC per ritenzione urinaria acuta	X
RC per insufficienza renale	X
Rischio di complicanze (RC) per disfunzione gastrointestinale / epatica / biliare	
RC per sanguinamento gastrointestinale	X
RC per disfunzione epatica	X
Rischio di complicanze (RC) per disfunzione muscoloscheletrica	
RC per fratture patologiche	X
Rischio di complicanze (RC) per effetti avversi (EA) della terapia farmacologica	
RC per effetti avversi della terapia con farmaci anticoagulanti	X
RC per effetti avversi della terapia con farmaci antiaritmici	X
RC per effetti avversi della terapia con farmaci antipertensivi	X
RC per effetti avversi della terapia con farmaci betabloccanti	X
RC per effetti avversi della terapia con farmaci calcioantagonisti	X
RC per effetti avversi della terapia con farmaci diuretici	X

Allegato 4

APPRENDIMENTO OFFERTO

In relazione alle diagnosi infermieristiche / problemi collaborativi sopra indicati, descrivere le opportunità formative per lo studente che caratterizzano la sede di apprendimento. Esempio: interventi assistenziali infermieristici, modelli organizzativi e/o di presa in carico assistenziale, attività di ricerca e innovazione.

Durante il tirocinio lo studente avrà l'opportunità di seguire l'intero iter della persona assistita, dalla presa in carico alla fase di dimissione comprensiva della continuità di cura. L'accesso all'unità operativa di Geriatria è riservato a pazienti che abbiano almeno 65 anni di età. Il 99% dei ricoveri avviene direttamente dal Dea e dal Mecau, il rimanente 1% possono essere trasferimenti da altri reparti interni o da altre strutture (RSA, Lungodegenze, Riabilitazioni).

Le caratteristiche dell'utenza del paziente che accede alla Geriatria sono: fragilità, poli patologia, poli farmacologia, problemi socio-sanitari, conflitti familiari, basso livello di istruzione, rischio dipendenza, rischio sindrome da immobilizzazione, rischio cadute, pazienti con patologie in acuzie e con presenza di patologie croniche, pazienti ad alto rischio di infezioni nosocomiali, paziente morente/terminale.

I pazienti ricoverati nel nostro reparto reagiscono spesso al ricovero con una fase di disorientamento; obiettivo dell'operatore e dello studente sarà quello di stimolare il paziente a orientarsi, a riprendere la propria autonomia stimolando le risorse residue tenendo conto del percorso diagnostico terapeutico, assistenziale e del setting familiare.

La comunicazione con i pazienti è resa difficoltosa dall'età avanzata, dal decadimento psicofisico, dalla presenza di patologie psicomotorie e dalle situazioni in acuzie presentate dai pazienti stessi.

Lo studente durante il tirocinio si sperimenterà nell':

- identificare i bisogni di salute dell'anziano malato in fase acuta tenendo conto dell'incidenza sulla sua salute dei seguenti fattori: ambiente fisico sociale, valori culturali, fattori demografici e condizioni economiche e sociali
- Identificare e intervenire su problemi assistenziali prioritari relativi a rischio e deficit della cura di sé, compromissione della mobilità, compromissione e rischio dell'integrità cutanea, dolore acuto e cronico, disorientamento e agitazione psicomotoria, rischio cadute, alterazione della capacità di alimentarsi, malnutrizione, disfagia, ritenzione urinaria e fecale, incontinenze, ansia e paura correlata ad ospedalizzazione, perdita di autonomia e morte.
- Identificare le strategie per la risoluzione dei problemi prioritari del paziente
- Identificare e attivare i principali interventi assistenziali nell'ambito della cura del corpo: igiene parziale e totale.
- Assistere il paziente con deficit di mobilità
- Impiegare gli ausili per la mobilità e il posizionamento della persona

- Prevenire le complicanze dell'alterazione della mobilità e dell'immobilizzazione
- Prevenire la sindrome da immobilizzazione
- Prevenire le lesioni da pressione
- Usare le scale di valutazione per il rischio di ldp,,cadute, valutazione autonomia, capacità cognitive, dolore e rischio dimissione difficile
- Utilizzare gli ausili per la prevenzione delle ldp
- Favorire le condizioni di sicurezza e gli interventi contro il rischio di cadute sia per il paziente che deambula sia per quello allettato
- Gestire gli stati di incontinenza urinaria e fecale
- Gestire gli stati di agitazione, confusione e disorientamento
- Gestire gli stati di alterazione della capacità di alimentarsi e di malnutrizione attraverso il monitoraggio degli alimenti introdotti (diaria alimentare), l'educazione alimentare e l'utilizzo di sistemi di nutrizione artificiale
- Gestire i programmi terapeutici prescritti relativamente alle principali terapie utilizzate
- gestire le apparecchiature e i dispositivi per la somministrazione delle terapie farmacologiche e nutrizionali (pompe infusionali, pompe nutrizionali, accessi venosi periferici e centrali, SNG, PEG)
- Effettuare le medicazioni dei cateteri venosi centrali e periferici
- Effettuare le medicazioni delle ldp, vascolari o di altra eziologia
- gestire i percorsi diagnostici prescritti
- Coinvolgere la p.a. e la sua famiglia nel processo di assistenza e cura favorendo la partecipazione attiva.
- Seguire l'intero percorso del paziente dall'accettazione (accoglienza) alla dimissione tenendo
Conto della continuità di cura (ritorno al domicilio o in altra struttura di sostegno)
- Conoscere e utilizzare le reti dei servizi e le modalità di accesso per la dimissione protetta
(adi, sid, sod, coca)
- Interventi assistenziali con pazienti gravemente malati o in fase terminale e accompagnamento
Alla morte (sostegno al paziente e al care giver)