



OFFERTA FORMATIVA DELLA SEDE DI TIROCINIO

Contesto	
Tutor clinico Contatti e riferimenti	Nome Nicolò Cognome Fumero Telefono 011-2402905 e-mail: nicolo.fumero@unito.it
Struttura/servizio Nominativo, ubicazione, ecc N°locali, n° posti letto, Orari apertura al pubblico, Orari di lavoro, Figure professionali Risorse strumentali Servizi agli studenti (mensa, biblioteca, accesso internet, ecc)	Medicina per intensità di cure 2 (8° piano) 12.30 – 21.30 7.00 -14.42; 14.22- 22.30; 22.25- 7.10 Medici, infermieri, OSS Elettrocardiografo, ecografo, ausili per la mobilitazione Accesso ad internet per studenti
Contatti e riferimenti	Indirizzo: Piazza del Donatore di Sangue n.3 Telefono: 011 2402905
Come raggiungere il servizio Mappa percorso Mezzi pubblici	Da Corso Giulio Cesare, svoltare per via Sempione o per via Porpora, fino ad arrivare in Piazza del Donatore di Sangue 3 Autobus di linea n. 50 – 27 – 2 – 75 Tram n. 4



Allegato 1

Problemi di salute / Problemi clinici/ Percorso diagnostico terapeutici prevalentemente trattati

Selezionare (X) i problemi di salute prevalenti e indicare le patologie più frequenti

Malattie Cardiovascolari	X
SCOMPENSO CARDIACO, TVP, TEP	
Malattie Intestinali / digestive	X
DIVERTICOLOSI DEL COLON, MORBO DI CHRON, CIRROSI EPATICA	
Malattie Respiratorie	X
BPCO; INSUFFICIENZA RESPIRATORIA, POLMONITI, VERSAMENTI PLEURICI	
Malattie Cerebrovascolari	X
ICTUS IN FASE POST ACUTA	
Malattie Endocrinologiche, metaboliche	X
DIABETE MELLITO, PANCREATITE	
Malattie Infettive	X
INFEZIONE DA CLOSTRIDIUM DIFFICILE E KLEBSIELLA PNEUMONIE	
Malattie Nefrologiche, genito/urinarie	X
INSUFFICIENZA RENALE CRONICA	
Malattie Neuromuscolari	X
MORBO DI PARKINSON	
Malattie Oncologiche	X
CARCINOMA POLMONARE, INTESTINALE, GASTRICO, OVARICO, PROSTATICO, MAMMARIO, EPATICO	
Salute mentale	X
DEMENZA SENILE, MORBO DI ALZHEIMER	



Allegato 2

Diagnosi Infermieristiche prevalentemente trattate

Selezionare (X) le caselle relative alle Diagnosi Infermieristiche e ai fattori correlati di interesse (riferimenti bibliografici: L.J. Carpenito-Diagnosi infermieristiche – 5th. ed. C.E.A. Edizioni, 2010)

Ansia	X
<p>Fattori correlati</p> <p>Fisiopatologici</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> X Qualsiasi fattore che interferisca con i bisogni relativi ad alimentazione, respirazione, comfort, sicurezza</p> <p>Situazionali (personali, ambientali)</p> <p><input type="checkbox"/> Minaccia reale o percepita al concetto di sé (fallimento, modificazione dello status, mancato riconoscimento da parte degli altri...)</p> <p><input type="checkbox"/> Perdita reale o percepita di persone significative</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> X Minaccia reale o percepita all'integrità biologica (per malattia, violenza, procedure invasive, stato terminale)</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> X Cambiamento ambientale reale o percepito (trasloco, ospedalizzazione, pensionamento, condizione di rifugiato, reclusione, calamità naturali, rischi per la sicurezza...)</p> <p><input type="checkbox"/> Cambiamento reale o percepito delle condizioni socioeconomiche (disoccupazione, cambiamento di lavoro, licenziamento, promozione)</p> <p>Fasi di sviluppo</p> <p><input type="checkbox"/> Neonato/bambino: separazione, ambiente e persone sconosciuti, variazioni dei rapporti con coetanei, morte di (specificare) con rituali non familiari e adulti in lutto</p> <p><input type="checkbox"/> Adolescente: morte di (specificare), minaccia del concetto di sé correlato a sviluppo sessuale, variazione dei rapporti con coetanei</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> X Adulto: minaccia al concetto di sé per gravidanza, ruolo genitoriale, cambiamento di carriera, effetti dell'invecchiamento, complicanze di una precedente gravidanza, aborto, o morte del feto, insufficiente conoscenza dell'esperienza del travaglio</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> X Persona anziana: minaccia al concetto di sé secondaria a perdite sensoriali, motorie, problemi finanziari, cambiamenti legati al pensionamento</p>	
Aspirazione, rischio di	X
<p>Fattori correlati</p> <p>Fisiopatologici</p> <p><input type="checkbox"/> Riduzione del livello di coscienza (per demenza pre-senile, trauma cranico, ictus cerebrale, M.di Parkinson, induzione da alcol/sostanze, coma, convulsioni, anestesia)</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> X Depressione dei riflessi della tosse/faringeo</p> <p><input type="checkbox"/> Ritardato svuotamento gastrico (per ostruzione intestinale, sindrome da reflusso, ileo)</p> <p><input type="checkbox"/> Aumento della pressione gastrica (per posizione ginecologica, ascite, obesità, dilatazione uterina)</p> <p><input type="checkbox"/> Compromissione della deglutizione o diminuzione dei riflessi laringeo/glottico (per acalasia, condizioni debilitanti, miastenia grave, catatonìa, Mdi Parkinson, stenosi esofagea, ictus cerebrale, sclerosi multipla, sclerodermia, distrofia muscolare, sindrome di Guillain Barrè)</p> <p><input type="checkbox"/> Fistola tracheo-esofagea</p> <p><input type="checkbox"/> Compromissione dei riflessi protettivi (chirurgia o trauma facciale/orale/del collo, paraplegia/emiplegia)</p> <p>Trattamenti</p>	



<input checked="" type="checkbox"/> X Depressione dei riflessi laringeo/glottico (per tracheostomia/trachetomia, sedazione, nutriz. enterale) <input type="checkbox"/> Compromissione della capacità di tossire (per immobilizzazione della mandibola, posizione prona) Situazionali (personali, ambientali) <input type="checkbox"/> X Incapacità/difficoltà di sollevare la parte superiore del corpo <input type="checkbox"/> Assunzione di alimenti in corso di intossicazione Fasi di sviluppo <input type="checkbox"/> Prematuro: compromissione dei riflessi di suzione/deglutizione <input type="checkbox"/> Neonato: riduzione del tono muscolare dello sfintere esofageo inferiore <input checked="" type="checkbox"/> X Persona anziana: dentizione inadeguata

Attività, intolleranza all'attività	X
Fattori correlati Fisiopatologici Compromissione del sistema di apporto di ossigeno per <input checked="" type="checkbox"/> X Sistema cardiaco (insufficienza cardiaca, valvolare, aritmie, infarto del miocardio, cardiopatia congenita, angina) <input checked="" type="checkbox"/> X Sistema respiratorio (bronco pneumopatia cronica ostruttiva, atelectasia, dispnea broncopolmonare) <input checked="" type="checkbox"/> X Sistema circolatorio (anemia, ipovolemia, arteriopatia periferica) Aumento del fabbisogno metabolico per <input type="checkbox"/> Infezioni acute o croniche (virali, epatite, mononucleosi, disordini endocrini/ metabolici) <input checked="" type="checkbox"/> X Malattie croniche (renali, infiammatorie, ,neurologiche, epatiche,, muscolo scheletriche) <input checked="" type="checkbox"/> X Inadeguatezza delle fonti energetiche (per obesità, dieta inadeguata, malnutrizione) Trattamenti <input checked="" type="checkbox"/> X Aumento del fabbisogno metabolico (pertumore maligno, intervento chirurgico, indagini diagnostiche, orario e frequenza trattamenti) <input checked="" type="checkbox"/> X Compromissione del trasporto dell'ossigeno (per ipovolemia, prolungato riposo a letto) Situazionali (personali, ambientali) <input type="checkbox"/> XInattività (secondaria a depressione, mancanza di motivazione, stile di vita sedentario,insufficiente conoscenza) <input type="checkbox"/> Aumento del fabbisogno metabolico (per utilizzo di ausili come deambulatore /stampelle /tutori, stress, dolore, barriere ambientali come ad es. scale, estremi climatici, inquinamento dell'aria) <input type="checkbox"/> Inadeguata motivazione (secondaria ad utilizzo di ausili, paura di cadere, depressione, obesità, dolore, dispnea) Fasi di sviluppo <input checked="" type="checkbox"/> XProcesso di invecchiamento con diminuzione della forza e del trofismo muscolare, comparsa di deficit sensoriali	

Autostima, Disturbo/Rischio di	X
Fattori correlati Fisiopatologici <input checked="" type="checkbox"/> X Variazione dell'aspetto (per perdita di parti del corpo, di una o più funzioni organiche) <input type="checkbox"/> Deturpazione <input type="checkbox"/> Squilibri biochimici, neurofisiologici Situazionali (personali, ambientali)	



- Bisogno di dipendenza non soddisfatto
- Senso di abbandono (per morte di una persona significativa, rapimento/uccisione di un figlio, separazione da una persona significativa)
- Senso di fallimento (per perdita del lavoro/incapacità di lavorare, problemi economici, liti coniugali, parenti acquisiti, aumento/diminuzione del peso, separazione, disoccupazione, problemi relazionali, patrigno/matrigna)
- Aggressione subita personalmente o di altra persona della stessa età / comunità
- Insuccesso scolastico
- Relazione inefficace con i propri genitori
- Relazioni abusive
- Aspettative irrealistiche verso di se o verso i propri genitori/figli
- Rifiuto da parte dei genitori, punizioni incoerenti, abbandono o insuccesso correlato a istituzionalizzazione
- Storia di numerosi insuccessi

Fasi di sviluppo

- Neonato/bambino in età prescolare: mancanza di stimoli e vicinanza emotiva, separazione dai genitori/altre persone significative, valutazione costantemente negativa da parte dei genitori, inadeguato sostegno da parte dei genitori, incapacità di fidarsi di altre persone
- Età scolare: insuccesso scolastico, perdita del gruppo dei coetanei, ripetuti feedback negativi)
- Adolescente: perdita di autonomia/indipendenza per (specificare), rottura di relazioni con coetanei/amici, problemi scolastici, perdita di altre persona significative
- Adulto: per modificazioni associate a invecchiamento
- Persona anziana: per perdita di persone, funzioni, economiche, pensionamento

Cadute, rischio

Vedere lesione, rischio

X

Caregiver, tensione nel ruolo di /Rischio di

X

Fattori correlati

Fisiopatologici

- X Esigenza di assistenza continua/ complessa (per condizioni debilitanti acute/progressive, tossicodipendenza, malattia dal decorso imprevedibile, demenza progressiva, malattia mentale cronica, disabilità)

Trattamenti

- Responsabilità assistenziali legate per tutto l'arco delle 24 ore o assistenza che richiede tempo (dialisi, trasporto)

Situazionali (personali, ambientali)

- Aspettative non realistiche dell'assistito nei confronti del caregiver
- Modello di coping inefficace
- Salute fisica compromessa
- Relazioni inadeguate o disfunzioni familiari
- X Durata dell'assistenza richiesta
- Isolamento
- Pause di riposo/svago insufficienti o
- Risorse economiche insufficienti
- Assenza o non disponibilità di sostegno

Fasi di sviluppo



- | |
|---|
| <input type="checkbox"/> Esigenza di assistenza continua secondaria a disabilità mentali (specificare) o disabilità fisiche (specificare) |
|---|

Comunicazione, compromissione e	X
Comunicazione verbale, compromissione	X
(incapacità a pronunciare le parole ma è in grado di comprendere)	

Fattori correlati

Fisiopatologici

- Pensieri disordinati e non realistici secondari a schizofrenia, delirio, psicosi, paranoia
- Alterazione della funzionalità motoria dei muscoli del linguaggio
- Ischemia del lobo frontale temporale (per ictus cerebrale, trauma orale o facciale, danno cerebrale congenito, trauma cranico, depressione del SNC, ipertensione endocranica, tumore della testa/collo/midollo spinale, ipossia cronica, riduzione della circolazione cerebrale.
- Patologia del sistema nervoso (es miastenia grave, distrofia muscolare, malattia di Alzheimer)
- Paralisi delle corde vocali, tetraplegia
- Compromissione della capacità di produrre il linguaggio (per compromissione respiratoria, dispnea, edema, infezione della laringe, deformità del cavo orale, labio/palatoschisi, mal occlusione o frattura mascellare, adentulia, disartria)

Trattamenti

- Compromissione della capacità di produrre il linguaggio (per intubazione endotracheale, tracheotomia, tracheostomia, laringectomia, intervento chirurgico cranico, al viso, al collo, alla bocca, dolore alla bocca o faringeo, depressione cognitiva da farmaci deprimenti il SNC/anestetici)

Situazionali (personali, ambientali)

- Diminuita attenzione (per affaticamento collera, ansia, o dolore)
- Mandata disponibilità di apparecchio acustico o suo malfunzionamento
- Barriere psicologiche (paura, timidezza)
- Mancanza di riservatezza
- Barriera linguistica (non disponibilità di interprete)

Fasi di sviluppo

- Bambino (inadeguata stimolazione sensoriale)
- Persona anziana (perdite uditive)
- Compromissione cognitiva per (specificare patologia)

Concetto di se, disturbo del	X
-------------------------------------	----------

Fattori correlati

Fisiopatologici

- Variazioni dell'aspetto, dello stile di vita, di un ruolo o delle risposte altrui (per malattia cronica, dolore, trauma grave, perdita parti del corpo / funzioni organiche)

Situazionali (personali, ambientali)

- Senso di abbandono/fallimento secondario a perdita del lavoro/della capacità di lavorare, divorzio, separazione o perdita di persona significativa
- Immobilità o perdita di funzioni
- Rapporti insoddisfacenti parentali /coniugali
- Preferenze sessuali
- Gravidanza nel corso dell'adolescenza
- Differenza di sesso nell'educazione dei figli
- Esperienze di violenza da parte dei genitori



<input type="checkbox"/> Cambiamento del consueto modello di responsabilità Fasi di sviluppo <input type="checkbox"/> Età di mezzo (perdita di ruoli/responsabilità) <input checked="" type="checkbox"/> X Persona anziana (perdita di ruoli/responsabilità)
--

Confusione mentale acuta	X
Fattori correlati Fattori di rischio Improvvisa insorgenza di ipossia cerebrale o disturbi del metabolismo cerebrale per <ul style="list-style-type: none"> <input checked="" type="checkbox"/> X Squilibri idroelettrolitici (disidratazione, ipovolemia, acidosi/alcalosi, iper/ipo calcemia, ipopotassiemia, ipo/ipernatremia, ipo/iperglicemia) <input checked="" type="checkbox"/> X Deficit nutrizionali (folati, vitamina B12, anemia, deficit niacina, deficit magnesio) <input checked="" type="checkbox"/> X Disturbi cardiovascolari (infarto miocardio, insufficienza cardiaca congestizia, aritmie, blocco cardiaco, arterite temporale, ematoma subdurale) <input checked="" type="checkbox"/> X Disturbi respiratori (BPCO, embolia polmonare, TBC, polmonite) <input type="checkbox"/> Infezioni (sepsi, meningite, encefalite, infezione delle vie urinarie nell'anziano) <input checked="" type="checkbox"/> X Disturbi metabolici ed endocrini (iper/ipo tiroidismo, disfunzione ipofisaria, disturbi paratiroidei, del corticosurrene, ipotensione posturale, insufficienza epatica o renale) <input type="checkbox"/> Disturbi del SNC (ictus cerebrale, idrocefalo normoteso, infarti multipli cerebrali, tumore, trauma cranico, crisi convulsive e stati post convulsivi) Trattamenti <ul style="list-style-type: none"> <input checked="" type="checkbox"/> X Disturbo del metabolismo cerebrale per intervento chirurgico, intossicazione da farmaci, anestesia generale, astinenza da alcol, sedativi/ipnotici, metalli pesanti, monossido di carbonio, effetti collaterali dei farmaci (neurolettici/narcotici, anestesia generale, effetti collaterali da farmaci come diuretici, digitale, propanololo, atropina, ipoglicemizzanti, barbiturici, litio, fenitoina, acyclovir, anticolinergici, ecc) Situazionali (personali, ambientali) <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Disturbo del metabolismo cerebrale per astinenza da alcool, sedativi, ipnotici, intossicazione da metalli pesanti o da monossido di carbonio. <input checked="" type="checkbox"/> X Dolore, fecaloma, immobilità, <input checked="" type="checkbox"/> X Depressione, situazioni non familiari <input type="checkbox"/> Intossicazioni chimiche o da farmaci (cocaina, eroina, metanfetamine, metadone, altri stupefacenti...) 	

Contaminazione, rischio di (della persona, della comunità, della famiglia)	X
Fattori correlati Fisiopatologici <ul style="list-style-type: none"> <input checked="" type="checkbox"/> X Presenza di batteri, virus, tossine <input checked="" type="checkbox"/> X Fattori nutrizionali (obesità, deficienze di vitamine e sali minerali) <input checked="" type="checkbox"/> X Stati patologici pre-esistenti <input type="checkbox"/> Genere <input type="checkbox"/> Storia di fumo Trattamenti <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Vaccinazioni recenti <input type="checkbox"/> Insufficiente o nessun uso di del protocollo di decontaminazione <input type="checkbox"/> Indumenti protettivi inappropriati o non utilizzati Situazionali (personali, ambientali)	



<input type="checkbox"/> Alluvioni, terremoti, disastri naturali. <input type="checkbox"/> Perdite rete fognaria <input type="checkbox"/> Emissioni da impianti industriali: scarichi intenzionali o accidentali di contaminanti da locali commerciali o industriali, inquinamento delle falde acquifere <input type="checkbox"/> Fattori fisici: condizioni climatiche, area geografica <input type="checkbox"/> Fattori sociali: sovraffollamento carenza servizi igienici, povertà, inadeguate pratiche di igiene personale o della casa, mancato accesso all'assistenza sanitaria <input type="checkbox"/> Fattori biologici: presenza di vettori (zanzare, zecche, roditori) <input type="checkbox"/> Bioterrorismo <input type="checkbox"/> Tipo di lavoro <input type="checkbox"/> Pratiche dietetiche <input type="checkbox"/> Contaminazione accidentale o intenzionale di riserve alimentari o idriche <input type="checkbox"/> Esposizioni concomitanti a metalli pesanti, sostanze chimiche, inquinanti atmosferici, radiazioni Fasi di sviluppo <input type="checkbox"/> Caratteristiche evolutive dei bambini <input type="checkbox"/> Bambini di età inferiore a 5 anni <input type="checkbox"/> Persone anziane <input type="checkbox"/> Età gestazionale durante l'esposizione

Coping inadeguato della famiglia	X
Fattori correlati Biofisiopatologici <input checked="" type="checkbox"/> X Compromissione della capacità di esercitare la responsabilità di ruolo per malattia acuta/cronica Situazionali (personali, ambientali) <input type="checkbox"/> Compromissione della capacità di gestire in modo costruttivo gli agenti stressanti (per dipendenza da sostanze, scarsa autostima, alcolismo, storia di relazioni inefficaci con i propri genitori, modelli di ruolo negativi, storia di relazioni abusive) <input type="checkbox"/> Aspettative non realistiche dei genitori nei confronti di se stessi/dei figli <input type="checkbox"/> Aspettative non realistiche dei figli nei confronti di se stessi/dei genitori <input type="checkbox"/> Bisogni psicosociali non soddisfatti dai genitori / dai figli	

Cura di sé, deficit (alimentazione)	X
Incapacità di (specificare): <input checked="" type="checkbox"/> X tagliare gli alimenti e/o aprire le confezioni <input checked="" type="checkbox"/> X portare il cibo alla bocca	
Fattori correlati Fisiopatologici <input type="checkbox"/> Mancanza di coordinazione motoria per (specificare) <input type="checkbox"/> Spasticità o flaccidità per (specificare) <input type="checkbox"/> Debolezza muscolare per (specificare) <input type="checkbox"/> Paralisi per (specificare) <input type="checkbox"/> Atrofia per (specificare) <input type="checkbox"/> Contratture muscolari per (specificare) <input checked="" type="checkbox"/> X Stato comatoso <input checked="" type="checkbox"/> X Disturbi visivi	



- Arti non funzionanti o mancanti
- Regressione a un precedente stadio di sviluppo
- Comportamenti ritualistici
- Deficit somatici

Trattamenti

- X Uso di dispositivi esterni (apparecchio gessato, tutori ortopedici, infusione endovenosa...)
- Affaticamento e dolore post operatori

Situazionali (personali, ambientali)

- X Deficit cognitivi
- X Dolore
- Scarsa motivazione
- X Affaticamento
- X Confusione mentale
- Ansia che paralizza

Fasi di sviluppo

- X Diminuita capacità motoria e visiva o a debolezza muscolare

Cura di sé, deficit (bagno/igiene personale)

Ridotta e/o incapacità di (specificare):

- X lavare il proprio corpo o parti
- X procurarsi l'acqua
- X regolare la temperatura o il flusso dell'acqua
- X percepire il bisogno di cure igieniche

X

Fattori correlati

Fisiopatologici

- Mancanza di coordinazione motoria per (specificare)
- Spasticità o flaccidità per (specificare)
- Debolezza muscolare per (specificare)
- Paralisi per (specificare)
- Atrofia per (specificare)
- Contratture muscolari per (specificare)
- X Stato comatoso
- X Disturbi visivi
- Arti non funzionanti o mancanti
- Regressione a un precedente stadio di sviluppo
- Comportamenti ritualistici
- Deficit somatici

Trattamenti

- X Uso di dispositivi esterni (apparecchio gessato, tutori ortopedici, infusione endovenosa...)
- Affaticamento e dolore post operatori

Situazionali (personali, ambientali)

- X Deficit cognitivi
- X Dolore
- Scarsa motivazione
- X Affaticamento



<input type="checkbox"/> X Confusione mentale <input type="checkbox"/> Ansia che paralizza Fasi di sviluppo <input type="checkbox"/> X Diminuita capacità motoria e visiva o a debolezza muscolare
--

Cura di sé, deficit (bagno/igiene personale) Ridotta e/o incapacità di (specificare): <input type="checkbox"/> X mettersi o togliersi vestiti, allacciare i vestiti <input type="checkbox"/> X curare il proprio aspetto <input type="checkbox"/> X acquistare o cambiare capi di vestiario <input type="checkbox"/> o il flusso dell'acqua <input type="checkbox"/> X percepire il bisogno di cure igieniche	X
---	----------

<p>Fattori correlati</p> <p>Fisiopatologici</p> <input type="checkbox"/> Mancanza di coordinazione motoria per (specificare) <input type="checkbox"/> Spasticità o flaccidità per (specificare) <input type="checkbox"/> Debolezza muscolare per (specificare) <input type="checkbox"/> Paralisi per (specificare) <input type="checkbox"/> Atrofia per (specificare) <input type="checkbox"/> Contratture muscolari per (specificare) <input type="checkbox"/> X Stato comatoso <input type="checkbox"/> X Disturbi visivi <input type="checkbox"/> Arti non funzionanti o mancanti <input type="checkbox"/> Regressione a un precedente stadio di sviluppo <input type="checkbox"/> Comportamenti ritualistici <input type="checkbox"/> Deficit somatici <p>Trattamenti</p> <input type="checkbox"/> X Uso di dispositivi esterni (apparecchio gessato, tutori ortopedici, infusione endovenosa...) <input type="checkbox"/> Affaticamento e dolore post operatori <p>Situazionali (personali, ambientali)</p> <input type="checkbox"/> X Deficit cognitivi <input type="checkbox"/> X Dolore <input type="checkbox"/> Scarsa motivazione <input type="checkbox"/> X Affaticamento <input type="checkbox"/> X Confusione mentale <input type="checkbox"/> Ansia che paralizza <p>Fasi di sviluppo</p> <input type="checkbox"/> X Diminuita capacità motoria e visiva o a debolezza muscolare



<p>Cura di sé, deficit (eliminazione urinaria e fecale) Incapacità o mancanza di volontà per (specificare):</p> <ul style="list-style-type: none"> <input checked="" type="checkbox"/> X servirsi del gabinetto/comoda <input checked="" type="checkbox"/> X trasferirsi sul gabinetto/comoda <input checked="" type="checkbox"/> X eseguire pratiche igieniche adeguate <input checked="" type="checkbox"/> X pulire il gabinetto o la comoda <input checked="" type="checkbox"/> X sistemare gli indumenti per servirsi del gabinetto 	X
<p>Fattori correlati</p> <p>Fisiopatologici</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Mancanza di coordinazione motoria per (specificare) <input type="checkbox"/> Spasticità o flaccidità per (specificare) <input type="checkbox"/> Debolezza muscolare per (specificare) <input type="checkbox"/> Paralisi per (specificare) <input type="checkbox"/> Atrofia per (specificare) <input type="checkbox"/> Contratture muscolari per (specificare) <input type="checkbox"/> X Stato comatoso <input type="checkbox"/> X Disturbi visivi <input type="checkbox"/> Arti non funzionanti o mancanti <input type="checkbox"/> Regressioni a un precedente stadio di sviluppo <input type="checkbox"/> Comportamenti ritualistici <input type="checkbox"/> Deficit somatici <p>Trattamenti</p> <ul style="list-style-type: none"> <input checked="" type="checkbox"/> X Uso di dispositivi esterni (apparecchio gessato, tutori ortopedici, infusione endovenosa...) <input type="checkbox"/> Affaticamento e dolore post operatori <p>Situazionali (personali, ambientali)</p> <ul style="list-style-type: none"> <input checked="" type="checkbox"/> X Deficit cognitivi <input checked="" type="checkbox"/> X Dolore <input type="checkbox"/> Scarsa motivazione <input type="checkbox"/> X Affaticamento <input type="checkbox"/> X Confusione mentale <input type="checkbox"/> Ansia che paralizza <p>Fasi di sviluppo</p> <ul style="list-style-type: none"> <input checked="" type="checkbox"/> X Diminuita capacità motoria e visiva o a debolezza muscolare 	



<p>Cura di sé, deficit (strumentale) Difficoltà a (specificare)</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> usare il telefono <input type="checkbox"/> accedere ai mezzi di trasporto <input type="checkbox"/> lavare e stirare <input type="checkbox"/> preparare i pasti <input type="checkbox"/> fare la spesa <input type="checkbox"/> gestire il denaro <input checked="" type="checkbox"/> X assumere i farmaci 	X
<p>Fattori correlati</p> <p>Fisiopatologici</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Mancanza di coordinazione motoria per (specificare) <input type="checkbox"/> Spasticità o flaccidità per (specificare) <input type="checkbox"/> Debolezza muscolare per (specificare) <input type="checkbox"/> Paralisi per (specificare) <input type="checkbox"/> Atrofia per (specificare) <input type="checkbox"/> Contratture muscolari per (specificare) <input type="checkbox"/> X Stato comatoso <input type="checkbox"/> X Disturbi visivi <input type="checkbox"/> Arti non funzionanti o mancanti <input type="checkbox"/> Regressione a un precedente stadio di sviluppo <input type="checkbox"/> Comportamenti ritualistici <input type="checkbox"/> Deficit somatiformi <p>Trattamenti</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> X Uso di dispositivi esterni (apparecchio gessato, tutori ortopedici, infusione endovenosa...) <input type="checkbox"/> Affaticamento e dolore post operatori <p>Situazionali (personali, ambientali)</p> <ul style="list-style-type: none"> <input checked="" type="checkbox"/> X Deficit cognitivi <input checked="" type="checkbox"/> X Dolore <input type="checkbox"/> Scarsa motivazione <input type="checkbox"/> X Affaticamento <input type="checkbox"/> X Confusione mentale <input type="checkbox"/> Ansia che paralizza <p>Fasi di sviluppo</p> <ul style="list-style-type: none"> <input checked="" type="checkbox"/> X Diminuita capacità motoria e visiva o a debolezza muscolare 	

<p>Deambulazione, compromissione, rischio Vedere mobilità, compromissione, rischio</p>	X
---	----------



Deglutizione, compromissione	X
<p>Fattori correlati</p> <p>Fisiopatologici</p> <ul style="list-style-type: none"> <input checked="" type="checkbox"/> X Diminuzione/assenza del riflesso faringeo, difficoltà di masticazione e riduzione della sensibilità (per paralisi cerebrale, miastenia grave, botulismo, M.di Parkinson, tumore cerebrale, danno cerebrale, distrofia muscolare, S. di Guillain Barrè, poliomielite, SLA, ictus cerebrale, danno nervi cranici) <input checked="" type="checkbox"/> X Tumore / edema tracheo-esofageo <input checked="" type="checkbox"/> X Irritazione della cavità orofaringea <input checked="" type="checkbox"/> X Diminuzione della salivazione <p>Trattamenti</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Ricostruzione chirurgica della bocca/faringe/mandibola/naso <input type="checkbox"/> Riduzione della coscienza per anestesia <input checked="" type="checkbox"/> X Ostruzione meccanica secondaria a cannula tracheostomica <input type="checkbox"/> Esofagite da radioterapia <p>Situazionali (personali, ambientali)</p> <ul style="list-style-type: none"> <input checked="" type="checkbox"/> X Alterazione del livello di coscienza <input checked="" type="checkbox"/> X Fatigue <p>Fasi di sviluppo</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Bambino: diminuzione della sensibilità e difficoltà di masticazione, scarsa coordinazione tra suzione/deglutizione/respirazione <input checked="" type="checkbox"/> X Persona anziana: riduzione della salivazione o del gusto 	

Dolore acuto (Grave fastidio o disagio che dura da 0 a 6 mesi)	X
<p>Fattori correlati</p> <p>Fisiopatologici</p> <p>Trauma tissutale e spasmi muscolari riflessi secondari a</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Disordini muscolo scheletrici (fratture, artrite, contrattura muscolare, spasmi, patologia a carico del midollo spinale) <input type="checkbox"/> Disordini viscerali (cardiaci, renali, epatici, intestinali, polmonari) <input checked="" type="checkbox"/> X Cancro <input type="checkbox"/> Disordini vascolari (vasospasmo, occlusione, flebite, vasodilatazione/cefalea) <input type="checkbox"/> Infiammazione di nervi, tendini, capsula articolare, articolazioni, muscoli, strutture articolari. <input type="checkbox"/> Fatigue, malessere o prurito secondari a malattie infettive (rosolia, pancreatite, epatite, mononucleosi, varicella) <input type="checkbox"/> Effetti di un tumore su (specificare) <input type="checkbox"/> Dolori addominali, diarrea, vomito secondari a gastroenterite, ulcera gastrica, influenza. <input type="checkbox"/> Infiammazione e spasmi della muscolatura liscia per calcoli renali, infezioni gastrointestinali <input type="checkbox"/> Dolori durante il travaglio / parto, ingorgo mammario <p>Trattamenti</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Trauma tissutale e spasmi muscolari riflessi (per intervento chirurgico, ustione, indagini diagnostiche/venipuntura/biopsia, scansiomertria invasiva) <input type="checkbox"/> Per nausea e vomito secondari a chemioterapia, anestesia, effetti collaterali (specificare) <p>Situazionali (personali, ambientali)</p> <ul style="list-style-type: none"> <input checked="" type="checkbox"/> X Febbre <input checked="" type="checkbox"/> X Immobilità/posizionamento inappropriato <input type="checkbox"/> Iperattività 	



- Punti di pressione (es.ingessatura o bendaggio stretti)
- Risposta allergica
- Irritanti chimici
- Bisogno di dipendenza non soddisfatto
- X Ansia grave e repressa

Fasi di sviluppo

Trauma tissutale e spasmi muscolari riflessi secondari a

- 1 anno: coliche
- Prima infanzia: dentizione, otalgia
- Media infanzia: dolore addominale ricorrente, dolori della crescita
- Adolescenza: cefalea, dolore toracico, dismenorrea.

Dolore cronico (Continuo/ intermittente che dura da più di 6 mesi)

X

Fattori correlati

Fisiopatologici

Trauma tissutale e spasmi muscolari riflessi secondari a

- Disordini muscolo scheletrici (fratture, artrite, contrattura muscolare, spasmi, patologia a carico del midollo spinale)
- Disordini viscerali (cardiaci, renali, epatici, intestinali, polmonari)
- Cancro
- Disordini vascolari (vasospasmo, occlusione, flebite, vasodilatazione/cefalea)
- Infiammazione di nervi, tendini, capsula articolare, articolazioni, muscoli, strutture articolari.
- Fatigue, malessere o prurito secondari a malattie infettive (rosolia, pancreatite, epatite, mononucleosi, varicella)
- Effetti di un tumore su (specificare)
- Dolori addominali, diarrea, vomito secondari a gastroenterite, ulcera gastrica, influenza.
- Infiammazione e spasmi della muscolatura liscia per calcoli renali, infezioni gastrointestinali
- Dolori durante il travaglio / parto, ingorgo mammario

Trattamenti

- Trauma tissutale e spasmi muscolari riflessi (per intervento chirurgico, ustione, indagini diagnostiche/venipuntura/biopsia, scansiomertria invasiva)
- Per nausea e vomito secondari a chemioterapia, anestesia, effetti collaterali (specificare)

Situazionali (personali, ambientali)

- X Febbre
- X Immobilità/posizionamento inappropriato
- Iperattività
- Punti di pressione (es.ingessatura o bendaggio stretti)
- Risposta allergica
- Irritanti chimici
- Bisogno di dipendenza non soddisfatto
- Ansia grave e repressa



Eliminazione urinaria compromessa	X
<p>Per Incontinenza urinaria (specificare):</p> <ul style="list-style-type: none"> <input checked="" type="checkbox"/> X Totale (continua, senza presenza di distensione della vescica e/o ritenzione di urine) <input checked="" type="checkbox"/> X Da sforzo (perdita involontaria di urine per aumento della pressione addominale) <input checked="" type="checkbox"/> X Da urgenza (perdita involontaria di urine per urgenza minzionale) <input checked="" type="checkbox"/> X Funzionale (per incapacità di raggiungere in tempo il gabinetto) <input checked="" type="checkbox"/> X Riflessa (senza sensazione di pienezza vescicale o urgenza minzionale) <input checked="" type="checkbox"/> X Da rigurgito (presenza di distensione della vescica e/o ritenzione di urine) 	
<p>Fattori correlati</p> <p>Fisiopatologici</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Anomalie congenite delle vie urinarie <input checked="" type="checkbox"/> X Diminuita capacità vescicale/irritazione vescicale (per infezione, glicosuria, carcinoma, uretrite, trauma) <input checked="" type="checkbox"/> X Diminuzione dei segnali vescicali o del loro riconoscimento (per infezioni/tumori/lesioni midollo spinale, neuropatia alcolica e/o diabetica, malattie demielinizzanti, ictus cerebrale, parkinsonismo, sclerosi multipla, farmaci alfa adrenergici) <p>Trattamenti</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Effetti di intervento chirurgico sullo sfintere vescicale (prostatectomia, dissezione pelvica estensiva) 	

Fatigue	X
<p>Fattori correlati</p> <p>Fisiopatologici</p> <ul style="list-style-type: none"> <input checked="" type="checkbox"/> X Stato ipermetabolico (per malattie virali, febbre, gravidanza) <input checked="" type="checkbox"/> X Inadeguata ossigenazione tissutale (per BPCO, insufficienza cardiaca, anemia, malattia vascolare periferica) <input checked="" type="checkbox"/> X Alterazioni biochimiche (per malattie endocrine e metaboliche come diabete mellito, ipotiroidismo, malattie ipofisarie, AIDS, M Addison, cirrosi epatica, insufficienza renale) <input type="checkbox"/> Debolezza muscolare (per miastenia gravis, sclerosi multipla,, SLA, M. Parkinson, AIDS) <input type="checkbox"/> Stato ipermetabolico, competizione tra organismo e neoplasia per i nutrienti, anemia fattori di stress associati a tumore <input checked="" type="checkbox"/> X Deficit nutrizionali o alterazioni del metabolismo dei nutrienti (per nausea, vomito, diarrea, effetti collaterali dei farmaci, intervento chirurgico allo stomaco, diabete mellito) <input checked="" type="checkbox"/> X Processo infiammatorio cronico (per AIDS, artrite, Lupus eritematoso, epatite, Cirrosi Epatica, malattia infiammatoria intestinale, insufficienza renale) <p>Trattamenti</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Modificazioni biochimiche secondarie a chemioterapia, radioterapia, effetti collaterali di (specificare) danni tissutali da intervento chirurgico e anestesia, <input type="checkbox"/> Aumento del consumo energetico (per amputazione, alterazione dell'andatura, uso di deambulatore o stampelle) <p>Situazionali (personali, ambientali)</p> <ul style="list-style-type: none"> <input checked="" type="checkbox"/> X Diminuzione prolungata dell'attività (per ansia, febbre, diarrea, dolore, isolamento sociale, nausea/vomito, depressione, obesità) <input type="checkbox"/> Eccessive richieste di ruolo <input type="checkbox"/> Richieste emozionali soverchianti <input type="checkbox"/> Stress emotivo <input type="checkbox"/> Disturbi del sonno 	



Immagine corporea, Disturbo/Rischio di	X
---	----------

<p>Fattori correlati</p> <p>Fisiopatologici</p> <ul style="list-style-type: none"><input type="checkbox"/> Variazioni dell'aspetto per malattia cronica, trauma grave, perdita di una parte del corpo, perdita di una funzione organica, invecchiamento <p>Trattamenti</p> <ul style="list-style-type: none"><input type="checkbox"/> variazione dell'aspetto (per ricovero ospedaliero, radioterapia, chemioterapia, intervento chirurgico) <p>Situazionali (personali, ambientali)</p> <ul style="list-style-type: none"><input type="checkbox"/> Trauma fisico secondario a abuso sessuale, stupro, aggressione (specificare)<input checked="" type="checkbox"/> X Effetti sull'aspetto di obesità, immobilità, gravidanza (specificare)
--

Immobilizzazione, sindrome da	X
--------------------------------------	----------

<p>Fattori correlati</p> <p>Fisiopatologici</p> <ul style="list-style-type: none"><input checked="" type="checkbox"/> X Riduzione del sensorio<input checked="" type="checkbox"/> X Stato di incoscienza<input type="checkbox"/> Compromissione neuromuscolare (per sclerosi multipla, paralisi parziale/totale, distrofia muscolare, sindrome di Guillain-Barrè, parkinsonismo, lesione del midollo spinale)<input type="checkbox"/> Compromissione muscolo-scheletrica (per fratture e malattie reumatiche)<input type="checkbox"/> Malattia terminale (AIDS, cardiopatia, nefropatia)<input type="checkbox"/> Cancro <p>Disordini psichiatrici/della salute mentale (per depressione grave, stato catatonico, fobie gravi)</p> <p>Trattamenti</p> <ul style="list-style-type: none"><input type="checkbox"/> Intervento chirurgico<input checked="" type="checkbox"/> X Ventilazione meccanica<input checked="" type="checkbox"/> X Linee venose<input type="checkbox"/> Trazione/gesso/tutore ortopedico<input checked="" type="checkbox"/> X Immobilità prescritta <p>Situazionali (personali, ambientali)</p> <ul style="list-style-type: none"><input checked="" type="checkbox"/> X Depressione<input checked="" type="checkbox"/> X Fatigue<input checked="" type="checkbox"/> X Stato di debilitazione<input checked="" type="checkbox"/> X Dolore <p>Fasi di sviluppo</p> <ul style="list-style-type: none"><input type="checkbox"/> Neonato/bambino/adolescente: sindrome Down, artrite giovanile, osteogenesi imperfetta, paralisi cerebrale, disabilità mentale/fisica, autismo, spina bifida<input checked="" type="checkbox"/> X Persona anziana: ridotta agilità motoria, debolezza muscolare, demenza presenile
--

Incontinenza fecale	X
----------------------------	----------

<p>Fattori correlati</p> <p>Fisiopatologici</p> <ul style="list-style-type: none"><input type="checkbox"/> Compromissione dello sfintere rettale (per chirurgia anale/rettale, lesioni ostetriche, neuropatia periferica)<input checked="" type="checkbox"/> X Compromissione delle funzioni cognitive



<input type="checkbox"/> X Iperdistensione rettale per stipsi cronica <input type="checkbox"/> Mancato controllo dello sfintere volontario (per malattia neuromuscolare progressiva, compressione/lesione del midollo spinale, ictus cerebrale, sclerosi multipla) <input type="checkbox"/> X Trattamenti <input type="checkbox"/> Compromessa capacità del di fungere da serbatoio fecale per colectomia, proctite da radiazioni. Situazionali (personali, ambientali) <input type="checkbox"/> IX ncapacità di riconoscere, interpretare o rispondere ai segnali intestinali (per depressione, compromissione delle funzioni cognitive)

Incontinenza urinaria funzionale	X
Fattori correlati Fisiopatologici <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> X Diminuzione di stimoli vescicali/compromessa capacità di riconoscerli per trauma, infezione, tumore cerebrale, parkinsonismo, sclerosi multipla, neuropatia alcolica, malattie demielinizzanti, ictus cerebrale, demenza progressiva Trattamenti <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Riduzione del tono vescicale per uso di antistaminici, terapia immunosoppressiva, adrenalina, diuretici, anticolinergici, tranquillanti, sedativi, miorilassanti Situazionali (personali, ambientali) <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> X Compromissione della mobilità <input type="checkbox"/> X Diminuita attenzione nei confronti degli stimoli vescicali per depressione, soppressione intenzionale, confusione mentale <input type="checkbox"/> Barriere ambientali per l'accesso al bagno (gabinetto distante, letto troppo alto, scarsa illuminazione, spondine laterali, ambiente non familiare) Fasi di sviluppo <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> X Persona anziana: perdite motorie/sensitive 	

Incontinenza urinaria totale (compromessa eliminazione urinaria)	X
Fattori correlati Fisiopatologici <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Anomalie congenite delle vie urinarie <input type="checkbox"/> Diminuita capacità vescicale o irritazione vescicale per trauma, carcinoma, infezione uretrite, glicosuria <input type="checkbox"/> Diminuzione dei segnali vescicali o compromessa capacità di riconoscerli per infezione/tumore/lesione del midollo spinale, neuropatia diabetica/alcolica, malattie demielinizzanti, ictus cerebrale, parkinsonismo, lesione cerebrale, sclerosi multipla Trattamenti <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Effetti del trattamento chirurgico sullo sfintere vescicale per prostatectomia, dissezione pelvica estensiva <input type="checkbox"/> Strumentazione diagnostica <input type="checkbox"/> X Riduzione del tono muscolare per per anestesia generale o spinale, terapia farmacologica e iatrogenesi (farmaci miorilassanti, anestetici, diuretici, antistaminici, anticolinergici, immunodepressori, adrenalina, ansiolitici) Situazionali (personali, ambientali) <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> X Compromissione della mobilità <input type="checkbox"/> X Diminuita attenzione nei confronti degli stimoli vescicali per depressione, soppressione intenzionale, confusione mentale 	



- Barriere ambientali per l'accesso al bagno (gabinetto distante, letto troppo alto, scarsa illuminazione, sponde laterali, ambiente non familiare)

Fasi di sviluppo

- X Persona anziana: perdite motorie/sensitive

Infezione, rischio di

X

Fattori correlati

Fisiopatologici

- X Compromissione delle difese dell'ospite per cancro, malattie respiratorie, ematologiche, periodontali, malattie epatiche, artrite, diabete mellito, malattie ereditarie, AIDS, alcolismo, immunosoppressione (secondaria a- specificare)
- Compromissione della circolazione per linfedema, obesità, malattia vascolare periferica

Trattamenti

- X Sede di possibile invasione di microorganismi per intervento chirurgico, intubazione, linee invasive, nutrizione parenterale totale, dialisi, nutrizione enterale
- Compromissione delle difese dell'ospite per terapia radiante, trapianto d'organo, terapia farmacologica (specificare)

Situazionali (personali, ambientali)

- X Compromissione delle difese dell'ospite per malattie infettive, stress, malnutrizione, prolungata degenza in ospedale, fumo, prolungata immobilità
- Possibile sede di invasione di microorganismi per trauma accidentale/intenzionale, periodo postpartum, morso di insetto/animale/umano, lesione termica, ambiente caldo/umido/buio (apparecchio)
- gessato, pieghe cutanee
- X Contatto con agenti contaminanti (infezioni nosocomiali o di comunità)

Fasi di sviluppo

- Neonato: maggiore vulnerabilità del neonato per madre HIV positiva, carenza di anticorpi materni, flora normale insufficiente, ferite aperte (ombelicale, circoncisione), sistema immunitario immaturo
- Bambino-adolescente: maggiore vulnerabilità per perdita dell'immunizzazione, molteplici partner sessuali
- X Persona anziana: maggiore vulnerabilità per diminuzione della risposta immunitaria, condizione debilitante, malattia cronica)

Insonnia

X

Fattori correlati

Fisiopatologici

- X Compromissione del trasporto di ossigeno (per angina, disturbi circolatori/respiratori, arteriosclerosi periferica)
- X Compromissione dell'eliminazione fecale o urinaria (per diarrea, disuria, ritenzione, incontinenza, stipsi, pollacchiuria)
- X Compromissione del metabolismo (per ipertiroidismo, disturbi epatici, ulcera gastrica)

Situazionali (personali, ambientali)

- X Eccessiva iperattività (per disturbo bipolare/ da deficit dell'attenzione, panico, uso di droghe)
- X Eccessivo dormire di giorno
- X Depressione
- IX nadeguata attività fisica durante il giorno
- X Dolore cronico



- X Risposte ansiose
- X Modifiche ambientali (specificare)
- X Paura
- Frequenti risvegli dei bambini
- Donna adulta: variazioni ormonali (es. Perimenopausa)

Integrità cutanea/tissutale: compromissione, rischio

X

Fattori correlati

Fisiopatologici

- Infiammazioni delle giunzioni dermo-epidermiche (per lupus eritematoso, sclerodermia, ..)

Integrità mucosa orale, compromissione

X

Fattori correlati

- X Inadeguata igiene orale
- X Incapacità di provvedere all'igiene orale

Ipertermia

X

Fattori correlati

Trattamenti

- Ridotta capacità di sudorazione (specificare il farmaco)

Situazionali

- Esposizione al calore, al sole
- Abbigliamento inadeguato al clima
- Assenza di condizionamento dell'aria
- Strumenti per il riscaldamento del neonato in ambito ospedaliero
- Diminuzione della circolazione (per persona sovrappeso/sottopeso, disidratazione)
- Idratazione insufficiente per un'attività fisica vigorosa

Fasi di sviluppo

- Inefficacia della termoregolazione secondaria all'età

Lesione, rischio di

X

Fattori correlati

Fisiopatologici

- X Alterazioni delle funzioni cerebrali per ipossia (vertigini, sincope)
- X Alterazioni della mobilità (ictus cerebrale, artrite, parkinsonismo, perdita di un arto, compromissione della vista/udito)
- X Fatigue
- X Ipotensione ortostatica
- Insufficienza vertebro basilare
- Disturbi vestibolari



- X Inadeguata consapevolezza dei rischi ambientali (confusione mentale)
- Movimenti tonico-clonici (convulsioni)

Trattamenti

- X Lungo allettamento
- Effetti sulla mobilità/sensorio (sedativi, miorilassanti...specificare)
- X Gesso, stampelle, deambulatore, bastone

Situazionali (personali, ambientali)

- Diminuzione o perdita memoria a breve termine
- X Alterata capacità di giudizio (per stress, droghe, alcol, disidratazione, depressione)
- Pericoli domestici (pavimenti sdruciolevoli, scale, illuminazione insufficiente, ingressi/corridoi non sicuri, bagno, giocattoli non sicuri, impianto elettrico difettoso, veleni conservati in modo improprio)
- Pericoli legati all'uso dell'automobile (cinture, sedile di sicurezza per bambini, meccanica del veicolo non sicura)
- Pericolo di incendio
- X Ambiente non familiare (es. Ospedale)
- Scarpe inadatte,
- Disattenzione del caregiver
- Uso improprio degli ausili
- Storia di incidenti
- X Andatura instabile

Fasi di sviluppo

- Bambino: inadeguata consapevolezza dei pericoli
- X Persona anziana: alterata capacità di giudizio (per deficit cognitivi), stile di vita sedentario, perdita di forza muscolare

Liquidi, eccessivo volume di

X

Fattori correlati

Fisiopatologici

- X Compromissione dei meccanismi regolatori (per insufficienza renale acuta/cronica, disfunzioni endocrine, anomalie sistemiche metaboliche, lipoedema)
- X Iperensione portale, diminuzione della pressione colloido-osmotica e ritenzione di sodio (per epatopatia, cancro, cirrosi, ascite)
- X Anomalie venose e arteriose (vene varicose, vasculopatia periferica, Trombosi, flebite, immobilità, linfoedema, infezioni, trauma, neoplasie)

Trattamenti

- X Ritenzione di sodio e acqua (terapia corticosteroidica)
- Inadeguato drenaggio linfatico (mastectomia)

Situazionali (personali, ambientali)

- Eccessivo apporto di sodio/liquidi
- Inadeguato apporto proteico (dieta squilibrata, malnutrizione)
- X Ristagno venoso declive/venostasi (per immobilità, prolungata stazione eretta/posizione seduta, gesso/fasciatura stretta)
- Compromissione venosa da utero gravido

Fasi di sviluppo

- X Persona anziana: compromissione del ritorno venoso per aumento delle resistenze periferiche e diminuzione dell'efficienza valvolare



Liquidi, insufficiente volume di	X
<p>Fattori correlati</p> <p>Fisiopatologici</p> <ul style="list-style-type: none"><input type="checkbox"/> Eccessiva emissione di urine (per diabete mellito insipido, diabete mellito scompensato)<input type="checkbox"/> Aumento della permeabilità capillare e evaporazione da ustioni<input checked="" type="checkbox"/> Perdite (febbre, aumento del metabolismo, drenaggio accentuato, ferite, peritonite, diarrea, emorragia) <p>Situazionali (personali, ambientali)</p> <ul style="list-style-type: none"><input checked="" type="checkbox"/> Vomito/nausea<input checked="" type="checkbox"/> Diminuita motivazione a bere (depressione, fatigue)<input type="checkbox"/> Dieta scorretta/digiuno<input checked="" type="checkbox"/> Nutrizione per sonda con soluzione concentrata<input checked="" type="checkbox"/> Difficoltà a deglutire/assumere alimenti (dolore orale, fatigue)<input type="checkbox"/> Esposizione a climi estremi<input checked="" type="checkbox"/> Perdita eccessiva (cateteri a permanenza, drenaggi)<input type="checkbox"/> Liquidi insufficienti in rapporto all'esercizio fisico/condizioni climatiche<input type="checkbox"/> Uso eccessivo di lassativi o clisteri, diuretici, alcol, caffeina <p>Fasi di sviluppo</p> <ul style="list-style-type: none"><input type="checkbox"/> Bambino: aumentata vulnerabilità (ridotta riserva idrica, ridotta capacità di concentrazione delle urine)<input checked="" type="checkbox"/> Persona anziana: aumentata vulnerabilità a ridotta riserva idrica, ridotta sensazione di sete	

Mobilità, compromissione /rischio di	X
<p>Fattori correlati</p> <p>Fisiopatologici</p> <ul style="list-style-type: none"><input type="checkbox"/> riduzione della forza e della resistenza per compromissione neuromuscolare (malattie autoimmunitarie, del sistema nervoso, respiratorie, distrofia muscolare, paralisi parziale, tumore del SNC, trauma, ipertensione endocranica, deficit sensoriale)<input checked="" type="checkbox"/> riduzione della forza e della resistenza per compromissione muscoloscheletrica (fratture, malattie del tessuto connettivo, condizioni cardiache)<input type="checkbox"/> rigidità delle articolazioni o contratture (per malattia infiammatoria, interventi endoprotesi ortopedica articolare, malattia degenerativa delle articolazioni e del disco)<input checked="" type="checkbox"/> edemi<input checked="" type="checkbox"/> apparecchi esterni (gesso/splint, corsetto ortopedico, catetere venoso)<input checked="" type="checkbox"/> forza/resistenza insufficienti per la deambulazione (protesi, stampelle, deambulatore) <p>Situazionali (personali, ambientali)</p> <ul style="list-style-type: none"><input checked="" type="checkbox"/> fatigue<input checked="" type="checkbox"/> obesità<input type="checkbox"/> mancanza di motivazione<input checked="" type="checkbox"/> dispnea<input checked="" type="checkbox"/> dolore <p>Fasi di sviluppo</p> <ul style="list-style-type: none"><input type="checkbox"/> Bambino: alterazione dell'andatura per deficienze scheletriche congenite, displasia congenita dell'anca, osteomielite<input checked="" type="checkbox"/> Persona anziana: diminuzione dell'agilità e debolezza muscolare	



Nausea	X
<p>Fattori correlati</p> <p>Fisiopatologici</p> <ul style="list-style-type: none"> <input checked="" type="checkbox"/> X Trauma tissutale e spasmi muscolari riflessi (per gastroenterite acuta, ulcera gastrica, sindrome colon irritabile, pancreatite, infezioni, tossoinfezioni alimentari, intossicazioni da farmaci, calcolosi renale, crampi uterini, malessere da movimento, stress) (specificare) <p>Trattamenti</p> <ul style="list-style-type: none"> <input checked="" type="checkbox"/> X Effetti della chemioterapia e/o farmaci <input type="checkbox"/> Effetti dell'anestesia 	
Nutrizione inferiore al fabbisogno, rischio di	X
<p>Fattori correlati</p> <p>Fisiopatologici</p> <ul style="list-style-type: none"> <input checked="" type="checkbox"/> X Aumentato fabbisogno calorico e difficoltà ad assumere sufficienti calorie (per ustione, trauma, complicanze/deformazioni gastrointestinali, cancro, alcolismo, uso di sostanze stupefacenti, infezione, AIDS) <input checked="" type="checkbox"/> X Disfagia (per ictus cerebrale, M.di Parkinson, palatoschisi, distrofia muscolare, paralisi cerebrale, paralisi facciale, SLA, disturbi neuromuscolari) <input type="checkbox"/> Diminuito assorbimento di nutrienti (per M.di Crohn, enterocolite necrotizzante, intolleranza al lattosio, fibrosi cistica) <input checked="" type="checkbox"/> X Diminuzione dell'appetito (per alterazioni dello stato di coscienza) <input type="checkbox"/> Vomito autoindotto, esercizio fisico eccessivo in rapporto alle calorie assunte, anoressia <input type="checkbox"/> Rifiuto ad alimentarsi (timore di essere avvelenato/ comportamento paranoico) <input type="checkbox"/> Inappetenza/agitazione fisica (per disturbo bipolare) <input type="checkbox"/> Inappetenza e diarrea (per infezione da protozoi) <input checked="" type="checkbox"/> X Vomito, inappetenza e alterazioni della digestione (per pancreatite) <input checked="" type="checkbox"/> X Inappetenza e compromissione del metabolismo proteico/lipidico, ipovitaminosi (per cirrosi epatica) <input type="checkbox"/> Inappetenza, vomito e alterazione della digestione (per malformazioni del tratto gastrointestinale /enterocolite necrotizzante) <input checked="" type="checkbox"/> X Inappetenza per reflusso gastroesofageo <p>Trattamenti</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Aumentato fabbisogno proteico/vitaminico per la cicatrizzazione di ferite e diminuita assunzione (per intervento chirurgico, farmaci, blocco mandibolare, radioterapia) <input type="checkbox"/> Inadeguato assorbimento come effetto collaterale di farmaci (specificare) <input type="checkbox"/> Diminuita assunzione orale, dolore in sede orale, nausea, vomito (per radioterapia, chemioterapia, tonsillectomia) <p>Situazionali (personali, ambientali)</p> <ul style="list-style-type: none"> <input checked="" type="checkbox"/> X Diminuzione dell'appetito (per nausea, vomito, isolamento sociale, stress, depressione, allergie) <input type="checkbox"/> Incapacità di procurarsi gli alimenti (per limitazioni fisiche, problemi finanziari/ di trasporto) <input checked="" type="checkbox"/> X Incapacità di masticare (per adentulia, carie, protesi non adatta) <input type="checkbox"/> Diarrea <p>Fasi di sviluppo</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Neonato/bambino: inadeguata assunzione (per carente stimolazione sensoriale, inadeguate conoscenze del care giver, scarsa produzione del latte materno) <input type="checkbox"/> Malassorbimento, restrizioni dietetiche, inappetenza (per morbo celiaco, fibrosi cistica, intolleranza al lattosio, malformazioni gastrointestinali, reflusso gastroesofageo, enterocolite necrotizzante) <input type="checkbox"/> Difficoltà di suzione/disfagia (per paralisi, labioschisi, palatoschisi) 	



- | |
|---|
| <input type="checkbox"/> Inadeguata suzione, astenia e dispnea (per cardiopatia congenita, iperbilirubinemia, sindrome virale, distress respiratorio, prematurità, ritardo di sviluppo) |
|---|

Nutrizione superiore al fabbisogno	X
Fattori correlati Fisiopatologici <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Alterato modello di sazietà (specificare) <input type="checkbox"/> Riduzione dei sensi di gusto/olfatto Trattamenti <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Alterazione del senso di sazietà (per farmaci, radiazioni) Situazionali (personali, ambientali) <ul style="list-style-type: none"> <input checked="" type="checkbox"/> X Rischio di aumento ponderale in gravidanza superiore a 12/13 Kg <input checked="" type="checkbox"/> X Deficit di conoscenze delle basi nutrizionali Fasi di sviluppo <ul style="list-style-type: none"> <input checked="" type="checkbox"/> X Adulto/persona anziana: diminuzione del modello di attività /di fabbisogno metabolico 	

Respirazione, inefficace funzionalità, rischio	X
Fattori correlati Fisiopatologici <ul style="list-style-type: none"> <input checked="" type="checkbox"/> X Secrezioni eccessive o dense (per infezione, infiammazione, allergia, patologie cardiopolmonari, fumo) <input type="checkbox"/> Immobilità stasi delle secrezioni, tosse inefficace (per malattie del SN, depressione del SNC/trauma cranico, ictus cerebrale, tetraplegia) Trattamenti <ul style="list-style-type: none"> <input checked="" type="checkbox"/> X Immobilità (per effetto sedativo di farmaci, droghe o sostanze chimiche, anestesia) <input checked="" type="checkbox"/> X Soppressione del riflesso della tosse <input checked="" type="checkbox"/> X Effetti della tracheostomia (alterazione delle secrezioni) Situazionali (personali, ambientali) <ul style="list-style-type: none"> <input checked="" type="checkbox"/> X Immobilità (per intervento chirurgico/trauma, compromissione percettiva/cognitiva, fatigue, dolore, paura, ansia) <input type="checkbox"/> Livello di umidità estremamente alto/basso (posizione prona nel sonno, esposizione a freddo, pianto, riso, allergeni, fumo) 	

Soffocamento, rischio Vedere rischio di lesione	X
--	----------

Stipsi	X
Fattori correlati Fisiopatologici <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Innervazione difettosa, debolezza della muscolatura pelvica immobilità (per lesioni/traumi del midollo spinale, spina bifida, ictus cerebrale, malattia neurologica, demenza) <input checked="" type="checkbox"/> X Riduzione del metabolismo (per ipotiroidismo, iperparatiroidismo, obesità, feocromocitoma, uremia, neuropatia diabetica, ipo pituitarismo) <input type="checkbox"/> Diminuita risposta al bisogno di defecare (disturbi dell'umore) <input checked="" type="checkbox"/> X Dolore alla defecazione (per emorroidi, lesione dorsale) 	



- X Diminuita peristalsi secondaria a ipossia cardiaca/polmonare
- Disturbi della mobilità secondari a sindrome da intestino irritabile
- Incapacità di rilassare lo sfintere anale e elevata pressione a riposo nel canale anale (parti vaginali multipli, sforzo cronico)

Trattamenti

- Effetti collaterali di farmaci (specificare)
- Effetti sulla peristalsi dell'anaestesia e della manipolazione chirurgica
- X Uso abituale di lassativi
- Mucosite secondaria a radiazioni

Situazionali (personali, ambientali)

- X Diminuzione della peristalsi (per immobilità, gravidanza, stress, mancanza di esercizio fisico)
- X Modello di evacuazione irregolare
- Credenze culturali/sulla salute
- X Mancanza di riservatezza
- X Dieta priva di scorie, assunzione di liquidi inadeguata
- X Paura di dolore rettale o cardiaco
- Valutazioni errate
- Incapacità di percepire i segnali intestinali

Trasloco, stress da

X

Fattori correlati

Fisiopatologici

- Compromissione della capacità di adattamento a nuovi ambienti per peggioramento dello stato di salute fisico (difficoltà fisiche), psico-sociale (stress prima del trasloco, depressione, diminuzione dell'autostima)

Situazionali (personali, ambientali)

- Risorse economiche insufficienti
- Elevati livelli di cambiamenti (per ammissione in strutture residenziali/di assistenza)
- Perdita di legami sociali/familiari
- Abbandono
- Modifica delle relazioni familiari
- Scarsa/nessuna preparazione per l'imminente spostamento

Fasi di sviluppo

- Bambino/adolescente: perdite associate al trasloco (paura di sentirsi rifiutato; perdita degli amici, problemi scolastici), insicurezze legate all'inserimento nel nuovo ambiente (nuovo gruppo, nuova scuola)
- X Persona anziana: necessità della vicinanza dei familiari per l'assistenza, ammissione in struttura di assistenza



Allegato 3

PROBLEMI COLLABORATIVI PRELEVALEMENTEMENTE TRATTATI

Selezionare (X) le caselle relative ai problemi collaborativi di interesse
(riferimenti bibliografici: L.J.Carpenito-Diagnosi infermieristiche - 5th. ed. C.E.A. Edizioni, 2010)

Rischio di complicanze (RC) per disfunzione cardiaca/ vascolare	
RC per emorragia	X
RC per aritmie	X
RC per edema polmonare	X
RC per trombosi venosa profonda	X
RC per ipovolemia	X
RC per embolia polmonare	X
Rischio di complicanze (RC) per disfunzione respiratoria	
RC per ipossiemia	X
RC per atelectasia/polmonite	X
RC per costrizione tracheobronchiale	X
RC per pneumotorace	X
Rischio di complicanze (RC) per disfunzione metabolica/immunitaria/ematopoietica	
RC per ipo/iperglicemia	X
RC per squilibri elettrolitici	X
RC per sepsi	X
RC per acidosi (metabolica, respiratoria)	X
RC per alcalosi (metabolica, respiratoria)	X
RC per infezioni opportunistiche	X
Rischio di complicanze (RC) per disfunzione renale / urinaria	
RC per ritenzione urinaria acuta	X
RC per insufficienza renale	X
Rischio di complicanze (RC) per disfunzione neurologica / sensoriale	
RC per astinenza da alcol	X
RC per ipertensione endocranica	X
Rischio di complicanze (RC) per disfunzione gastrointestinale / epatica / biliare	
RC per sanguinamento gastrointestinale	X
RC per disfunzione epatica	X
RC per ileo paralitico	X
Rischio di complicanze (RC) per effetti avversi (EA) della terapia farmacologica	
RC per effetti avversi della terapia con farmaci anticoagulanti	X



RC per effetti avversi della terapia con farmaci adrenocorticosteroidi	X
RC per effetti avversi della terapia con farmaci antiaritmici	X
RC per effetti avversi della terapia con farmaci antineoplastici	X
RC per effetti avversi della terapia con farmaci diuretici	X

Allegato 4

APPRENDIMENTO OFFERTO

In relazione alle diagnosi infermieristiche / problemi collaborativi sopra indicati, descrivere le opportunità formative per lo studente che caratterizzano la sede di apprendimento. Esempio: interventi assistenziali infermieristici, modelli organizzativi e/o di presa in carico assistenziale, attività di ricerca e innovazione.

- Modello organizzativo con suddivisione in miniequipe; opportunità di prendere in carico globalmente il paziente e di sviluppare il ragionamento clinico nella sua totalità
- Possibilità di assistere al posizionamento di accessi venosi eco guidati di Midline e di PICC
- Terapia informatizzata
- Sperimentazione di diverse tecniche infermieristiche
- Possibilità di sperimentarsi nelle realtà di medicina e di MECAU; presa in carico del paziente complesso e non attraverso l'attuazione dei protocolli aziendali. Pianificazione ed attuazione dell'assistenza infermieristica individualizzata in base alla criticità clinica ed assistenziale