



OFFERTA FORMATIVA DELLA SEDE DI TIROCINIO

Contesto	
<p>Tutor clinico Contatti e riferimenti</p>	<p>Nome: Cristina Cognome: Giorge Telefono: 011 2402287 e-mail: cristina.giorge@unito.it</p>
<p>Struttura/servizio Nominativo, ubicazione, ecc N°locali, n° posti letto, Orari apertura al pubblico, Orari di lavoro, Figure professionali</p> <p>Risorse strumentali</p> <p>Servizi agli studenti (mensa, biblioteca, accesso internet, ecc)</p> <p>Contatti e riferimenti</p> <p>Come raggiungere il servizio Mappa percorso</p> <p>Mezzi pubblici</p>	<p>Ospedale Giovanni Bosco Nefrologia Dialisi 2 (reparto), VI piano 9 camere, 17 posti letto 13:30 – 14:30 am; 19:00-20:30pm Mattino 7:00 – 14:40 Pom. 14:30 – 22:35 Notte 22:30- 7:00 Nefrologi, coordinatore infermieristico, infermieri,oss/ota, infermiere generico, dietista, assistente sociale</p> <p>Ecografo, pompe infusionali, pompe nutrizionali occasionalmente, monitor per la rilevazione dei parametri vitali, elettrocardiografo, presidi per la mobilizzazione, monitor cardiaco, carrello dell'emergenza</p> <p>Servizio mensa, accesso ad internet, biblioteca, tisaneria</p> <p>Indirizzo: Piazza del Donatore di Sangue n.3 Telefono: 011 2402287 Fax: 0112402458</p> <p>Da Corso Giulio Cesare, svoltare per via Sempione o per via Porpora, fino ad arrivare in Piazza del Donatore di Sangue 3</p> <p>Autobus di linea n. 50 – 27 – 2 – 75 Tram n. 4</p>



Allegato 1

Problemi di salute / Problemi clinici / Percorso diagnostico terapeutici prevalentemente trattati

Selezionare (X) i problemi di salute prevalenti e indicare le patologie più frequenti

Dipendenze patologiche X

Saltuariamente assistiamo pazienti tossicodipendenti o con potus

Malattie Cardiovascolari X

Scompenso cardiaco, pregresso IMA, ischemia miocardica, aritmie cardiache

Malattie Cerebrovascolari X

Vasculiti, tia, pregresso stroke, demenze senili, morbo di Parkinson, stenosi carotidee

Malattie Endocrinologiche, metaboliche X

Diabete, ipo-ipertiroidismo

Malattie Intestinali / digestive X

Gastriti, ulcere gastro-duodenali, morbo di Chron, rettocolite ulcerosa,

Malattie Infettive X

Klebsiella pneumoniae, clostridium difficile, M.R.S.A. , AIDS, epatite B, epatite C, pazienti portatori di infezioni batteriche e virali varie

Malattie Nefrologiche, genito/urinarie X

IRA, IRC, complicanze dialitiche, pielonefriti, IVU, glomerulo nefriti, malattie autoimmuni, Lupus Eritematoso Sistemico (LES), amiloidosi, vasculiti



Malattie Oncologiche	X
Tumori interessanti tutti i distretti dell'organismo (stomaco, intestino, polmone, rene, cerebrale) ed ematologici	
Malattie Rare	X
Malattie autoimmuni	
Malattie Respiratorie	X
BPCO, versamento pleurico, fibrosi polmonare	
Salute Mentale	X
Sindrome bipolare, schizofrenia, depressione	



Allegato 2

Diagnosi Infermieristiche prevalentemente trattate

Selezionare (X) le caselle relative alle Diagnosi Infermieristiche e ai fattori correlati di interesse
(riferimenti bibliografici: L.J.Carpenito-Diagnosi infermieristiche – 5th. ed. C.E.A. Edizioni, 2010)

Ansia	X
Fattori correlati	
Fisiopatologici	
X Qualsiasi fattore che interferisca con i bisogni relativi ad alimentazione, respirazione, comfort, sicurezza	
Situazionali (personali, ambientali)	
X Minaccia reale o percepita al concetto di sé (fallimento, modificazione dello status, mancato riconoscimento da parte degli altri...)	
X Perdita reale o percepita di persone significative	
X Minaccia reale o percepita all'integrità biologica (per malattia, violenza, procedure invasive, stato terminale)	
X Cambiamento ambientale reale o percepito (trasloco, ospedalizzazione, pensionamento, condizione di rifugiato, reclusione, calamità naturali, rischi per la sicurezza...)	
X Cambiamento reale o percepito delle condizioni socioeconomiche (disoccupazione, cambiamento di lavoro, licenziamento, promozione)	
Fasi di sviluppo	
<input type="checkbox"/> Neonato/bambino: separazione, ambiente e persone sconosciuti, variazioni dei rapporti con coetanei, morte di (specificare) con rituali non familiari e adulti in lutto	
<input type="checkbox"/> Adolescente: morte di (specificare), minaccia del concetto di se correlato a sviluppo sessuale, variazione dei rapporti con coetanei	
<input type="checkbox"/> Adulto: minaccia al concetto di se per gravidanza, ruolo genitoriale, cambiamento di carriera, effetti dell'invecchiamento, complicanze di una precedente gravidanza, aborto, o morte del feto, insufficiente conoscenza dell'esperienza del travaglio	
X Persona anziana: minaccia al concetto di se secondaria a perdite sensoriali, motorie, problemi finanziari, cambiamenti legati al pensionamento	

Aspirazione, rischio di	X
Fattori correlati	
Fisiopatologici	
X Riduzione del livello di coscienza (per demenza pre-senile, trauma cranico, ictus cerebrale, M.di Parkinson, induzione da alcol/sostanze, coma, convulsioni, anestesia)	
<input type="checkbox"/> Depressione dei riflessi della tosse/faringeo	
X Ritardato svuotamento gastrico (per ostruzione intestinale, sindrome da reflusso, ileo)	
<input type="checkbox"/> Aumento della pressione gastrica (per posizione ginecologica, ascite, obesità, dilatazione uterina)	
X Compromissione della deglutizione o diminuzione dei riflessi laringeo/glottico (per acalasia, condizioni debilitanti, miastenia grave, catatonìa, Mdi Parkinson, stenosi esofagea, ictus cerebrale, sclerosi multipla, sclerodermia, distrofia muscolare, sindrome di Guillain Barrè)	
<input type="checkbox"/> Fistola tracheo-esofagea	
<input type="checkbox"/> Compromissione dei riflessi protettivi (chirurgia o trauma facciale/orale/del collo, paraplegia/emiplegia)	
Trattamenti	
<input type="checkbox"/> Depressione dei riflessi laringeo/glottico (per tracheostomia/trachetomia, sedazione, nutriz. enterale)	
<input type="checkbox"/> Compromissione della capacità di tossire (per immobilizzazione della mandibola, posizione prona)	
Situazionali (personali, ambientali)	



<p>Fasi di sviluppo</p>	<input type="checkbox"/> Incapacità/difficoltà di sollevare la parte superiore del corpo <input type="checkbox"/> Assunzione di alimenti in corso di intossicazione <input type="checkbox"/> Prematuro: compromissione dei riflessi di suzione/deglutizione <input type="checkbox"/> Neonato: riduzione del tono muscolare dello sfintere esofageo inferiore <input type="checkbox"/> Persona anziana: dentizione inadeguata
--------------------------------	--

Attività, intolleranza all'attività	X
--	----------

<p>Fattori correlati</p> <p>Fisiopatologici</p> <p>Compromissione del sistema di apporto di ossigeno per</p> <ul style="list-style-type: none"> X Sistema cardiaco (insufficienza cardiaca, valvolare, aritmie, infarto del miocardio, cardiopatia congenita, angina) X Sistema respiratorio (bronco pneumopatia cronica ostruttiva, atelectasia, dispasia broncopolmonare) X Sistema circolatorio (anemia, ipovolemia, arteriopatia periferica) <p>Aumento del fabbisogno metabolico per</p> <ul style="list-style-type: none"> X Infezioni acute o croniche (virali, epatite, mononucleosi, disordini endocrini/ metabolici) X Malattie croniche (renali, infiammatorie, ,neurologiche, epatiche,, muscolo scheletriche) X Inadeguatezza delle fonti energetiche (per obesità, dieta inadeguata, malnutrizione) <p>Trattamenti</p> <ul style="list-style-type: none"> X Aumento del fabbisogno metabolico (per tumore maligno, intervento chirurgico, indagini diagnostiche, orario e frequenza trattamenti) X Compromissione del trasporto dell'ossigeno (per ipovolemia, prolungato riposo a letto) <p>Situazionali (personali, ambientali)</p> <ul style="list-style-type: none"> X Inattività (secondaria a depressione, mancanza di motivazione, stile di vita sedentario,insufficiente conoscenza) X Aumento del fabbisogno metabolico (per utilizzo di ausili come deambulatore /stampelle /tutori, stress, dolore, barriere ambientali come ad es. scale, estremi climatici, inquinamento dell'aria) X Inadeguata motivazione (secondaria ad utilizzo di ausili, paura di cadere, depressione, obesità, dolore, dispnea) <p>Fasi di sviluppo</p> <ul style="list-style-type: none"> X Processo di invecchiamento con diminuzione della forza e del trofismo muscolare, comparsa di deficit sensoriali
--

Autolesionismo, automutilazione, rischio di	X
--	----------

<p>Fattori correlati</p> <p>Fisiopatologici</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Squilibri biochimici / neurofisiologici (disturbo bipolare, autismo, compromissione mentale) <p>Personali</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Pregressi episodi di autolesionismo <input type="checkbox"/> Abusi fisici, psichici, o sessuali <input type="checkbox"/> Inefficaci capacità di coping X Incapacità di esprimere verbalmente i sentimenti <p>Fasi di sviluppo</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Bambino/adolescente: correlati all'abuso



Autostima, Disturbo/Rischio di	X
<p>Fattori correlati</p> <p>Fisiopatologici</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Variazione dell'aspetto (per perdita di parti del corpo, di una o più funzioni organiche) <input type="checkbox"/> Deturpazione <p>X Squilibri biochimici, neurofisiologici</p> <p>Situazionali (personali, ambientali)</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Bisogno di dipendenza non soddisfatto X Senso di abbandono (per morte di una persona significativa, rapimento/uccisione di un figlio, separazione da una persona significativa) X Senso di fallimento (per perdita del lavoro/incapacità di lavorare, problemi economici, liti coniugali, parenti acquisiti, aumento/diminuzione del peso, separazione, disoccupazione, problemi relazionali, patrigno/matrigna) <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Aggressione subita personalmente o di altra persona della stessa età / comunità <input type="checkbox"/> Insuccesso scolastico <input type="checkbox"/> Relazione inefficace con i propri genitori <input type="checkbox"/> Relazioni abusive <input type="checkbox"/> Aspettative irrealistiche verso di se o verso i propri genitori/figli <input type="checkbox"/> Rifiuto da parte dei genitori, punizioni incoerenti, abbandono o insuccesso correlato a istituzionalizzazione <input type="checkbox"/> Storia di numerosi insuccessi <p>Fasi di sviluppo</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Neonato/bambino in età prescolare: mancanza di stimoli e vicinanza emotiva, separazione dai genitori/altre persone significative, valutazione costantemente negativa da parte dei genitori, inadeguato sostegno da parte dei genitori, incapacità di fidarsi di altre persone <input type="checkbox"/> Età scolare: insuccesso scolastico, perdita del gruppo dei coetanei, ripetuti feedback negativi) <input type="checkbox"/> Adolescente: perdita di autonomia/indipendenza per (specificare), rottura di relazioni con coetanei/amici, problemi scolastici, perdita di altre persona significative <p>X Adulto: per modificazioni associate a invecchiamento</p> <p>X Persona anziana: per perdita di persone, funzioni, economiche, pensionamento</p>	

Cadute, rischio	X
<p>Vedere lesione, rischio</p>	

Caregiver, tensione nel ruolo di /Rischio di	X
<p>Fattori correlati</p> <p>Fisiopatologici</p> <p>X Esigenza di assistenza continua/ complessa (per condizioni debilitanti acute/progressive, tossicodipendenza, malattia dal decorso imprevedibile, demenza progressiva, malattia mentale cronica, disabilità)</p> <p>Trattamenti</p> <p>X Responsabilità assistenziali legate per tutto l'arco delle 24 ore o assistenza che richiede tempo (dialisi, trasporto)</p> <p>Situazionali (personali, ambientali)</p> <ul style="list-style-type: none"> X Aspettative non realistiche dell'assistito nei confronti del caregiver X Modello di coping inefficace X Salute fisica compromessa X Relazioni inadeguate o disfunzioni familiari X Durata dell'assistenza richiesta X Isolamento X Pause di riposo/svago insufficienti o 	



<ul style="list-style-type: none"> X Risorse economiche insufficienti X Assenza o non disponibilità di sostegno <p>Fasi di sviluppo</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Esigenza di assistenza continua secondaria a disabilità mentali (specificare) o disabilità fisiche (specificare)
--

Casa, compromessa gestione	X
-----------------------------------	----------

<p>Fattori correlati</p> <p>Fisiopatologici</p> <ul style="list-style-type: none"> X Compromissione delle capacità funzionali secondarie a malattia cronica debilitante (diabete mellito, sclerosi multipla, ictus cerebrale, cancro, artrite, insufficienza cardiaca, m. Parkinson, BPCO, distrofia muscolare) <p>Situazionali (personali, ambientali)</p> <ul style="list-style-type: none"> X Modificazioni delle capacità funzionali di un membro della famiglia (specificare) per lesione (es. frattura di un arto/lesione del midollo spinale), intervento chirurgico, alterazione dello stato mentale (vuoti di memoria, depressione, ansia-panico grave), abuso di sostanze. X Mancata disponibilità di un sistema di sostegno X Perdita di un familiare X Deficit di conoscenze X Insufficienza di risorse economiche <p>Fasi di sviluppo</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Bambino (correlata all'esigenza di cure molteplici) X Persona anziana (correlata all'esigenza di cure molteplici per un familiare che presenta deficit cognitivi, motori, sensoriali)

Comunicazione, compromissione e Comunicazione verbale, compromissione	X
(incapacità a pronunciare le parole ma è in grado di comprendere)	X

<p>Fattori correlati</p> <p>Fisiopatologici</p> <p>Alterazione della funzionalità motoria dei muscoli del linguaggio</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Ischemia del lobo frontale temporale (per ictus cerebrale, trauma orale o facciale, danno cerebrale congenito, trauma cranico, depressione del SNC, ipertensione endocranica, tumore della testa/collo/midollo spinale, ipossia cronica, riduzione della circolazione cerebrale. <ul style="list-style-type: none"> X Patologia del sistema nervoso (es miastenia grave, distrofia muscolare, malattia di Alzheimer) <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Paralisi delle corde vocali, tetraplegia <input type="checkbox"/> Compromissione della capacità di produrre il linguaggio (per compromissione respiratoria, dispnea, edema, infezione della laringe, deformità del cavo orale, labio/palatoschisi, mal occlusione o frattura mascellare, adentulia, disartria) <p>Trattamenti</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Compromissione della capacità di produrre il linguaggio (per intubazione endotracheale, tracheotomia, tracheostomia, laringectomia, intervento chirurgico cranico, al viso, al collo, alla bocca, dolore alla bocca o faringeo, depressione cognitiva da farmaci deprimenti il SNC/anestetici) <p>Situazionali (personali, ambientali)</p> <ul style="list-style-type: none"> X Diminuita attenzione (per affaticamento collera, ansia, o dolore) X Mancata disponibilità di apparecchio acustico o suo malfunzionamento X Barriere psicologiche (paura, timidezza) <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Mancanza di riservatezza X Barriera linguistica (non disponibilità di interprete) <p>Fasi di sviluppo</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Bambino (inadeguata stimolazione sensoriale) X Persona anziana (perdite uditive) X Compromissione cognitiva per (specificare patologia)
--



Concetto di se, disturbo del	X
<p>Fattori correlati</p> <p>Fisiopatologici</p> <p>X Variazioni dell'aspetto, dello stile di vita, di un ruolo o delle risposte altrui (per malattia cronica, dolore, trauma grave, perdita parti del corpo / funzioni organiche)</p> <p>Situazionali (personali, ambientali)</p> <p><input type="checkbox"/> Senso di abbandono/fallimento secondario a perdita del lavoro/della capacità di lavorare, divorzio, separazione o perdita di persona significativa</p> <p>X Immobilità o perdita di funzioni</p> <p><input type="checkbox"/> Rapporti insoddisfacenti parentali /coniugali</p> <p><input type="checkbox"/> Preferenze sessuali</p> <p><input type="checkbox"/> Gravidanza nel corso dell'adolescenza</p> <p><input type="checkbox"/> Differenza di sesso nell'educazione dei figli</p> <p><input type="checkbox"/> Esperienze di violenza da parte dei genitori</p> <p>X Cambiamento del consueto modello di responsabilità</p> <p>Fasi di sviluppo</p> <p>X Età di mezzo (perdita di ruoli/responsabilità)</p> <p>X Persona anziana (perdita di ruoli/responsabilità)</p>	

Confusione mentale acuta	X
<p>Fattori correlati</p> <p>Fattori di rischio</p> <p>Improvvisa insorgenza di ipossia cerebrale o disturbi del metabolismo cerebrale per</p> <p>X Squilibri idroelettrolitici (disidratazione, ipovolemia, acidosi/alcalosi, iper/ipo calcemia, ipopotassiemia, ipo/ipernatremia, ipo/iperglicemia)</p> <p>X Deficit nutrizionali (folati, vitamina B12, anemia, deficit niacina, deficit magnesio)</p> <p>X Disturbi cardiovascolari (infarto miocardio, insufficienza cardiaca congestizia, aritmie, blocco cardiaco, arterite temporale) ematoma subdurale)</p> <p>X Disordini respiratori (BPCO, embolia polmonare, TBC, polmonite)</p> <p>X Infezioni (sepsi, meningite, encefalite, infezione delle vie urinarie nell'anziano)</p> <p>X Disordini metabolici ed endocrini (iper/ipo tiroidismo, disfunzione ipofisaria, disturbi paratiroidei, del corticosurrene, ipotensione posturale, insufficienza epatica o renale)</p> <p><input type="checkbox"/> Disordini del SNC (ictus cerebrale, idrocefalo normoteso, infarti multipli cerebrale, tumore, trauma cranico, crisi convulsive e stati post convulsivi)</p> <p>Trattamenti</p> <p><input type="checkbox"/> Disturbo del metabolismo cerebrale per intervento chirurgico, intossicazione da farmaci, anestesia generale, astinenza da alcol, sedativi/ipnotici, metalli pesanti, monossido di carbonio, effetti collaterali dei farmaci (neurolettici/narcotici, anestesia generale, effetti collaterali da farmaci come diuretici, digitale, propanololo, atropina, ipoglicemizzanti, barbiturici, litio, fenitoina, acyclovir, anticolinergici, ecc)</p> <p>Situazionali (personali, ambientali)</p> <p>X Disturbo del metabolismo cerebrale per astinezza da alcool, sedativi, ipnotici, intossicazione da metalli pesanti o da monossido di carbonio.</p> <p>X Dolore, fecaloma, immobilità,</p> <p>x Depressione, situazioni non familiari</p> <p><input type="checkbox"/> Intossicazioni chimiche o da farmaci (cocaina, eroina, metanfetamine, metadone, altri stupefacenti...)</p>	



Contaminazione, rischio di (della persona, della comunità, della famiglia)	X
<p>Fattori correlati</p> <p>Fisiopatologici</p> <ul style="list-style-type: none"> X Presenza di batteri, virus, tossine X Fattori nutrizionali (obesità, deficienze di vitamine e sali minerali) X Stati patologici pre-esistenti <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Genere X Storia di fumo <p>Trattamenti</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Vaccinazioni recenti <input type="checkbox"/> Insufficiente o nessun uso di del protocollo di decontaminazione X Indumenti protettivi inappropriati o non utilizzati <p>Situazionali (personali, ambientali)</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Alluvioni, terremoti, disastri naturali. <input type="checkbox"/> Perdite rete fognaria <input type="checkbox"/> Emissioni da impianti industriali: scarichi intenzionali o accidentali di contaminanti da locali commerciali o industriali, inquinamento delle falde acquifere X Fattori fisici: condizioni climatiche, area geografica <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Fattori sociali: sovraffollamento carenza servizi igienici, povertà, inadeguate pratiche di igiene personale o della casa, mancato accesso all'assistenza sanitaria <input type="checkbox"/> Fattori biologici: presenza di vettori (zanzare, zecche, roditori) <input type="checkbox"/> Bioterrorismo X Tipo di lavoro X Pratiche dietetiche <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Contaminazione accidentale o intenzionale di riserve alimentari o idriche X Esposizioni concomitanti a metalli pesanti, sostanze chimiche, inquinanti atmosferici, radiazioni <p>Fasi di sviluppo</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Caratteristiche evolutive dei bambini <input type="checkbox"/> Bambini di età inferiore a 5 anni X Persone anziane <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Età gestazionale durante l'esposizione 	

Coping inadeguato della famiglia	X
<p>Fattori correlati</p> <p>Biofisiopatologici</p> <ul style="list-style-type: none"> X Compromissione della capacità di esercitare la responsabilità di ruolo per malattia acuta/cronica <p>Situazionali (personali, ambientali)</p> <ul style="list-style-type: none"> X Compromissione della capacità di gestire in modo costruttivo gli agenti stressanti (per dipendenza da sostanze, scarsa autostima, alcolismo, storia di relazioni inefficaci con i propri genitori, modelli di ruolo negativi, storia di relazioni abusive) <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Aspettative non realistiche dei genitori nei confronti di se stessi/dei figli <input type="checkbox"/> Aspettative non realistiche dei figli nei confronti di se stessi/dei genitori <input type="checkbox"/> Bisogni psicosociali non soddisfatti dai genitori / dai figli 	

Coping inefficace	X
<p>Fattori correlati</p> <p>Fisiopatologici</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Cronicità della condizione, variazioni biochimiche dell'encefalo (disordine della personalità, disordine bipolare, schizofrenia, disordine da scarsa attenzione) 	



- X Complessità del regime di autocura, variazioni neurologiche nell'encefalo (Morbo di Alzheimer, infarto cerebrale, sclerosi multipla, malattie in stadio terminale)
- Alterazione dell'integrità corporea (perdita di una parte del corpo, deturpazione)
 - Alterazione dello stato d'animo (per reazioni organiche, tumore cerebrale, assunzione di sostanze, reazioni organiche, ritardo mentale)

Trattamenti

- X Separazione dalla famiglia e dalla casa (ospedalizzazione, ricovero in struttura sanitaria residenziale, ecc)

Situazionali (personali, ambientali)

- Scarso controllo degli impulsi e bassa tolleranza alla frustrazione
- X Criticità delle relazioni con genitori/caregiver
 - Disorganizzazione del sistema familiare
 - Inefficace capacità di problem solving
 - Aumento del consumo di cibo per reazione allo stress
 - Modificazione dell'ambiente (per guerre, mancanza di alloggio, lavoro precario, , trasloco, povertà, disastro naturale)
 - Rottura legami affettivi (morte, separazione, diserzione, carcere, istituzionalizzazione, adozione/affidamento)
 - Sostegno insoddisfacente, sovraccarico sensoriale (ambiente di fabbrica, urbanizzazione, affollamento, inquinamento acustico, attività eccessiva)
- X Inadeguate risorse psicologiche (per scarsa autostima, considerazione di se negativa, senso di impotenza, mancanza di motivazione per reagire, modelli di ruolo negativi)

Fasi di sviluppo

- Bambino/adolescente: inadeguato controllo degli impulsi, panico, rifiuto da parte dei coetanei, abuso di sostanze da parte dei genitori, metodi disciplinari incoerenti, trauma infantile, rifiuto dei genitori, paura di insuccessi)
- Adolescente: modificazioni fisiche ed emozionali, relazioni sessuali, consapevolezza sessuale, scelte di carriera, indipendenza dalla famiglia, impegni scolastici.
- X Adulto giovane età: scelte di carriera, condizione di genitore, matrimonio, abbandono della casa dei genitori, esigenze formative.
- X Adulto mezza età: segni fisici di invecchiamento, bisogni relativi alla condizione sociale, problemi con i familiari, della cura dei figli, pressioni legate alla carriera, genitori anziani.
- X Persona anziana: inadeguatezza delle risorse psicologiche per modificazioni fisiche, reazioni degli altri verso l'anziano, pensionamento, cambiamento di residenza, di condizioni economiche

Cura di sé, deficit (alimentazione)

Incapacità di (specificare):

- X tagliare gli alimenti e/o aprire le confezioni
- X portare il cibo alla bocca

X

Fattori correlati

Fisiopatologici

- X Mancanza di coordinazione motoria per (specificare)
 - Spasticità o flaccidità per (specificare)
- X Debolezza muscolare per (specificare)
- X Paralisi per (specificare)
 - Atrofia per (specificare)
- X Contratture muscolari per (specificare)
- X Stato comatoso
- X Disturbi visivi
- X Arti non funzionanti o mancanti
 - Regressione a un precedente stadio di sviluppo
 - Comportamenti ritualistici
 - Deficit somatici

Trattamenti



<ul style="list-style-type: none"> X Uso di dispositivi esterni (apparecchio gessato, tutori ortopedici, infusione endovenosa...) X Affaticamento e dolore post operatori <p>Situazionali (personali, ambientali)</p> <ul style="list-style-type: none"> X Deficit cognitivi X Dolore <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Scarsa motivazione X Affaticamento X Confusione mentale <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Ansia che paralizza <p>Fasi di sviluppo</p> <ul style="list-style-type: none"> X Diminuita capacità motoria e visiva o a debolezza muscolare

<p>Cura di sé, deficit (bagno/igiene personale) Ridotta e/o incapacità di (specificare):</p> <ul style="list-style-type: none"> X lavare il proprio corpo o parti <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> procurarsi l'acqua <input type="checkbox"/> regolare la temperatura o il flusso dell'acqua X percepire il bisogno di cure igieniche 	X
---	----------

<p>Fattori correlati</p> <p>Fisiopatologici</p> <ul style="list-style-type: none"> X Mancanza di coordinazione motoria per (specificare) <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Spasticità o flaccidità per (specificare) X Debolezza muscolare per (specificare) <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Paralisi per (specificare) <input type="checkbox"/> Atrofia per (specificare) X Contratture muscolari per (specificare) X Stato comatoso X Disturbi visivi <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Arti non funzionanti o mancanti <input type="checkbox"/> Regressione a un precedente stadio di sviluppo <input type="checkbox"/> Comportamenti ritualistici <input type="checkbox"/> Deficit somatici <p>Trattamenti</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Uso di dispositivi esterni (apparecchio gessato, tutori ortopedici, infusione endovenosa...) X Affaticamento e dolore post operatori <p>Situazionali (personali, ambientali)</p> <ul style="list-style-type: none"> X Deficit cognitivi X Dolore <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Scarsa motivazione X Affaticamento X Confusione mentale <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Ansia che paralizza <p>Fasi di sviluppo</p> <ul style="list-style-type: none"> X Diminuita capacità motoria e visiva o a debolezza muscolare
--



<p>Cura di sé, deficit (bagno/igiene personale)</p> <p>Ridotta e/o incapacità di (specificare):</p> <ul style="list-style-type: none"> <input checked="" type="checkbox"/> mettersi o togliersi vestiti, allacciare i vestiti <input checked="" type="checkbox"/> curare il proprio aspetto <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> acquistare o cambiare capi di vestiario <input type="checkbox"/> o il flusso dell'acqua <input checked="" type="checkbox"/> percepire il bisogno di cure igieniche 	X
<p>Fattori correlati</p> <p>Fisiopatologici</p> <ul style="list-style-type: none"> <input checked="" type="checkbox"/> Mancanza di coordinazione motoria per (specificare) <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Spasticità o flaccidità per (specificare) <input checked="" type="checkbox"/> Debolezza muscolare per (specificare) <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Paralisi per (specificare) <input type="checkbox"/> Atrofia per (specificare) <input checked="" type="checkbox"/> Contratture muscolari per (specificare) <input checked="" type="checkbox"/> Stato comatoso <input checked="" type="checkbox"/> Disturbi visivi <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Arti non funzionanti o mancanti <input type="checkbox"/> Regressione a un precedente stadio di sviluppo <input type="checkbox"/> Comportamenti ritualistici <input type="checkbox"/> Deficit somatici <p>Trattamenti</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Uso di dispositivi esterni (apparecchio gessato, tutori ortopedici, infusione endovenosa...) <input checked="" type="checkbox"/> Affaticamento e dolore post operatori <p>Situazionali (personali, ambientali)</p> <ul style="list-style-type: none"> <input checked="" type="checkbox"/> Deficit cognitivi <input checked="" type="checkbox"/> Dolore <input checked="" type="checkbox"/> Scarsa motivazione <input checked="" type="checkbox"/> Affaticamento <input checked="" type="checkbox"/> Confusione mentale <input type="checkbox"/> Ansia che paralizza <p>Fasi di sviluppo</p> <ul style="list-style-type: none"> <input checked="" type="checkbox"/> Diminuita capacità motoria e visiva o a debolezza muscolare 	

<p>Cura di sé, deficit (eliminazione urinaria e fecale)</p> <p>Incapacità o mancanza di volontà per (specificare):</p> <ul style="list-style-type: none"> <input checked="" type="checkbox"/> servirsi del gabinetto/comoda <input checked="" type="checkbox"/> trasferirsi sul gabinetto/comoda <input checked="" type="checkbox"/> eseguire pratiche igieniche adeguate <input checked="" type="checkbox"/> pulire il gabinetto o la comoda <input checked="" type="checkbox"/> sistemare gli indumenti per servirsi del gabinetto 	X
<p>Fattori correlati</p> <p>Fisiopatologici</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Mancanza di coordinazione motoria per (specificare) <input type="checkbox"/> Spasticità o flaccidità per (specificare) <input checked="" type="checkbox"/> Debolezza muscolare per (specificare) <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Paralisi per (specificare) <input type="checkbox"/> Atrofia per (specificare) <input checked="" type="checkbox"/> Contratture muscolari per (specificare) <input checked="" type="checkbox"/> Stato comatoso <input checked="" type="checkbox"/> Disturbi visivi <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Arti non funzionanti o mancanti <input type="checkbox"/> Regressione a un precedente stadio di sviluppo 	



<input type="checkbox"/> Comportamenti ritualistici <input type="checkbox"/> Deficit somatici Trattamenti <input type="checkbox"/> Uso di dispositivi esterni (apparecchio gessato, tutori ortopedici, infusione endovenosa...) <input checked="" type="checkbox"/> Affaticamento e dolore post operatori Situazionali (personali, ambientali) <input checked="" type="checkbox"/> Deficit cognitivi <input checked="" type="checkbox"/> Dolore <input checked="" type="checkbox"/> Scarsa motivazione <input checked="" type="checkbox"/> Affaticamento <input checked="" type="checkbox"/> Confusione mentale <input type="checkbox"/> Ansia che paralizza Fasi di sviluppo <input checked="" type="checkbox"/> Diminuita capacità motoria e visiva o a debolezza muscolare

Cura di sé, deficit (strumentale) Difficoltà a (specificare) <input checked="" type="checkbox"/> usare il telefono <input type="checkbox"/> accedere ai mezzi di trasporto <input type="checkbox"/> lavare e stirare <input type="checkbox"/> preparare i pasti <input type="checkbox"/> fare la spesa <input type="checkbox"/> gestire il denaro <input checked="" type="checkbox"/> assumere i farmaci	X
--	----------

Fattori correlati Fisiopatologici <input checked="" type="checkbox"/> Mancanza di coordinazione motoria per (specificare) <input type="checkbox"/> Spasticità o flaccidità per (specificare) <input checked="" type="checkbox"/> Debolezza muscolare per (specificare) <input type="checkbox"/> Paralisi per (specificare) <input type="checkbox"/> Atrofia per (specificare) <input checked="" type="checkbox"/> Contratture muscolari per (specificare) <input checked="" type="checkbox"/> Stato comatoso <input checked="" type="checkbox"/> Disturbi visivi <input type="checkbox"/> Arti non funzionanti o mancanti <input type="checkbox"/> Regressione a un precedente stadio di sviluppo <input type="checkbox"/> Comportamenti ritualistici <input type="checkbox"/> Deficit somatiformi Trattamenti <input type="checkbox"/> Uso di dispositivi esterni (apparecchio gessato, tutori ortopedici, infusione endovenosa...) <input checked="" type="checkbox"/> Affaticamento e dolore post operatori Situazionali (personali, ambientali) <input checked="" type="checkbox"/> Deficit cognitivi <input checked="" type="checkbox"/> Dolore <input checked="" type="checkbox"/> Scarsa motivazione <input checked="" type="checkbox"/> Affaticamento <input checked="" type="checkbox"/> Confusione mentale <input type="checkbox"/> Ansia che paralizza Fasi di sviluppo <input checked="" type="checkbox"/> Diminuita capacità motoria e visiva o a debolezza muscolare
--

Deambulazione, compromissione, rischio Vedere mobilità, compromissione, rischio	X
--	----------



Deglutizione, compromissione	X
Fattori correlati	
Fisiopatologici	
<input type="checkbox"/> Diminuzione/assenza del riflesso faringeo, difficoltà di masticazione e riduzione della sensibilità (per paralisi cerebrale, miastenia grave, botulismo, M.di Parkinson, tumore crebrale, danno cerebrale, distrofia muscolare, S. di Guillain Barrè, poliomielite, SLA, ictus cerebrale, danno nervi cranici)	
<input type="checkbox"/> Tumore / edema tracheo-esofageo	
<input checked="" type="checkbox"/> Irritazione della cavità orofaringea	
<input checked="" type="checkbox"/> Diminuzione della salivazione	
Trattamenti	
<input type="checkbox"/> Ricostruzione chirurgica della bocca/faringe/mandibola/naso	
<input type="checkbox"/> Riduzione della coscienza per anestesia	
<input type="checkbox"/> Ostruzione meccanica secondaria a cannula tracheostomica	
<input checked="" type="checkbox"/> Esofagite da radioterapia	
Situazionali (personali, ambientali)	
<input checked="" type="checkbox"/> Alterazione del livello di coscienza	
<input checked="" type="checkbox"/> Fatigue	
Fasi di sviluppo	
<input type="checkbox"/> Bambino: diminuzione della sensibilità e difficoltà di masticazione, scarsa coordinazione tra suzione/deglutizione/respirazione	
<input checked="" type="checkbox"/> Persona anziana: riduzione della salivazione o del gusto	

Fatigue	X
Fattori correlati	
Fisiopatologici	
<input checked="" type="checkbox"/> Stato ipermetabolico (per malattie virali, febbre, gravidanza)	
<input checked="" type="checkbox"/> Inadeguata ossigenazione tissutale (per BPCO, insufficienza cardiaca, anemia, malattia vascolare periferica)	
<input checked="" type="checkbox"/> Alterazioni biochimiche (per malattie endocrine e metaboliche come diabete mellito, ipotiroidismo, malattie ipofisarie, AIDS, M Addison, cirrosi epatica, insufficienza renale)	
<input type="checkbox"/> Debolezza muscolare (per miastenia gravis, sclerosi multipla,, SLA, M. Parkinson, AIDS)	
<input type="checkbox"/> Stato ipermetabolico, competizione tra organismo e neoplasia per i nutrienti, anemia fattori di stress associati a tumore	
<input checked="" type="checkbox"/> Deficit nutrizionali o alterazioni del metabolismo dei nutrienti (per nausea, vomito, diarrea, effetti collaterali dei farmaci, intervento chirurgico allo stomaco, diabete mellito)	
<input checked="" type="checkbox"/> Processo infiammatorio cronico (per AIDS, artrite, Lupus eritematoso, epatite, Cirrosi Epatica, malattia infiammatoria intestinale, insufficienza renale)	
Trattamenti	
<input checked="" type="checkbox"/> Modificazioni biochimiche secondarie a chemioterapia, radioterapia, effetti collaterali di (specificare) danni tissutali da intervento chirurgico e anestesia,	
<input type="checkbox"/> Aumento del consumo energetico (per amputazione, alterazione dell'andatura, uso di deambulatore o stampelle)	
Situazionali (personali, ambientali)	
<input checked="" type="checkbox"/> Diminuzione prolungata dell'attività (per ansia, febbre, diarrea, dolore, isolamento sociale, nausea/vomito, depressione, obesità)	
<input type="checkbox"/> Eccessive richieste di ruolo	
<input type="checkbox"/> Richieste emozionali soverchianti	
<input checked="" type="checkbox"/> Stress emotivo	
<input checked="" type="checkbox"/> Disturbi del sonno	



Immagine corporea, Disturbo/Rischio di	X
<p>Fattori correlati</p> <p>Fisiopatologici</p> <p>X Variazioni dell'aspetto per malattia cronica, trauma grave, perdita di una parte del corpo, perdita di una funzione organica, invecchiamento</p> <p>Trattamenti</p> <p>X variazione dell'aspetto (per ricovero ospedaliero, radioterapia, chemioterapia, intervento chirurgico)</p> <p>Situazionali (personali, ambientali)</p> <p><input type="checkbox"/> Trauma fisico secondario a abuso sessuale, stupro, aggressione (specificare)</p> <p>X Effetti sull'aspetto di obesità, immobilità, gravidanza (specificare)</p>	

Immobilizzazione, sindrome da	X
<p>Fattori correlati</p> <p>Fisiopatologici</p> <p>X Riduzione del sensorio</p> <p>X Stato di incoscienza</p> <p><input type="checkbox"/> Compromissione neuromuscolare (per sclerosi multipla, paralisi parziale/totale, distrofia muscolare, sindrome di Guillain-Barrè, parkinsonismo, lesione del midollo spinale)</p> <p>X Compromissione muscolo-scheletrica (per fratture e malattie reumatiche)</p> <p>X Malattia terminale (AIDS, cardiopatia, nefropatia)</p> <p>X Cancro</p> <p>Disordini psichiatrici/della salute mentale (per depressione grave, stato catatonico, fobie gravi)</p> <p>Trattamenti</p> <p>X Intervento chirurgico</p> <p><input type="checkbox"/> Ventilazione meccanica</p> <p><input type="checkbox"/> Linee venose</p> <p><input type="checkbox"/> Trazione/gesso/tutore ortopedico</p> <p>X Immobilità prescritta</p> <p>Situazionali (personali, ambientali)</p> <p>X Depressione</p> <p>X Fatigue</p> <p>X Stato di debilitazione</p> <p>X Dolore</p> <p>Fasi di sviluppo</p> <p><input type="checkbox"/> Neonato/bambino/adolescente: sindrome Down, artrite giovanile, osteogenesi imperfetta, paralisi cerebrale, disabilità mentale/fisica, autismo, spina bifida</p> <p>X Persona anziana: ridotta agilità motoria, debolezza muscolare, demenza presenile</p>	

Incontinenza fecale	X
<p>Fattori correlati</p> <p>Fisiopatologici</p> <p><input type="checkbox"/> Compromissione dello sfintere rettale (per chirurgia anale/rettale, lesioni ostetriche, neuropatia periferica)</p> <p><input type="checkbox"/> Compromissione delle funzioni cognitive</p> <p><input type="checkbox"/> Iperdistensione rettale per stipsi cronica</p> <p>X Mancato controllo dello sfintere volontario (per malattia neuromuscolare progressiva, compressione/lesione del midollo spinale, ictus cerebrale, sclerosi multipla)</p> <p><input type="checkbox"/> Trattamenti</p> <p><input type="checkbox"/> Compromessa capacità del di fungere da serbatoio fecale per colectomia, proctite da radiazioni.</p>	



Situazionali (personali, ambientali)

- X Incapacità di riconoscere, interpretare o rispondere ai segnali intestinali (per depressione, compromissione delle funzioni cognitive)

Incontinenza urinaria da urgenza

X

Fattori correlati

Fisiopatologici

- X Diminuzione della capacità vescicale per infezione, malattie demielinizzanti, ictus cerebrale, trauma, uretrite, neuropatia diabetica, neuropatia alcolica, disturbi/lesioni neurologiche/tumori/infezioni, parkinsonismo

Trattamenti

- X Diminuzione della capacità vescicale per intervento chirurgico addominale,
- X Periodo successivo a cateterismo vescicale a permanenza

Situazionali (personali, ambientali)

- X Irritazione dei recettori vescicali da stiramento per uso di alcol, caffeina, eccessiva assunzione di liquidi
- X Diminuzione della capacità vescicale secondaria a minzioni frequenti

Fasi di sviluppo

- Bambino: limitata capacità vescicale
- X Persona anziana: diminuita capacità vescicale

Incontinenza urinaria funzionale

X

Fattori correlati

Fisiopatologici

- X Diminuzione di stimoli vescicali/compromessa capacità di riconoscerli per trauma, infezione, tumore cerebrale, parkinsonismo, sclerosi multipla, neuropatia alcolica, malattie demielinizzanti, ictus cerebrale, demenza progressiva

Trattamenti

- X Riduzione del tono vescicale per uso di antistaminici, terapia immunosoppressiva, adrenalina, diuretici, anticolinergici, tranquillanti, sedativi, miorilassanti

Situazionali (personali, ambientali)

- X Compromissione della mobilità
- X Diminuita attenzione nei confronti degli stimoli vescicali per depressione, soppressione intenzionale, confusione mentale
- X Barriere ambientali per l'accesso al bagno (gabinetto distante, letto troppo alto, scarsa illuminazione, spondine laterali, ambiente non familiare)

Fasi di sviluppo

- Persona anziana: perdite motorie/sensitive

Incontinenza urinaria totale (compromessa eliminazione urinaria)

X

Fattori correlati

Fisiopatologici

- Anomalie congenite delle vie urinarie
- X Diminuita capacità vescicale o irritazione vescicale per trauma, carcinoma, infezione uretrite, glicosuria
- X Diminuzione dei segnali vescicali o compromessa capacità di riconoscerli per infezione/tumore/lesione del midollo spinale, neuropatia diabetica/alcolica, malattie demielinizzanti, ictus cerebrale, parkinsonismo, lesione cerebrale, sclerosi multipla

Trattamenti

- Effetti del trattamento chirurgico sullo sfintere vescicale per prostatectomia, dissezione pelvica estensiva
- Strumentazione diagnostica
- X Riduzione del tono muscolare per anestesia generale o spinale, terapia farmacologica e iatrogenesi (farmaci miorilassanti, anestetici, diuretici, antistaminici,



<p>anticolinergici, immunodepressori, adrenalina, ansiolitici</p> <p>Situazionali (personali, ambientali)</p> <p>X Compromissione della mobilità</p> <p>X Diminuita attenzione nei confronti degli stimoli vescicali per depressione, soppressione intenzionale, confusione mentale</p> <p><input type="checkbox"/> Barriere ambientali per l'accesso al bagno (gabinetto distante, letto troppo alto, scarsa illuminazione, sponde laterali, ambiente non familiare)</p> <p>Fasi di sviluppo</p> <p>X Persona anziana: perdite motorie/sensitive</p>

Infezione, rischio di	X
<p>Fattori correlati</p> <p>Fisiopatologici</p> <p>X Compromissione delle difese dell'ospite per cancro, malattie respiratorie, ematologiche, periodontali, malattie epatiche, artrite, diabete mellito, malattie ereditarie, AIDS, alcolismo, immunosoppressione (secondaria a- specificare)</p> <p>X Compromissione della circolazione per linfedema, obesità, malattia vascolare periferica</p> <p>Trattamenti</p> <p><input type="checkbox"/> Sede di possibile invasione di microorganismi per intervento chirurgico, intubazione, linee invasive, nutrizione parenterale totale, dialisi, nutrizione enterale</p> <p>X Compromissione delle difese dell'ospite per terapia radiante, trapianto d'organo, terapia farmacologica (specificare)</p> <p>Situazionali (personali, ambientali)</p> <p>X Compromissione delle difese dell'ospite per malattie infettive, stress, malnutrizione, prolungata degenza in ospedale, fumo, prolungata immobilità</p> <p><input type="checkbox"/> Possibile sede di invasione di microorganismi per trauma accidentale/intenzionale, periodo postpartum, morso di insetto/animale/umano, lesione termica, ambiente caldo/umido/buio (apparecchio</p> <p><input type="checkbox"/> gessato, pieghe cutanee)</p> <p>x Contatto con agenti contaminanti (infezioni nosocomiali o di comunità)</p> <p>Fasi di sviluppo</p> <p><input type="checkbox"/> Neonato: maggiore vulnerabilità del neonato per madre HIV positiva, carenza di anticorpi materni, flora normale insufficiente, ferite aperte (ombelicale, circoncisione), sistema immunitario immaturo</p> <p><input type="checkbox"/> Bambino-adolescente: maggiore vulnerabilità per perdita dell'immunizzazione, molteplici partner sessuali</p> <p>X Persona anziana: maggiore vulnerabilità per diminuzione della risposta immunitaria, condizione debilitante, malattia cronica)</p>	

Insonnia	X
<p>Fattori correlati</p> <p>Fisiopatologici</p> <p>X Compromissione del trasporto di ossigeno (per angina, disturbi circolatori/respiratori, arteriosclerosi periferica)</p> <p>X Compromissione dell'eliminazione fecale o urinaria (per diarrea, disuria, ritenzione, incontinenza, stipsi, pollacchiuria)</p> <p>X Compromissione del metabolismo (per ipertiroidismo, disturbi epatici, ulcera gastrica)</p> <p>Situazionali (personali, ambientali)</p> <p><input type="checkbox"/> Eccessiva iperattività (per disturbo bipolare/ da deficit dell'attenzione, panico, uso di droghe)</p> <p>X Eccessivo dormire di giorno</p> <p>X Depressione</p> <p><input type="checkbox"/> Inadeguata attività fisica durante il giorno</p> <p>X Dolore cronico</p> <p>X Risposte ansiose</p>	



<ul style="list-style-type: none"> X Modifiche ambientali (specificare) X Paura <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Frequenti risvegli dei bambini <input type="checkbox"/> Donna adulta: variazioni ormonali (es. Perimenopausa)
--

Integrità cutanea/tissutale: compromissione, rischio	X
---	----------

Fattori correlati Fisiopatologici X Infiammazioni delle giunzioni dermo-epidermiche (per lupus eritematoso, sclerodermia,.

Integrità mucosa orale, compromissione	X
---	----------

Fattori correlati <ul style="list-style-type: none"> X Inadeguata igiene orale X Incapacità di provvedere all'igiene orale
--

Ipertermia	X
-------------------	----------

Fattori correlati Trattamenti <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Ridotta capacità di sudorazione (specificare il farmaco) Situazionali <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Esposizione al calore, al sole X Abbigliamento inadeguato al clima X Assenza di condizionamento dell'aria <input type="checkbox"/> Strumenti per il riscaldamento del neonato in ambito ospedaliero X Diminuzione della circolazione (per persona sovrappeso/sottopeso, disidratazione) X Idratazione insufficiente per un'attività fisica vigorosa Fasi di sviluppo <ul style="list-style-type: none"> X Inefficacia della termoregolazione secondaria all'età
--

Ipotermia	X
------------------	----------

Fattori correlati Situazionali (personali, ambientali) <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Esposizione a freddo, pioggia, neve, vento X Vestiario inadatto al clima <input type="checkbox"/> Impossibilità di pagare l'affitto o il riscaldamento X Diminuzione della circolazione (per persona sovrappeso/sottopeso, consumo di alcol, disidratazione, inattività) Fasi di sviluppo <ul style="list-style-type: none"> X Inefficacia della termoregolazione secondaria all'età (es. neonato, anziano)

Lesione, rischio di	X
----------------------------	----------

Fattori correlati Fisiopatologici <ul style="list-style-type: none"> X Alterazioni delle funzioni cerebrali per ipossia (vertigini, sincope) X Alterazioni della mobilità (ictus cerebrale, artrite, parkinsonismo, perdita di un arto, compromissione della vista/udito) X Fatica X Ipotensione ortostatica
--



<p>Trattamenti</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Insufficienza vertebro basilare <input type="checkbox"/> Disturbi vestibolari <input checked="" type="checkbox"/> Inadeguata consapevolezza dei rischi ambientali (confusione mentale) <input type="checkbox"/> Movimenti tonico-clonici (convulsioni) <input checked="" type="checkbox"/> Lungo allettamento <input checked="" type="checkbox"/> Effetti sulla mobilità/sensorio (sedativi, miorilassanti...specificare) <input type="checkbox"/> Gesso, stampelle, deambulatore, bastone <p>Situazionali (personali, ambientali)</p> <ul style="list-style-type: none"> <input checked="" type="checkbox"/> Diminuzione o perdita memoria a breve termine <input checked="" type="checkbox"/> Alterata capacità di giudizio (per stress, droghe, alcol, disidratazione, depressione) <input type="checkbox"/> Pericoli domestici (pavimenti sdruciolevoli, scale, illuminazione insufficiente, ingressi/corridoi non sicuri, bagno, giocattoli non sicuri, impianto elettrico difettoso, veleni conservati in modo improprio) <input type="checkbox"/> Pericoli legati all'uso dell'automobile (cinture, sedile di sicurezza per bambini, meccanica del veicolo non sicura) <input type="checkbox"/> Pericolo di incendio <input checked="" type="checkbox"/> Ambiente non familiare (es. Ospedale) <input checked="" type="checkbox"/> Scarpe inadatte, <input type="checkbox"/> Disattenzione del caregiver <input checked="" type="checkbox"/> Uso improprio degli ausili <input type="checkbox"/> Storia di incidenti <input checked="" type="checkbox"/> Andatura instabile <p>Fasi di sviluppo</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Bambino: inadeguata consapevolezza dei pericoli <input checked="" type="checkbox"/> Persona anziana: alterata capacità di giudizio (per deficit cognitivi), stile di vita sedentario, perdita di forza muscolare
--

Lesione da posizionamento perioperatorio, rischio	X
<p>Fattori correlati</p> <p>Fisiopatologici</p> <ul style="list-style-type: none"> <input checked="" type="checkbox"/> Aumentata vulnerabilità (per malattia cronica, cancro, corporatura esile, terapia radiante, osteoporosi, compromissione del sistema immunitario, disfunzione renale/epatica, infezione) <input checked="" type="checkbox"/> Compromissione della perfusione tissutale (per diabete mellito, anemia, ascite, malattia cardiovascolare, ipotermia, disidratazione, vasculopatia periferica, trombosi, edemi) <input type="checkbox"/> Vulnerabilità della stomia durante il posizionamento <input type="checkbox"/> Contratture preesistenti/alterazioni fisiche (artrite reumatoide, poliomielite) <p>Trattamenti</p> <ul style="list-style-type: none"> <input checked="" type="checkbox"/> Necessità di posizionamento e perdita delle abituali risposte sensoriali/protettive per anestesia <input checked="" type="checkbox"/> Procedure chirurgiche della durata di 2 o più ore <input type="checkbox"/> Vulnerabilità degli impianti/protesi durante il posizionamento <p>Situazionali (personali, ambientali)</p> <ul style="list-style-type: none"> <input checked="" type="checkbox"/> Compromissione circolatoria (obesità, consumo di tabacco, gravidanza, neonato, temperatura bassa in sala operatoria, anziano) <p>Fasi di sviluppo</p> <ul style="list-style-type: none"> <input checked="" type="checkbox"/> Aumentata vulnerabilità alle lesioni tissutali (condizione infantile, età avanzata) 	

Liquidi, eccessivo volume di	X
<p>Fattori correlati</p> <p>Fisiopatologici</p> <ul style="list-style-type: none"> <input checked="" type="checkbox"/> Compromissione dei meccanismi regolatori (per insufficienza renale acuta/cronica, disfunzioni endocrine, anomalie sistemiche metaboliche, lipoedema) 	



- X Ipertensione portale, diminuzione della pressione colloidale e ritenzione di sodio (per epatopatia, cancro, cirrosi, ascite)
- X Anomalie venose e arteriose (vene varicose, vasculopatia periferica, Trombosi, flebite, immobilità, linfoedema, infezioni, trauma, neoplasie)

Trattamenti

- X Ritenzione di sodio e acqua (terapia corticosteroidica)
 - Inadeguato drenaggio linfatico (mastectomia)

Situazionali (personali, ambientali)

- X Eccessivo apporto di sodio/liquidi
- X Inadeguato apporto proteico (dieta squilibrata, malnutrizione)
- X Ristagno venoso declive/venostasi (per immobilità, prolungata stazione eretta/posizione seduta, gesso/fasciatura stretta)
 - Compromissione venosa da utero gravido

Fasi di sviluppo

- X Persona anziana: compromissione del ritorno venoso per aumento delle resistenze periferiche e diminuzione dell'efficienza valvolare

Liquidi, insufficiente volume di

X

Fattori correlati

Fisiopatologici

- X Eccessiva emissione di urine (per diabete mellito insipido, diabete mellito scompensato)
 - Aumento della permeabilità capillare e evaporazione da ustioni
- X Perdite (febbre, aumento del metabolismo, drenaggio accentuato, ferite, peritonite, diarrea, menorragia)

Situazionali (personali, ambientali)

- X Vomito/nausea
 - X Diminuita motivazione a bere (depressione, fatigue)
 - X Dieta scorretta/digiuno
 - Nutrizione per sonda con soluzione concentrata
- X Difficoltà a deglutire/assumere alimenti (dolore orale, fatigue)
 - Esposizione a climi estremi
- X Perdita eccessiva (cateteri a permanenza, drenaggi)
 - Liquidi insufficienti in rapporto all'esercizio fisico/condizioni climatiche
- X Uso eccessivo di lassativi o clisteri, diuretici, alcol, caffeina

Fasi di sviluppo

- Bambino: aumentata vulnerabilità (ridotta riserva idrica, ridotta capacità di concentrazione delle urine)
- X Persona anziana: aumentata vulnerabilità a ridotta riserva idrica, ridotta sensazione di sete

Memoria, compromissione

X

Fattori correlati

Fisiopatologici

- X Alterazioni del SNC (per malattia cerebrale degenerativa, ictus cerebrale, lesione/trauma cranico)
- X Riduzione della quantità/qualità delle informazioni elaborate (per deficit visivi/uditivi, livello di istruzione, ridotte capacità intellettive, abitudini di apprendimento, benessere fisico insufficiente, affaticamento)
- X Deficienze nutrizionali

Trattamenti

- Effetti dei farmaci sulla memorizzazione delle informazioni

Situazionali (personali, ambientali)

- Aspettative che si auto realizzano
- X Eccessiva attenzione/preoccupazione per se stessi (per lutto, ansia, depressione)
- Consumo di alcol



- Mancanza di motivazione
- Inadeguata stimolazione
- Difficoltà di concentrazione (per stress, disturbi del sonno, dolore, inadeguata stimolazione intellettuale, distrazioni)

Mobilità, compromissione /rischio di

X

Fattori correlati

Fisiopatologici

- riduzione della forza e della resistenza per compromissione neuromuscolare (malattie autoimmunitarie, del sistema nervoso, respiratorie, distrofia muscolare, paralisi parziale, tumore del SNC, tumore, trauma, ipertensione endocranica, deficit sensoriale)
- riduzione della forza e della resistenza per compromissione muscoloscheletrica (fratture, malattie del tessuto connettivo, condizioni cardiache)
 - rigidità delle articolazioni o contratture (per malattia infiammatoria, interventi endoprotesi ortopedica articolare, malattia degenerativa delle articolazioni e del disco)
- edemi
- apparecchi esterni (gesso/splint, corsetto ortopedico, catetere venoso)
 - forza/resistenza insufficienti per la deambulazione (protesi, stampelle, deambulatore)

Situazionali (personali, ambientali)

- fatigue
- obesità
 - mancanza di motivazione
- dispnea
- dolore

Fasi di sviluppo

- Bambino: alterazione dell'andatura per deficienze scheletriche congenite, displasia congenita dell'anca, osteomielite
- Persona anziana: diminuzione dell'agilità e debolezza muscolare

Mobilità nel letto, mobilità con la sedia a rotelle, compromissione /rischio

Vedere mobilità, compromissione, rischio

X

Nausea

X

Fattori correlati

Fisiopatologici

- Trauma tissutale e spasmi muscolari riflessi (per gastroenterite acuta, ulcera gastrica, sindrome colon irritabile, pancreatite, infezioni, tossoinfezioni alimentari, intossicazioni da farmaci, calcolosi renale, crampi uterini, malessere da movimento, stress) (specificare)

Trattamenti

- Effetti della chemioterapia e/o farmaci
- Effetti dell'anestesia



Non adesione (a indicazioni terapeutiche)		X
Fattori correlati		
Fisiopatologici	<ul style="list-style-type: none"> <input checked="" type="checkbox"/> Compromessa capacità di prestazione a causa di una disabilità (scarsa memoria, deficit motori/sensitivi) <input checked="" type="checkbox"/> Aumento dei sintomi correlati alla malattia nonostante la precedente adesione al regime terapeutico consigliato 	
Trattamenti	<ul style="list-style-type: none"> <input checked="" type="checkbox"/> Effetti collaterali della terapia <input type="checkbox"/> Ambiente non terapeutico <input checked="" type="checkbox"/> Terapia complessa non controllata/prolungata <input type="checkbox"/> Costo economico della terapia <input type="checkbox"/> Pregresse esperienze di regime terapeutico consigliato inefficace <input type="checkbox"/> Processo di presa in carico impersonale (multi professionale) 	
Situazionali (personali, ambientali)	<ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Presenza di barriere per l'accesso (per problemi di mobilità/trasporto/economici, mancanza di assistenza per i figli, tempo inclemente) <input type="checkbox"/> Malattia concomitante di un membro della famiglia (mancato sostegno da parte della famiglia/amici/comunità) <input type="checkbox"/> Barriere all'assistenza secondarie a mancanza di alloggio <input type="checkbox"/> Modificazione dello stato lavorativo <input type="checkbox"/> Modificazione della copertura assicurativa per le spese sanitarie <input checked="" type="checkbox"/> Barriere alla comprensione (per deficit cognitivi/visivi/uditivi, difficoltà di memoria, ansia, fatigue, ridotta attenzione, problemi motivazionali) 	

Nutrizione inferiore al fabbisogno, rischio di		X
Fattori correlati		
Fisiopatologici	<ul style="list-style-type: none"> <input checked="" type="checkbox"/> Aumentato fabbisogno calorico e difficoltà ad assumere sufficienti calorie (per ustione, trauma, complicanze/deformazioni gastrointestinali, cancro, alcolismo, uso di sostanze stupefacenti, infezione, AIDS) <input checked="" type="checkbox"/> Disfagia (per ictus cerebrale, M.di Parkinson, palatoschisi, distrofia muscolare, paralisi cerebrale, paralisi facciale, SLA, disturbi neuromuscolari) <input checked="" type="checkbox"/> Diminuito assorbimento di nutrienti (per M.di Crohn, enterocolite necrotizzante, intolleranza al lattosio, fibrosi cistica) <input checked="" type="checkbox"/> Diminuzione dell'appetito (per alterazioni dello stato di coscienza) <input type="checkbox"/> Vomito autoindotto, esercizio fisico eccessivo in rapporto alle calorie assunte, anoressia <input checked="" type="checkbox"/> Rifiuto ad alimentarsi (timore di essere avvelenato/ comportamento paranoico) <input checked="" type="checkbox"/> Inappetenza/agitazione fisica (per disturbo bipolare) <input type="checkbox"/> Inappetenza e diarrea (per infezione da protozoi) <input checked="" type="checkbox"/> Vomito, inappetenza e alterazioni della digestione (per pancreatite) <input checked="" type="checkbox"/> Inappetenza e compromissione del metabolismo proteico/lipidico, ipovitaminosi (per cirrosi epatica) <input checked="" type="checkbox"/> Inappetenza, vomito e alterazione della digestione (per malformazioni del tratto gastrointestinale /enterocolite necrotizzante) <input checked="" type="checkbox"/> Inappetenza per reflusso gastroesofageo 	
Trattamenti	<ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Aumentato fabbisogno proteico/vitaminico per la cicatrizzazione di ferite e diminuita assunzione (per intervento chirurgico, farmaci, blocco mandibolare, radioterapia) <input checked="" type="checkbox"/> Inadeguato assorbimento come effetto collaterale di farmaci (specificare) <input type="checkbox"/> Diminuita assunzione orale, dolore in sede orale, nausea, vomito (per radioterapia, chemioterapia, tonsillectomia) 	
Situazionali (personali, ambientali)		



<p>Fasi di sviluppo</p>	<p>X Diminuzione dell'appetito (per nausea, vomito, isolamento sociale, stress, depressione, allergie)</p> <p><input type="checkbox"/> Incapacità di procurarsi gli alimenti (per limitazioni fisiche, problemi finanziari/ di trasporto)</p> <p>X Incapacità di masticare (per adentulia, carie, protesi non adatta)</p> <p>X Diarrea</p> <p><input type="checkbox"/> Neonato/bambino: inadeguata assunzione (per carente stimolazione sensoriale, inadeguate conoscenze del care giver, scarsa produzione del latte materno)</p> <p>X Malassorbimento, restrizioni dietetiche, inappetenza (per morbo celiaco, fibrosi cistica, intolleranza al lattosio, malformazioni gastrointestinali, reflusso gastroesofageo, enterocolite necrotizzante)</p> <p><input type="checkbox"/> Difficoltà di suzione/disfagia (per paralisi, labioschisi, palatoschisi)</p> <p><input type="checkbox"/> Inadeguata suzione, astenia e dispnea (per cardiopatia congenita, iperbilirubinemia, sindrome virale, distress respiratorio, prematurità, ritardo di sviluppo)</p>
--------------------------------	---

Nutrizione superiore al fabbisogno		X
<p>Fattori correlati</p> <p>Fisiopatologici</p> <p><input type="checkbox"/> Alterato modello di sazietà (specificare)</p> <p><input type="checkbox"/> Riduzione dei sensi di gusto/olfatto</p> <p>Trattamenti</p> <p>X Alterazione del senso di sazietà (per farmaci, radiazioni)</p> <p>Situazionali (personali, ambientali)</p> <p><input type="checkbox"/> Rischio di aumento ponderale in gravidanza superiore a 12/13 Kg</p> <p><input type="checkbox"/> Deficit di conoscenze delle basi nutrizionali</p> <p>Fasi di sviluppo</p> <p>X Adulto/persona anziana: diminuzione del modello di attività /di fabbisogno metabolico</p>		

Respirazione, inefficace funzionalità, rischio		X
<p>Fattori correlati</p> <p>Fisiopatologici</p> <p>X Secrezioni eccessive o dense (per infezione, infiammazione, allergia, patologie cardiopolmonari, fumo)</p> <p>X Immobilità stasi delle secrezioni, tosse inefficace (per malattie del SN, depressione del SNC/trauma cranico, ictus cerebrale, tetraplegia)</p> <p>Trattamenti</p> <p>X Immobilità (per effetto sedativo di farmaci, droghe o sostanze chimiche, anestesia)</p> <p><input type="checkbox"/> Soppressione del riflesso della tosse</p> <p><input type="checkbox"/> Effetti della tracheostomia (alterazione delle secrezioni)</p> <p>Situazionali (personali, ambientali)</p> <p>X Immobilità (per intervento chirurgico/trauma, compromissione percettiva/cognitiva, fatigue, dolore, paura, ansia)</p> <p><input type="checkbox"/> Livello di umidità estremamente alto/basso (posizione prona nel sonno, esposizione a freddo, pianto, riso, allergeni, fumo)</p>		

Stipsi		X
<p>Fattori correlati</p> <p>Fisiopatologici</p> <p><input type="checkbox"/> Innervazione difettosa, debolezza della muscolatura pelvica immobilità (per lesioni/traumi del midollo spinale, spina bifida, ictus cerebrale, malattia neurologica, demenza)</p>		



X Riduzione del metabolismo (per ipotiroidismo, iper paratiroidismo, obesità, feocromocitoma, uremia, neuropatia diabetica, ipo pituitarismo)

X Diminuita risposta al bisogno di defecare (disturbi dell'umore)

X Dolore alla defecazione (per emorroidi, lesione dorsale)

X Diminuita peristalsi secondaria a ipossia cardiaca/polmonare

Disturbi della mobilità secondari a sindrome da intestino irritabile

Incapacità di rilassare lo sfintere anale e elevata pressione a riposo nel canale anale (parti vaginali multipli, sforzo cronico)

Trattamenti

X Effetti collaterali di farmaci (specificare)

X Effetti sulla peristalsi dell'anaestesia e della manipolazione chirurgica

X Uso abituale di lassativi

Mucosite secondaria a radiazioni

Situazionali (personali, ambientali)

X Diminuzione della peristalsi (per immobilità, gravidanza, stress, mancanza di esercizio fisico)

X Modello di evacuazione irregolare

Credenze culturali/sulla salute

X Mancanza di riservatezza

X Dieta priva di scorie, assunzione di liquidi inadeguata

Paura di dolore rettale o cardiaco

Valutazioni errate

X Incapacità di percepire i segnali intestinali

Stress, sovraccarico psicofisico

X

Fattori correlati

Fisiopatologici

X Necessità di far fronte a malattie acute, croniche, terminali, nuove diagnosi, condizioni deturpanti

Situazionali (personali, ambientali)

Perdita reale o prevista di una persona significativa (per morte, divorzio, trasloco, servizio militare)

Necessità di far fronte a morte, aggressione, guerra

Variazione reale o percepita dello stato socio- economico (per disoccupazione, promozione, nuovo lavoro, pensionamento, distruzione di proprietà personali, perdita/cambiamento della casa, malattia)

Necessità di far fronte a violenza in famiglia, abuso di sostanza, nuovo componente familiare, problemi relazionali

X Perdite funzionali



Allegato 3

PROBLEMI COLLABORATIVI PRELEVALEMENTEMENTE TRATTATI

Selezionare (X) le caselle relative ai problemi collaborativi di interesse
(riferimenti bibliografici: L.J.Carpenito-Diagnosi infermieristiche - 5th. ed. C.E.A. Edizioni, 2010)

Rischio di complicanze (RC) per disfunzione cardiaca/ vascolare	
RC per emorragia	X
RC per riduzione della gittata cardiaca	X
RC per aritmie	X
RC per edema polmonare	X
RC per trombosi venosa profonda	X
RC per ipovolemia	X
RC per sindrome compartimentale	X
RC per embolia polmonare	X
Rischio di complicanze (RC) per disfunzione respiratoria	
RC per ipossiemia	X
Rischio di complicanze (RC) per disfunzione metabolica/immunitaria/ematopoietica	
RC per ipo/iperglicemia	X
RC per bilancio azotato negativo	X
RC per squilibri elettrolitici	X
RC per sepsi	X
RC per acidosi (metabolica, respiratoria)	X
RC per alcalosi (metabolica, respiratoria)	X
RC per reazione allergica	X
Rischio di complicanze (RC) per disfunzione renale / urinaria	
RC per ritenzione urinaria acuta	X
RC per insufficienza renale	X
RC per calcoli renali	X



Rischio di complicanze (RC) per disfunzione gastrointestinale / epatica / biliare	
RC per ileo paralitico	X
RC per sanguinamento gastrointestinale	X
RC per disfunzione epatica	X
RC per iperbilirubinemia	X
Rischio di complicanze (RC) per effetti avversi (EA) della terapia farmacologica	
RC per effetti avversi della terapia con farmaci anticoagulanti	X
RC per effetti avversi della terapia con farmaci ansiolitici	X
RC per effetti avversi della terapia con farmaci adrenocorticosteroidi	X
RC per effetti avversi della terapia con farmaci antineoplastici	X
RC per effetti avversi della terapia con farmaci antiaritmici	X
RC per effetti avversi della terapia con farmaci antipertensivi	X
RC per effetti avversi della terapia con farmaci betabloccanti	X
RC per effetti avversi della terapia con farmaci calcioantagonisti	X
RC per effetti avversi della terapia con farmaci inibitori dell'enzima di conversione dell'angiotensina	X
RC per effetti avversi della terapia con farmaci inibitori dei recettori dell'angiotensina	X
RC per effetti avversi della terapia con farmaci diuretici	X



Allegato 4

APPRENDIMENTO OFFERTO

In relazione alle diagnosi infermieristiche / problemi collaborativi sopra indicati, descrivere le opportunità formative per lo studente che caratterizzano la sede di apprendimento. Esempio: interventi assistenziali infermieristici, modelli organizzativi e/o di presa in carico assistenziale, attività di ricerca e innovazione.

- Accoglienza mirata del paziente che accede nel reparto in base all'ipotesi diagnostica, alla tipologia di ricovero, alle differenti complessità assistenziali.
- Individuazione di segni e sintomi di possibili complicanze di un paziente con IRA, IRC in trattamento dialitico, con trapianto renale (iperpotassiemia, iponatremia, aritmie, alterazione della diuresi, alterazione dello stato di coscienza, ipertensione, anemizzazione, iper o ipoglicemie, iperazotemia.... Prevenzione delle complicanze e interventi d'urgenza.
- Assistenza del paziente durante tutto il suo percorso, dal ricovero alla dimissione.
- Preparazione e assistenza del paziente prima, durante e dopo l'esecuzione di: Biopsia Renale, ecodoppler, TAC con m.d.c., seduta dialitica (emodialisi o dialisi peritoneale); conoscenza dei protocolli assistenziali relativi alla fase pre e post dialitica, dei diversi tipi di dialisi, degli accessi vascolari per Dialisi e della loro gestione, delle complicanze alle quali possono andare incontro e della loro prevenzione.
- Applicazione dei programmi terapeutici quali: diuretici, antiipertensivi, immunosoppressori, cortisonici, chelanti del fosforo, eritropoietina, anticoagulanti. Conoscenza e gestione degli eventuali effetti collaterali e tossici dei farmaci.



- Valutazione della compliance del paziente in relazione all'assunzione delle terapie e all'effettuazione degli esami diagnostici.
- Attuazione degli interventi assistenziali per prevenire o trattare complicanze nei pazienti con cateteri venosi centrali (Catetere di Tesio o femorale per dialisi), cateteri periferici, fistola artero-venosa.
- Riconoscimento e gestione delle situazioni acute critiche quali: EPA, iperazotemia, iperpotassiemia, anuria, anemie, allergie da farmaci, shock ipovolemico, arresto cardio-circolatorio, broncospasmo, ecc.
- Educazione sanitaria nei confronti dei pazienti, relativa al cambiamento dello stile di vita in rapporto all'inizio della dialisi o al trapianto (dieta, terapie a domicilio, inizio terapia insulinica, controlli da farsi, pulizia, vacanze, accettazione e assunzione della terapia, aiuti vari che si possono ricevere a domicilio, trasporto da e per il centro dialisi.
- Conoscenza e sperimentazione dell'organizzazione per piccole equipe.
- Possibilità di dedicarsi a lavori di studio guidato e di ricerca.