



Allegato 1

Problemi di salute / Problemi clinici / Percorso diagnostico terapeutici prevalentemente trattati

Selezionare (X) i problemi di salute prevalenti e indicare le patologie più frequenti

Dipendenze patologiche	X
Potus	
Malattie Cardiovascolari	X
Scompenso cardiaco, aritmie cardiache	
Malattie Cerebrovascolari	X
Demenze senili, morbo di Parkinson, vasculiti	
Malattie Endocrinologiche, metaboliche	X
Diabete, ipo - ipertiroidismo	
Malattie Intestinali / digestive	X
Morbo di Chron, rettocolite ulcerosa	
Malattie Infettive	X
Klebsiella pneumoniae, clostridium difficile, M.R.S.A. , HIV, epatite B, epatite C	
Malattie Nefrologiche, genito/urinarie	X
IRA, IRC, pielonefriti, IVU, glomerulo nefriti, malattie autoimmuni, amiloidosi, vasculiti, complicanze dialitiche (emodialisi e dialisi peritoneale).	
Malattie Respiratorie	X
Bpco, versamento pleurico, enfisema polmonare, polmoniti	
Salute Mentale	X
Sindrome bipolare, depressione,	
Altro (specificare)	X
Amputazioni arti inferiori	



Allegato 2

Diagnosi Infermieristiche prevalentemente trattate

Selezionare (X) le caselle relative alle Diagnosi Infermieristiche e ai fattori correlati di interesse (riferimenti bibliografici: L.J.Carpenito-Diagnosi infermieristiche – 6th. ed. C.E.A. Edizioni, 2015)

Ansia	X
<p>Fattori correlati</p> <p>Fisiopatologici</p> <p>X Qualsiasi fattore che interferisca con i bisogni relativi ad alimentazione, respirazione, comfort, sicurezza</p> <p>Situazionali (personali, ambientali)</p> <p>X Minaccia reale o percepita al concetto di sé (fallimento, modificazione dello status, mancato riconoscimento da parte degli altri...)</p> <p>X Minaccia reale o percepita all'integrità biologica (per malattia, violenza, procedure invasive, stato terminale)</p>	
Aspirazione, rischio di	X
<p>Fattori correlati</p> <p>Fisiopatologici</p> <p>X Riduzione del livello di coscienza (per demenza pre-senile, trauma cranico, ictus cerebrale, M.di Parkinson, induzione da alcol/sostanze, coma, convulsioni, anestesia)</p> <p>X Depressione del riflesso della tosse/faringeo</p> <p>X Compromissione della deglutizione o diminuzione dei riflessi laringeo/glottico (per acalasia, condizioni debilitanti, miastenia grave, catatonìa, Mdi Parkinson, stenosi esofagea, ictus cerebrale, sclerosi multipla, sclerodermia, distrofia muscolare, sindrome di Guillain Barrè)</p> <p>Situazionali (personali, ambientali)</p> <p>X Incapacità/difficoltà di sollevare la parte superiore del corpo</p> <p>X Persona anziana: dentizione inadeguata</p>	
Cadute, rischio	X
<p>Vedere lesione, rischio</p>	
Concetto di se, disturbo del	X
<p>Fattori correlati</p> <p>Fisiopatologici</p> <p>X Variazioni dell'aspetto, dello stile di vita, di un ruolo o delle risposte altrui (per malattia cronica, dolore, trauma grave, perdita parti del corpo / funzioni organiche)</p> <p>Fasi di sviluppo</p> <p>X Età di mezzo (perdita di ruoli/responsabilità)</p> <p>X Persona anziana (perdita di ruoli/responsabilità)</p>	

Confusione mentale acuta	X
<p>Fattori correlati</p> <p>Fattori di rischio</p> <p>Improvvisa insorgenza di ipossia cerebrale o disturbi del metabolismo cerebrale per</p> <ul style="list-style-type: none"> X Squilibri idroelettrolitici (disidratazione, ipovolemia, acidosi/alcalosi, iper/ipo calcemia ipopotassiemia, ipo/iper natremia, ipo/iper glicemia) X Deficit nutrizionali (folati, vitamina B12, anemia, deficit niacina, deficit magnesio) X Disturbi cardiovascolari (infarto miocardio, insufficienza cardiaca congestizia, aritmie, blocco cardiaco, arterite temporale) ematoma subdurale) X Disordini respiratori (BPCO, embolia polmonare, TBC, polmonite) X Infezioni (sepsi, meningite, encefalite, infezione delle vie urinarie nell'anziano) X Disordini metabolici ed endocrini (iper/ipo tiroidismo, disfunzione ipofisaria, disturbi paratiroidi, del corticosurrene, ipotensione posturale, insufficienza epatica o renale) <p>Situazionali (personali, ambientali)</p> <ul style="list-style-type: none"> X Disturbo del metabolismo cerebrale per astinenza da alcool, sedativi, ipnotici, intossicazione da metalli pesanti o da monossido di carbonio. X Dolore, fecaloma, immobilità, X Depressione, situazioni non familiari 	
Cura di sé, deficit (alimentazione)	X
<p>Incapacità di (specificare):</p> <ul style="list-style-type: none"> X tagliare gli alimenti e/o aprire le confezioni X portare il cibo alla bocca 	
<p>Fattori correlati</p> <p>Fisiopatologici</p> <ul style="list-style-type: none"> X Mancanza di coordinazione motoria per (specificare) X Debolezza muscolare per (specificare) X Disturbi visivi X Arti non funzionanti o mancanti X Regressione a un precedente stadio di sviluppo <p>Situazionali (personali, ambientali)</p> <ul style="list-style-type: none"> X Deficit cognitivi X Dolore X Confusione mentale <p>Fasi di sviluppo</p> <ul style="list-style-type: none"> X Diminuita capacità motoria e visiva o a debolezza muscolare 	
Cura di sé, deficit (bagno/igiene personale)	X
<p>Ridotta e/o incapacità di (specificare):</p> <ul style="list-style-type: none"> X lavare il proprio corpo o parti X percepire il bisogno di cure igieniche 	
<p>Fattori correlati</p> <p>Fisiopatologici</p> <ul style="list-style-type: none"> X Mancanza di coordinazione motoria per (specificare) X Spasticità o flaccidità per (specificare) X Debolezza muscolare per (specificare) X Disturbi visivi X Arti non funzionanti o mancanti 	



<p>Trattamenti X Affaticamento e dolore post operatori</p> <p>Situazionali (personali, ambientali) X Deficit cognitivi X Dolore X Scarsa motivazione X Affaticamento X Confusione mentale X Ansia che paralizza</p> <p>Fasi di sviluppo X Diminuita capacità motoria e visiva o a debolezza muscolare</p>	
<p>Cura di sé, deficit (eliminazione urinaria e fecale) Incapacità o mancanza di volontà per (specificare): X servirsi del gabinetto/comoda X trasferirsi sul gabinetto/comoda X eseguire pratiche igieniche adeguate X pulire il gabinetto o la comoda X sistemare gli indumenti per servirsi del gabinetto</p>	X
<p>Fattori correlati</p> <p>Fisiopatologici X Mancanza di coordinazione motoria per (specificare) X Spasticità o flaccidità per (specificare) X Debolezza muscolare per (specificare) X Disturbi visivi X Arti non funzionanti o mancanti</p> <p>Trattamenti X Affaticamento e dolore post operatori</p> <p>Situazionali (personali, ambientali) X Deficit cognitivi X Dolore X Scarsa motivazione X Affaticamento X Confusione mentale X Ansia che paralizza</p> <p>Fasi di sviluppo X Diminuita capacità motoria e visiva o a debolezza muscolare</p>	
<p>Deambulazione, compromissione, rischio Vedere mobilità, compromissione, rischio</p>	X
<p>Deglutizione, compromissione</p> <p>Fattori correlati</p> <p>Fisiopatologici X Diminuzione/assenza del riflesso faringeo, difficoltà di masticazione e riduzione della sensibilità (per paralisi cerebrale, miastenia grave, botulismo, M.di Parkinson, tumore cerebrale, danno cerebrale, distrofia muscolare, S. di Guillain Barrè, poliomielite, SLA, ictus cerebrale, danno nervi cranici)</p> <p>Situazionali (personali, ambientali) X Alterazione del livello di coscienza</p>	X



<p>X Fatigue</p> <p>Fasi di sviluppo</p> <p>X Persona anziana: riduzione della salivazione o del gusto</p>	
Dolore acuto (Grave fastidio o disagio che dura da 0 a 6 mesi)	X
<p>Fattori correlati</p> <p>Fisiopatologici</p> <p>Trauma tissutale e spasmi muscolari riflessi secondari a</p> <ul style="list-style-type: none"> X Disordini vascolari (vasospasmo, occlusione, flebite, vasodilatazione/cefalea). X Fatigue, malessere o prurito secondari a malattie infettive (rosolia, pancreatite, epatite, mononucleosi, varicella) <p>Trattamenti</p> <ul style="list-style-type: none"> X Trauma tissutale e spasmi muscolari riflessi (per intervento chirurgico, ustione, indagini diagnostiche/venipuntura/biopsia, scansiomertria invasiva) <p>Situazionali (personali, ambientali)</p> <ul style="list-style-type: none"> X Febbre X Immobilità/posizionamento inappropriato 	
Dolore cronico (Continuo/ intermittente che dura da più di 6 mesi)	X
<p>Fattori correlati</p> <p>Fisiopatologici</p> <p>Trauma tissutale e spasmi muscolari riflessi secondari a</p> <ul style="list-style-type: none"> X Disordini muscolo scheletrici (fratture, artrite, contrattura muscolare, spasmi, patologia a carico del midollo spinale) X Disordini viscerali (cardiaci, renali, epatici, intestinali, polmonari) X Disordini vascolari (vasospasmo, occlusione, flebite, vasodilatazione/cefalea) 	
Eliminazione urinaria compromessa	X
<p>Per Incontinenza urinaria (specificare):</p> <ul style="list-style-type: none"> X Totale (continua, senza presenza di distensione della vescica e/o ritenzione di urine) X Da sforzo (perdita involontaria di urine per aumento della pressione addominale) X Da urgenza (perdita involontaria di urine per urgenza minzionale) X Funzionale (per incapacità di raggiungere in tempo il gabinetto) X Riflessa (senza sensazione di pienezza vescicale o urgenza minzionale) X Da rigurgito (presenza di distensione della vescica e/o ritenzione di urine) 	
<p>Fattori correlati</p> <p>Fisiopatologici</p> <ul style="list-style-type: none"> X Diminuita capacità vescicale/irritazione vescicale (per infezione, glicosuria, carcinoma, uretrite, trauma) X Diminuzione dei segnali vescicali o del loro riconoscimento (per infezioni/tumori/lesioni midollo spinale, neuropatia alcolica e/o diabetica, malattie demielinizzanti, ictus cerebrale, parkinsonismo, sclerosi multipla, farmaci alfa adrenergici) 	



Immagine corporea, Disturbo/Rischio di	X
<p>Fattori correlati</p> <p>Fisiopatologici</p> <p>X Variazioni dell'aspetto per malattia cronica, trauma grave, perdita di una parte del corpo, perdita di una funzione organica, invecchiamento</p> <p>Trattamenti</p> <p>X variazione dell'aspetto (per ricovero ospedaliero, radioterapia, chemioterapia, intervento chirurgico)</p>	
Immobilizzazione, sindrome da	X
<p>Fattori correlati</p> <p>Fisiopatologici</p> <p>X Riduzione del sensorio</p> <p>X Stato di incoscienza</p> <p>X Compromissione neuromuscolare (per sclerosi multipla, paralisi parziale/totale, distrofia muscolare, sindrome di Guillain-Barrè, parkinsonismo, lesione del midollo spinale)</p> <p>X Compromissione muscolo-scheletrica (per fratture e malattie reumatiche)</p> <p>X Malattia terminale (AIDS, cardiopatia, nefropatia)</p> <p>X Disordini psichiatrici/della salute mentale (per depressione grave, stato catatonico, fobie gravi)</p> <p>Situazionali (personali, ambientali)</p> <p>X Depressione</p> <p>X Fatigue</p> <p>X Stato di debilitazione</p> <p>X Dolore</p> <p>Fasi di sviluppo</p> <p>X Persona anziana: ridotta agilità motoria, debolezza muscolare, demenza presenile</p>	
Incontinenza fecale	X
<p>Fattori correlati</p> <p>Fisiopatologici</p> <p>X Mancato controllo dello sfintere volontario (per malattia neuromuscolare progressiva, compressione/lesione del midollo spinale, ictus cerebrale, sclerosi multipla).</p> <p>Situazionali (personali, ambientali)</p> <p>X Incapacità di riconoscere, interpretare o rispondere ai segnali intestinali (per depressione, compromissione delle funzioni cognitive)</p>	
Infezione, rischio di	X
<p>Fattori correlati</p> <p>Fisiopatologici</p> <p>X Compromissione delle difese dell'ospite per cancro, malattie respiratorie, ematologiche, periodontali, malattie epatiche, artrite, diabete mellito, malattie ereditarie, AIDS, alcolismo, immunosoppressione (secondaria a- specificare)</p> <p>X Compromissione della circolazione per linfedema, obesità, malattia vascolare periferica</p>	



<p>Trattamenti</p> <ul style="list-style-type: none"> X Sede di possibile invasione di microorganismi per intervento chirurgico, intubazione, linee invasive, nutrizione parenterale totale, dialisi, nutrizione enterale X Compromissione delle difese dell'ospite per terapia radiante, trapianto d'organo, terapia farmacologica (specificare) <p>Situazionali (personali, ambientali)</p> <ul style="list-style-type: none"> X Compromissione delle difese dell'ospite per malattie infettive, stress, malnutrizione, prolungata degenza in ospedale, fumo, prolungata immobilità X Contatto con agenti contaminanti (infezioni nosocomiali o di comunità) <p>Fasi di sviluppo</p> <ul style="list-style-type: none"> X Persona anziana: maggiore vulnerabilità per diminuzione della risposta immunitaria, condizione debilitante, malattia cronica) 	
Insonnia	X
Integrità cutanea/tissutale:compromissione, rischio	X
<p>Fattori correlati</p> <p>Fisiopatologici</p> <ul style="list-style-type: none"> X Infiammazioni delle giunzioni dermo-epidermiche (per lupus eritematoso, sclerodermia,. 	
Integrità mucosa orale, compromissione	X
<p>Fattori correlati</p> <ul style="list-style-type: none"> X Inadeguata igiene orale X Incapacità di provvedere all'igiene orale 	
Ipertermia	X
Lesione, rischio di	X
<p>Fattori correlati</p> <p>Fisiopatologici</p> <ul style="list-style-type: none"> X Alterazioni delle funzioni cerebrali per ipossia (vertigini,sincope) X Alterazioni della mobilità (ictus cerebrale, artrite, parkinsonismo, perdita di un arto, compromissione della vista/udito) X Fatigue X Disturbi vestibolari X Inadeguata consapevolezza dei rischi ambientali (confusione mentale) <p>Trattamenti</p> <ul style="list-style-type: none"> X Lungo allettamento X Effetti sulla mobilità/sensorio (sedativi, miorilassanti...specificare) X Gesso, stampelle, deambulatore, bastone <p>Situazionali (personali, ambientali)</p> <ul style="list-style-type: none"> X Alterata capacità di giudizio (per stress, droghe, alcol, disidratazione, depressione) X Scarpe inadatte, X Uso improprio degli ausili X Andatura instabile 	

Fasi di sviluppo

- X Persona anziana: alterata capacità di giudizio (per deficit cognitivi), stile di vita sedentario, perdita di forza muscolare

Liquidi, eccessivo volume di
X

Fattori correlati

Fisiopatologici

- X Compromissione dei meccanismi regolatori (per insufficienza renale acuta/cronica, disfunzioni endocrine, anomalie sistemiche metaboliche, lipoedema)
- X Ipertensione portale, diminuzione della pressione colloidale-osmotica e ritenzione di sodio (per epatopatia, cancro, cirrosi, ascite)
- X Anomalie venose e arteriose (vene varicose, vasculopatia periferica, Trombosi, flebite, immobilità, linfoedema, infezioni, trauma, neoplasie)

Trattamenti

- X Ritenzione di sodio e acqua (terapia corticosteroidica)

Situazionali (personali, ambientali)

- X Eccessivo apporto di sodio/liquidi
- X Inadeguato apporto proteico (dieta squilibrata, malnutrizione)
- X Ristagno venoso declive/venostasi (per immobilità, prolungata stazione eretta/posizione seduta, gesso/fasciatura stretta)

Fasi di sviluppo

- X Persona anziana: compromissione del ritorno venoso per aumento delle resistenze periferiche e diminuzione dell'efficienza valvolare

Mobilità nel letto, mobilità con la sedia a rotelle, compromissione /rischio
X
Vedere mobilità, compromissione, rischio
Nausea
X

Fattori correlati

Fisiopatologici

- X Trauma tissutale e spasmi muscolari riflessi (per gastroenterite acuta, ulcera gastrica, sindrome colon irritabile, pancreatite, infezioni, tossinfezioni alimentari, intossicazioni da farmaci, calcolosi renale, crampi uterini, malessere da movimento, stress) (specificare)

Nutrizione inferiore al fabbisogno, rischio di
X

Fattori correlati

Fisiopatologici

- X Disfagia (per ictus cerebrale, M.di Parkinson, palatoschisi, distrofia muscolare, paralisi cerebrale, paralisi facciale, SLA, disturbi neuromuscolari)
- X Diminuzione dell'appetito (per alterazioni dello stato di coscienza)
- X Inappetenza, vomito e alterazione della digestione (per malformazioni del tratto gastrointestinale /enterocolite necrotizzante)

Trattamenti

- X Inadeguato assorbimento come effetto collaterale di farmaci (specificare)
- X Diminuita assunzione orale, dolore in sede orale, nausea, vomito (per radioterapia, chemioterapia, tonsillectomia)

Situazionali (personali, ambientali)

- X Diminuzione dell'appetito (per nausea, vomito, isolamento sociale, stress, depressione,

allergie)

- X Incapacità di procurarsi gli alimenti (per limitazioni fisiche, problemi finanziari/ di trasporto)
- X Incapacità di masticare (per adentulia, carie, protesi non adatta)
- X Diarrea

Respirazione, inefficace funzionalità, rischio
X

Fattori correlati

Fisiopatologici

- X Secrezioni eccessive o dense (per infezione, infiammazione, allergia, patologie cardiopolmonari, fumo)

Trattamenti

- X Soppressione del riflesso della tosse

Situazionali (personali, ambientali)

- X Immobilità (per intervento chirurgico/trauma, compromissione percettiva/cognitiva, fatigue, dolore, paura, ansia)

Stipsi
X

Fattori correlati

Fisiopatologici

- X Innervazione difettosa, debolezza della muscolatura pelvica immobilità (per lesioni/traumi del midollo spinale, spina bifida, ictus cerebrale, malattia neurologica, demenza)
- X Riduzione del metabolismo (per ipotiroidismo, iperparatiroidismo, obesità, feocromocitoma, uremia, neuropatia diabetica, ipo pituitarismo)
- X Dolore alla defecazione (per emorroidi, lesione dorsale)

Trattamenti

- X Effetti collaterali di farmaci (specificare)
- X Uso abituale di lassativi

Situazionali (personali, ambientali)

- X Diminuzione della peristalsi (per immobilità, gravidanza, stress, mancanza di esercizio fisico)
- X Incapacità di percepire i segnali intestinali

Allegato 3

PROBLEMI COLLABORATIVI <u>PRELEVALEMENTEMENTE</u> TRATTATI	
Selezionare (X) le caselle relative ai problemi collaborativi di interesse (riferimenti bibliografici: L.J.Carpenito-Diagnosi infermieristiche - 5th. ed. C.E.A. Edizioni, 2015)	
Rischio di complicanze (RC) per disfunzione cardiaca/ vascolare	
RC per aritmie	X
RC per edema polmonare	X
RC per trombosi venosa profonda	X
RC per ipovolemia	X
Rischio di complicanze (RC) per disfunzione respiratoria	
RC per ipossiemia	X
Rischio di complicanze (RC) per disfunzione metabolica/immunitaria/ematopoietica	
RC per ipo/iperglicemia	X
RC per bilancio azotato negativo	X
RC per squilibri elettrolitici	X
RC per sepsi	X
RC per acidosi (metabolica, respiratoria)	X
RC per alcalosi (metabolica, respiratoria)	X
RC per reazione allergica	X
RC per infezioni opportunistiche	X
Rischio di complicanze (RC) per disfunzione renale / urinaria	
RC per ritenzione urinaria acuta	X
RC per insufficienza renale	X
RC per calcoli renali	X
Rischio di complicanze (RC) per effetti avversi (EA) della terapia farmacologica	
RC per effetti avversi della terapia con farmaci anticoagulanti	X
RC per effetti avversi della terapia con farmaci ansiolitici	X
RC per effetti avversi della terapia con farmaci adrenocorticosteroidi	X
RC per effetti avversi della terapia con farmaci antineoplastici	X
RC per effetti avversi della terapia con farmaci antiaritmici	X
RC per effetti avversi della terapia con farmaci antipsicotici	X
RC per effetti avversi della terapia con farmaci antipertensivi	X
RC per effetti avversi della terapia con farmaci betabloccanti	X
RC per effetti avversi della terapia con farmaci calcioantagonisti	X
RC per effetti avversi della terapia con farmaci diuretici	X



Allegato 4

APPRENDIMENTO OFFERTO

In relazione alle diagnosi infermieristiche / problemi collaborativi sopra indicati, descrivere le opportunità formative per lo studente che caratterizzano la sede di apprendimento. Esempio: interventi assistenziali infermieristici, modelli organizzativi e/o di presa in carico assistenziale, attività di ricerca e innovazione.

- Identificare sulla base dei dati raccolti i bisogni di assistenza prioritari valutando il grado di autonomia in rapporto alla malattia cronica, al contesto di cura e al percorso diagnostico-terapeutico.
- Gestione di un programma educativo terapeutico personalizzato.
- Utilizzo di protocolli e linee guida presenti in reparto.
- Preparare e assistere la PA prima e dopo il posizionamento/confezionamento di accessi vascolari o peritoneali per la dialisi.
- Programmare l'esecuzione degli esami prescritti rispettando le procedure.
- Preparazione e assistenza della PA prima, durante e dopo l'esecuzione della biopsia renale.
- Definire le priorità degli interventi sulla base dei bisogni assistenziali, delle esigenze organizzative.
- Gestione degli accessi vascolari e CV.
- Consegna verbale e informatica ad ogni cambio turno per il passaggio delle informazioni su ciascuna PA.
- Assistenza della PA durante tutto il suo percorso, dal ricovero alla dimissione.