



## OFFERTA FORMATIVA DELLA SEDE DI TIROCINIO

Contesto	
<b>Tutor clinico</b> Contatti e riferimenti	Nome: <b>DOMENICO</b> Cognome: <b>CASTALDO</b> Telefono: 3807133466 e-mail: <a href="mailto:domenico.castaldo@ascittaditorino.it">domenico.castaldo@ascittaditorino.it</a> <a href="mailto:d.castaldo@unito.it">d.castaldo@unito.it</a>
<b>Struttura/servizio</b> Nominativo, ubicazione, ecc N°locali, n° posti letto, Orari apertura al pubblico, Orari di lavoro, Figure professionali Risorse strumentali Servizi agli studenti (mensa, biblioteca, accesso internet, ecc)	Pronto Soccorso 1°livello del Presidio Ospedaliero Oftalmico Sperino  <b>CONTESTO ASSISTENZIALE DI APPRENDIMENTO</b> La struttura complessa è composta da: <ul style="list-style-type: none"><li>• 1 sala con tre barelle</li><li>• 3 sale visita</li><li>• 1 sala isolamento</li><li>• 2 postazione accettazione/accoglienza pazienti(triage)</li></ul> <b>ORARI DI SERVIZIO</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• Mattino: 7 – 14.32</li><li>• Pomeriggio: 14.22 – 21.54</li><li>• Sabato domenica e festivi</li><li>• Mattino: 7 – 14.32</li><li>• Pomeriggio: 13.22 – 20.54</li></ul> <b>EQUIPE DI LAVORO</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• 1 coordinatore infermieristico</li><li>• 11 infermieri</li><li>• 1 inf generico</li><li>• 2 oss</li></ul> <b>RISORSE STRUMENTALI</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• 3 lampade a fessura</li><li>• 2 oftalmoscopi indiretti</li><li>• 3 tavola optometrica</li><li>• 1 IOL master</li><li>• 1 autorefrattometro</li><li>• 1 fontifocometro</li><li>• 2 elettrocardiografo</li><li>• 2 monitor defibrillatore</li><li>• Ferri chirurgici</li></ul>



<p><b>Contatti e riferimenti</b></p>	<ul style="list-style-type: none"><li>• 1 carrello emergenza (allestito secondo protocollo aziendale)</li><li>• 5 computer</li></ul> <p>Indirizzo: Via Filippo Juvarra 19, Torino Telefono 011/5666222 - 6042</p>
<p><b>Come raggiungere il servizio</b> Mappa percorso Mezzi pubblici</p>	<p>Mezzi pubblici: - con metropolitana fermata XVIII dicembre - con bus: 10 – 10N – 13 - 29 – 36- 46 – 49 – 56 - 59 – 59/ - 71 - 72 – 91</p>

## Allegato 1

### **Problemi di salute / Problemi clinici / Percorso diagnostico terapeutici prevalentemente trattati**

Selezionare (X) i problemi di salute prevalenti e indicare le patologie più frequenti

<b>Patologie della retina</b>	<b>X</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>Distacco di retin</li> <li>Rottura di retina</li> <li>Pucker Maculare</li> <li>Emovitreo</li> <li>Retinite</li> <li>Corioretinite</li> <li>Occlusione venosa retinica</li> </ul>	
<b>Patologie della cornea</b>	<b>X</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>Ascesso corneale</li> <li>Ulcera corneale</li> <li>Cheratocono</li> <li>Corpi estranei</li> </ul>	
<b>Patologie a carico di altre strutture intraoculari ed extraoculari</b>	<b>X</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>Cataratta</li> <li>Congiuntiviti</li> <li>Emorragia sottocongiuntivale</li> <li>Patologia palpebrale</li> <li>Neurite</li> <li>Papillite</li> <li>Uveite</li> <li>Iridociclite</li> <li>Glaucoma</li> <li>Dacriocistite</li> <li>Strabismo</li> <li>Calazio</li> <li>Entropion</li> <li>Ectropion</li> <li>Pterigio</li> <li>Neoformazioni palpebrali</li> <li>Cellulite orbitaria</li> </ul>	



**Gestione interventi chirurgici sulle strutture extraoculari** X

Exeresi e prelievo per esame istologico delle neoformazioni  
Correzione con intervento di chirurgia plastica

**Patologie traumatologiche / incidenti a carico dell'occhio** X

Trauma oculare e suoi annessi  
Ipoema

**Gestione interventi chirurgici su traumi** X

Sutura corneale  
Rimozione corpo estraneo  
Eviscerazione

## Allegato 2

### Diagnosi Infermieristiche prevalentemente trattate

Selezionare (X) le caselle relative alle Diagnosi Infermieristiche e ai fattori correlati di interesse  
(riferimenti bibliografici: L.J.Carpenito-Diagnosi infermieristiche – 5th. ed. C.E.A. Edizioni, 2010)

Ansia	X
<p>Fattori correlati</p> <p><b>Fisiopatologici</b></p> <p>X Qualsiasi fattore che interferisca con i bisogni relativi ad alimentazione, respirazione, comfort, sicurezza</p> <p><b>Situazionali (personali, ambientali)</b></p> <p>X Minaccia reale o percepita al concetto di sé (fallimento, modificazione dello status, mancato riconoscimento da parte degli altri...)</p> <p>X Minaccia reale o percepita all'integrità biologica (per malattia, violenza, procedure invasive, stato terminale)</p> <p><b>Fasi di sviluppo</b></p> <p>X Persona anziana: minaccia al concetto di sé secondaria a perdite sensoriali, motorie, problemi finanziari, cambiamenti legati al pensionamento</p>	
Attività, intolleranza all'attività	X
<p>Fattori correlati</p> <p><b>Fisiopatologici</b></p> <p>Compromissione del sistema di apporto di ossigeno per</p> <p>X Sistema cardiaco (insufficienza cardiaca, valvolare, aritmie, infarto del miocardio, cardiopatia congenita, angina)</p> <p>X Sistema respiratorio (bronco pneumopatia cronica ostruttiva, atelectasia, dispnea broncopolmonare)</p> <p>X Sistema circolatorio (anemia, ipovolemia, arteriopatia periferica)</p> <p><b>Aumento del fabbisogno metabolico per</b></p> <p>X Infezioni acute o croniche (virali, epatite, mononucleosi, disordini endocrini/ metabolici)</p> <p>X Malattie croniche (renali, infiammatorie, neurologiche, epatiche, muscolo scheletriche)</p> <p>X Inadeguatezza delle fonti energetiche (per obesità, dieta inadeguata, malnutrizione)</p> <p><b>Trattamenti</b></p> <p>X Aumento del fabbisogno metabolico (per tumore maligno, intervento chirurgico, indagini diagnostiche, orario e frequenza trattamenti)</p> <p><b>Situazionali (personali, ambientali)</b></p> <p>X Aumento del fabbisogno metabolico (per utilizzo di ausili come deambulatore /stampelle /tutori, stress, dolore, barriere ambientali come ad es. scale, estremi climatici, inquinamento dell'aria)</p> <p>X Inadeguata motivazione (secondaria ad utilizzo di ausili, paura di cadere, depressione, obesità, dolore, dispnea)</p> <p><b>Fasi di sviluppo</b></p> <p>X Processo di invecchiamento con diminuzione della forza e del tono muscolare, comparsa di deficit sensoriali</p>	

<b>Autostima, Disturbo/Rischio di</b>	<b>X</b>
<p>Fattori correlati</p> <p><b>Fisiopatologici</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>X Variazione dell'aspetto (per perdita di parti del corpo, di una o più funzioni organiche)</li> <li>X Deturpazione</li> <li>X Squilibri biochimici, neurofisiologici</li> </ul> <p><b>Situazionali (personali, ambientali)</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>X Aggressione subita personalmente o di altra persona della stessa età / comunità</li> </ul> <p><b>Fasi di sviluppo</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>X Adulto: per modificazioni associate a invecchiamento</li> <li>X Persona anziana: per perdita di persone, funzioni, economiche, pensionamento</li> </ul>	
<b>Caregiver, tensione nel ruolo di /Rischio di</b>	<b>X</b>
<p>Fattori correlati</p> <p><b>Fisiopatologici</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>X Esigenza di assistenza continua/ complessa (per condizioni debilitanti acute/progressive, tossicodipendenza, malattia dal decorso imprevedibile, demenza progressiva, malattia mentale cronica, disabilità)</li> </ul> <p><b>Trattamenti</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>X Responsabilità assistenziali legate per tutto l'arco delle 24 ore o assistenza che richiede tempo (dialisi, trasporto)</li> </ul> <p><b>Situazionali (personali, ambientali)</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>X Aspettative non realistiche dell'assistito nei confronti del caregiver</li> <li>X Modello di coping inefficace</li> <li>X Salute fisica compromessa</li> <li>X Relazioni inadeguate o disfunzioni familiari</li> <li>X Durata dell'assistenza richiesta</li> <li>X Isolamento</li> <li>X Pause di riposo/svago insufficienti o</li> <li>X Risorse economiche insufficienti</li> <li>X Assenza o non disponibilità di sostegno</li> </ul>	
<b>Comunicazione, compromissione e Comunicazione verbale, compromissione</b> (incapacità a pronunciare le parole ma è in grado di comprendere)	<b>X</b>
<p>Fattori correlati</p> <p><b>Fisiopatologici</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>X Ischemia del lobo frontale temporale (per ictus cerebrale, trauma orale o facciale, danno cerebrale congenito, trauma cranico, depressione del SNC, ipertensione endocranica, tumore della testa/collo/midollo spinale, ipossia cronica, riduzione della circolazione cerebrale.</li> <li>X Patologia del sistema nervoso (es miastenia grave, distrofia muscolare, malattia di Alzheimer)</li> </ul> <p><b>Trattamenti</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>X Compromissione della capacità di produrre il linguaggio (per intubazione endotracheale, tracheotomia, tracheostomia, laringectomia, intervento chirurgico cranico, al viso, al collo, alla bocca, dolore alla bocca o faringeo, depressione cognitiva da farmaci deprimenti il SNC/anestetici)</li> </ul> <p><b>Situazionali (personali, ambientali)</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>X Diminuita attenzione (per affaticamento collera, ansia, o dolore)</li> </ul>	

- X Mandata disponibilità di apparecchio acustico o suo malfunzionamento
- X Barriere psicologiche (paura, timidezza)
- X Barriera linguistica (non disponibilità di interprete)

**Fasi di sviluppo**

- X Persona anziana (perdite uditive)
- X Compromissione cognitiva per (specificare patologia)

**Concetto di sé, disturbo del**

**X**

Fattori correlati

**Fisiopatologici**

- X Variazioni dell'aspetto, dello stile di vita, di un ruolo o delle risposte altrui (per malattia cronica, dolore, trauma grave, perdita parti del corpo / funzioni organiche)

**Situazionali (personali, ambientali)**

- X Immobilità o perdita di funzioni

**Coping inefficace**

**X**

Fattori correlati

**Fisiopatologici**

- X Cronicità della condizione, variazioni biochimiche dell'encefalo (disordine della personalità, disordine bipolare, schizofrenia, disordine da scarsa attenzione)
- X Complessità del regime di autocura, variazioni neurologiche nell'encefalo (Morbo di Alzheimer, infarto cerebrale, sclerosi multipla, malattie in stadio terminale)
- X Alterazione dell'integrità corporea (perdita di una parte del corpo, deturpazione)
- X Alterazione dello stato d'animo (per reazioni organiche, tumore cerebrale, assunzione di sostanze, reazioni organiche, ritardo mentale)

**Trattamenti**

- X Separazione dalla famiglia e dalla casa (ospedalizzazione, ricovero in struttura sanitaria residenziale, ecc)

**Situazionali (personali, ambientali)**

- X Disorganizzazione del sistema familiare
- X Inadeguate risorse psicologiche (per scarsa autostima, considerazione di sé negativa, senso di impotenza, mancanza di motivazione per reagire, modelli di ruolo negativi)

**Fasi di sviluppo**

- X Persona anziana: inadeguatezza delle risorse psicologiche per modificazioni fisiche, reazioni degli altri verso l'anziano, pensionamento, cambiamento di residenza, di condizioni economiche

**Cura di sé, deficit (alimentazione)**

**X**

**Incapacità di (specificare):**

- X tagliare gli alimenti e/o aprire le confezioni
- X portare il cibo alla bocca

Fattori correlati

**Fisiopatologici**

- X Mancanza di coordinazione motoria per (specificare)
- X Debolezza muscolare per (specificare)
- X Paralisi per (specificare)
- X Atrofia per (specificare)
- X Disturbi visivi
- X Arti non funzionanti o mancanti

**Trattamenti**

<p>X Uso di dispositivi esterni (apparecchio gessato, tutori ortopedici, infusione endovenosa...)</p> <p>X Affaticamento e dolore post operatori</p> <p><b>Situazionali (personali, ambientali)</b></p> <p>X Deficit cognitivi</p> <p>X Dolore</p> <p>X Scarsa motivazione</p> <p>X Affaticamento</p> <p>X Confusione mentale</p> <p>X Ansia che paralizza</p> <p><b>Fasi di sviluppo</b></p> <p>X Diminuita capacità motoria e visiva o a debolezza muscolare</p>
--

<p><b>Cura di sé, deficit (bagno/igiene personale)</b></p> <p><b>Ridotta e/o incapacità di (specificare):</b></p> <p>X lavare il proprio corpo o parti</p> <p>X procurarsi l'acqua</p> <p>X regolare la temperatura o il flusso dell'acqua</p> <p>X percepire il bisogno di cure igieniche</p>	<b>X</b>
<p>Fattori correlati</p> <p><b>Fisiopatologici</b></p> <p>X Mancanza di coordinazione motoria per (specificare)</p> <p>X Debolezza muscolare per (specificare)</p> <p>X Paralisi per (specificare)</p> <p>X Atrofia per (specificare)</p> <p>X Disturbi visivi</p> <p>X Arti non funzionanti o mancanti</p> <p><b>Trattamenti</b></p> <p>X Uso di dispositivi esterni (apparecchio gessato, tutori ortopedici, infusione endovenosa...)</p> <p>X Affaticamento e dolore post operatori</p> <p><b>Situazionali (personali, ambientali)</b></p> <p>X Deficit cognitivi</p> <p>X Dolore</p> <p>X Scarsa motivazione</p> <p>X Affaticamento</p> <p>X Confusione mentale</p> <p>X Ansia che paralizza</p> <p><b>Fasi di sviluppo</b></p> <p>X Diminuita capacità motoria e visiva o a debolezza muscolare</p>	

<p><b>Cura di sé, deficit (bagno/igiene personale)</b></p> <p><b>Ridotta e/o incapacità di (specificare):</b></p> <p>X mettersi o togliersi vestiti, allacciare i vestiti</p> <p>X curare il proprio aspetto</p> <p>X acquistare o cambiare capi di vestiario</p> <p>X il flusso dell'acqua</p> <p>X percepire il bisogno di cure igieniche</p>	<b>X</b>
<p>Fattori correlati</p> <p><b>Fisiopatologici</b></p> <p>X Mancanza di coordinazione motoria per (specificare)</p> <p>X Debolezza muscolare per (specificare)</p> <p>X Paralisi per (specificare)</p> <p>X Atrofia per (specificare)</p> <p>X Contratture muscolari per (specificare)</p>	



<p>X Disturbi visivi X Arti non funzionanti o mancanti</p> <p><b>Trattamenti</b> X Uso di dispositivi esterni (apparecchio gessato, tutori ortopedici, infusione endovenosa...) X Affaticamento e dolore post operatori</p> <p><b>Situazionali (personali, ambientali)</b> X Deficit cognitivi X Dolore X Scarsa motivazione X Affaticamento X Confusione mentale X Ansia che paralizza</p> <p><b>Fasi di sviluppo</b> X Diminuita capacità motoria e visiva o a debolezza muscolare</p>
--

<p><b>Cura di sé, deficit (eliminazione urinaria e fecale)</b></p> <p><b>Incapacità o mancanza di volontà per (specificare):</b></p> <p>X servirsi del gabinetto/comoda X trasferirsi sul gabinetto/comoda X eseguire pratiche igieniche adeguate X pulire il gabinetto o la comoda X sistemare gli indumenti per servirsi del gabinetto</p>	<b>X</b>
<p>Fattori correlati</p> <p><b>Fisiopatologici</b> X Mancanza di coordinazione motoria per (specificare) X Debolezza muscolare per (specificare) X Paralisi per (specificare) X Atrofia per (specificare) X Contratture muscolari per (specificare) X Disturbi visivi X Arti non funzionanti o mancanti</p> <p><b>Trattamenti</b> X Uso di dispositivi esterni (apparecchio gessato, tutori ortopedici, infusione endovenosa...) X Affaticamento e dolore post operatori</p> <p><b>Situazionali (personali, ambientali)</b> X Deficit cognitivi X Dolore X Scarsa motivazione X Affaticamento X Confusione mentale X Ansia che paralizza</p> <p><b>Fasi di sviluppo</b> X Diminuita capacità motoria e visiva o a debolezza muscolare</p>	

<b>Cura di sé, deficit (strumentale)</b> <b>Difficoltà a (specificare)</b> <input checked="" type="checkbox"/> usare il telefono <input checked="" type="checkbox"/> accedere ai mezzi di trasporto <input checked="" type="checkbox"/> gestire il denaro <input checked="" type="checkbox"/> assumere i farmaci	<b>X</b>
Fattori correlati <b>Fisiopatologici</b> <input checked="" type="checkbox"/> Mancanza di coordinazione motoria per (specificare) <input checked="" type="checkbox"/> Paralisi per (specificare) <input checked="" type="checkbox"/> Atrofia per (specificare) <input checked="" type="checkbox"/> Contratture muscolari per (specificare) <input checked="" type="checkbox"/> Disturbi visivi <input checked="" type="checkbox"/> Arti non funzionanti o mancanti <b>Trattamenti</b> <input checked="" type="checkbox"/> Uso di dispositivi esterni (apparecchio gessato, tutori ortopedici, infusione endovenosa...) <input checked="" type="checkbox"/> Affaticamento e dolore post operatori <b>Situazionali (personali, ambientali)</b> <input checked="" type="checkbox"/> Deficit cognitivi <input checked="" type="checkbox"/> Dolore <input checked="" type="checkbox"/> Scarsa motivazione <input checked="" type="checkbox"/> Affaticamento <input checked="" type="checkbox"/> Confusione mentale <input checked="" type="checkbox"/> Ansia che paralizza <b>Fasi di sviluppo</b> <input checked="" type="checkbox"/> Diminuita capacità motoria e visiva o a debolezza muscolare	

<b>Dolore acuto (Grave fastidio o disagio che dura da 0 a 6 mesi)</b>	<b>X</b>
Fattori correlati <b>Trattamenti</b> <input checked="" type="checkbox"/> Trauma tissutale e spasmi muscolari riflessi (per intervento chirurgico, ustione, indagini diagnostiche/venipuntura/biopsia, scansiomertria invasiva) <input checked="" type="checkbox"/> Per nausea e vomito secondari a chemioterapia, anestesia, effetti collaterali (specificare) <b>Situazionali (personali, ambientali)</b> <input checked="" type="checkbox"/> Febbre <input checked="" type="checkbox"/> Immobilità/posizionamento inappropriato <input checked="" type="checkbox"/> Iperattività <input checked="" type="checkbox"/> Risposta allergica <input checked="" type="checkbox"/> Irritanti chimici <input checked="" type="checkbox"/> Bisogno di dipendenza non soddisfatto <input checked="" type="checkbox"/> Ansia grave e repressa	

<b>Dolore cronico (Continuo/ intermittente che dura da più di 6 mesi)</b>	<b>X</b>
<p>Fattori correlati</p> <p><b>Fisiopatologici</b></p> <p>Trauma tissutale e spasmi muscolari riflessi secondari a</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>X Disordini muscolo scheletrici (fratture, artrite, contrattura muscolare, spasmi, patologia a carico del midollo spinale)</li> <li>X Disordini viscerali (cardiaci, renali, epatici, intestinali, polmonari)</li> <li>X Cancro</li> <li>X Disordini vascolari (vasospasmo, occlusione, flebite, vasodilatazione/cefalea)</li> <li>X Infiammazione di nervi, tendini, capsula articolare, articolazioni, muscoli, strutture articolari.</li> </ul> <p><b>Trattamenti</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>X Trauma tissutale e spasmi muscolari riflessi (per intervento chirurgico, ustione, indagini diagnostiche/venipuntura/biopsia, scansioni invasive)</li> </ul> <p><b>Situazionali (personali, ambientali)</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>X Risposta allergica</li> <li>X Bisogno di dipendenza non soddisfatto</li> <li>X Ansia grave e repressa</li> </ul>	
<b>Eliminazione urinaria compromessa</b>	<b>X</b>
<p><b>Per Incontinenza urinaria (specificare):</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>X Totale (continua, senza presenza di distensione della vescica e/o ritenzione di urine)</li> <li>X Funzionale (per incapacità di raggiungere in tempo il gabinetto)</li> </ul>	
<p>Fattori correlati</p> <p><b>Fisiopatologici</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>X Diminuita capacità vescicale/irritazione vescicale (per infezione, glicosuria, carcinoma, uretrite, trauma)</li> <li>X Diminuzione dei segnali vescicali o del loro riconoscimento (per infezioni/tumori/lesioni midollo spinale, neuropatia alcolica e/o diabetica, malattie demielinizzanti, ictus cerebrale, parkinsonismo, sclerosi multipla, farmaci alfa adrenergici)</li> </ul>	
<b>Fatigue</b>	<b>X</b>
<p>Fattori correlati</p> <p><b>Fisiopatologici</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>X Inadeguata ossigenazione tissutale ( per BPCO, insufficienza cardiaca, anemia, malattia vascolare periferica)</li> <li>X Alterazioni biochimiche (per malattie endocrine e metaboliche come diabete mellito, ipotiroidismo, malattie ipofisarie, AIDS, M Addison, cirrosi epatica, insufficienza renale)</li> </ul> <p><b>Trattamenti</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>X Aumento del consumo energetico (per amputazione, alterazione dell'andatura, uso di deambulatore o stampelle)</li> </ul> <p><b>Situazionali (personali, ambientali)</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>X Stress emotivo</li> <li>X Disturbi del sonno</li> </ul>	

<b>Immagine corporea, Disturbo/Rischio di</b>	<b>X</b>
<p>Fattori correlati</p> <p><b>Fisiopatologici</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>X Variazioni dell'aspetto per malattia cronica, trauma grave, perdita di una parte del corpo, perdita di una funzione organica, invecchiamento</li> </ul> <p><b>Trattamenti</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>X variazione dell'aspetto ( per ricovero ospedaliero, radioterapia, chemioterapia, intervento chirurgico)</li> </ul> <p><b>Situazionali (personali, ambientali)</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>X Trauma fisico secondario a abuso sessuale, stupro, aggressione (specificare)</li> <li>X Effetti sull'aspetto di obesità, immobilità, gravidanza (specificare)</li> </ul>	
<b>Incontinenza urinaria funzionale</b>	<b>X</b>
<p>Fattori correlati</p> <p><b>Fisiopatologici</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>X Diminuzione di stimoli vescicali/compromessa capacità di riconoscerli per trauma, infezione, tumore cerebrale, parkinsonismo, sclerosi multipla, neuropatia alcolica, malattie demielinizzanti, ictus cerebrale, demenza progressiva</li> </ul> <p><b>Trattamenti</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>X Riduzione del tono vescicale per uso di antistaminici, terapia immunosoppressiva, adrenalina, diuretici, anticolinergici, tranquillanti, sedativi, miorilassanti</li> </ul> <p><b>Situazionali (personali, ambientali)</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>X Compromissione della mobilità</li> <li>X Diminuita attenzione nei confronti degli stimoli vescicali per depressione, soppressione intenzionale, confusione mentale</li> </ul> <p><b>Fasi di sviluppo</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>X Persona anziana: perdite motorie/sensitive</li> </ul>	
<b>Incontinenza urinaria totale (compromessa eliminazione urinaria)</b>	<b>X</b>
<p>Fattori correlati</p> <p><b>Fisiopatologici</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>X Diminuita capacità vescicale o irritazione vescicale per trauma, carcinoma, infezione uretrite, glicosuria</li> <li>X Diminuzione dei segnali vescicali o compromessa capacità di riconoscerli per infezione/tumore/lesione del midollo spinale, neuropatia diabetica/alcolica, malattie demielinizzanti, ictus cerebrale, parkinsonismo, lesione cerebrale, sclerosi multipla</li> </ul> <p><b>Trattamenti</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>X Riduzione del tono muscolare per per anestesia generale o spinale, terapia farmacologica e iatrogenesi (farmaci miorilassanti, anestetici, diuretici, antistaminici, anticolinergici, immunodepressori, adrenalina, ansiolitici)</li> </ul> <p><b>Situazionali (personali, ambientali)</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>X Diminuita attenzione nei confronti degli stimoli vescicali per depressione, soppressione intenzionale, confusione mentale</li> </ul> <p><b>Fasi di sviluppo</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>X Persona anziana: perdite motorie/sensitive</li> </ul>	

<b>Infezione, rischio di</b>	<b>X</b>
<p>Fattori correlati</p> <p><b>Fisiopatologici</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>X Compromissione delle difese dell'ospite per cancro, malattie respiratorie, ematologiche, periodontali, malattie epatiche, artrite, diabete mellito, malattie ereditarie, AIDS, alcolismo, immunosoppressione (secondaria a- specificare)</li> <li>X Compromissione della circolazione per linfedema, obesità, malattia vascolare periferica</li> </ul> <p><b>Trattamenti</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>X Sede di possibile invasione di microorganismi per intervento chirurgico, intubazione, linee invasive, nutrizione parenterale totale, dialisi, nutrizione enterale</li> <li>X Compromissione delle difese dell'ospite per terapia radiante, trapianto d'organo, terapia farmacologica (specificare)</li> </ul> <p><b>Situazionali (personali, ambientali)</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>X Possibile sede di invasione di microorganismi per trauma accidentale/intenzionale, periodo postpartum, morso di insetto/animale/umano, lesione termica, ambiente caldo/umido/buio (apparecchio gessato, pieghe cutanee)</li> <li>X Contatto con agenti contaminanti (infezioni nosocomiali o di comunità)</li> </ul> <p><b>Fasi di sviluppo</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>X Persona anziana: maggiore vulnerabilità per diminuzione della risposta immunitaria, condizione debilitante, malattia cronica)</li> </ul>	
<b>Insonnia</b>	<b>X</b>
<p>Fattori correlati</p> <p><b>Situazionali (personali, ambientali)</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>X Eccessiva iperattività (per disturbo bipolare/ da deficit dell'attenzione, panico, uso di droghe)</li> <li>X Eccessivo dormire di giorno</li> <li>X Depressione</li> <li>X Dolore cronico</li> <li>X Risposte ansiose</li> <li>X Modifiche ambientali (specificare)</li> <li>X Paura</li> </ul>	
<b>Lesione, rischio di</b>	<b>X</b>
<p>Fattori correlati</p> <p><b>Fisiopatologici</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>X Alterazioni della mobilità (ictus cerebrale, artrite, parkinsonismo, perdita di un arto, compromissione della vista/udito)</li> <li>X Ipotensione ortostatica</li> <li>X Disturbi vestibolari</li> </ul>	
<b>Memoria, compromissione</b>	<b>X</b>
<p>Fattori correlati</p> <p><b>Fisiopatologici</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>X Alterazioni del SNC ( per malattia cerebrale degenerativa, ictus cerebrale, lesione/trauma cranico</li> <li>X Riduzione della quantità/qualità delle informazioni elaborate (per deficit visivi/uditivi, livello di istruzione, ridotte capacità intellettive, abitudini di apprendimento, benessere fisico insufficiente, affaticamento</li> <li>X Deficienze nutrizionali</li> </ul>	

**Situazionali (personali, ambientali)**

- X Eccessiva attenzione/preoccupazione per se stessi (per lutto, ansia, depressione)
- X Difficoltà di concentrazione (per stress, disturbi del sonno, dolore, inadeguata stimolazione intellettuale, distrazioni)

**Mobilità, compromissione /rischio di**

**X**

Fattori correlati

**Fisiopatologici**

- X riduzione della forza e della resistenza per compromissione neuromuscolare (malattie autoimmunitarie, del sistema nervoso, respiratorie, distrofia muscolare, paralisi parziale, tumore del SNC, tumore, trauma, ipertensione endocranica, deficit sensoriale)
- X riduzione della forza e della resistenza per compromissione muscoloscheletrica (fratture, malattie del tessuto connettivo, condizioni cardiache)
- X forza/resistenza insufficienti per la deambulazione (protesi, stampelle, deambulatore)

**Situazionali (personali, ambientali)**

- X obesità
- X dolore

**Fasi di sviluppo**

- X Persona anziana: diminuzione dell'agilità e debolezza muscolare

**Nausea**

**X**

Fattori correlati

**Trattamenti**

- X Effetti dell'anestesia

**Non adesione (a indicazioni terapeutiche)**

**X**

Fattori correlati

**Fisiopatologici**

- X Compromessa capacità di prestazione a causa di una disabilità (scarsa memoria, deficit motori/sensitivi)

**Trattamenti**

- X Effetti collaterali della terapia
- X Costo economico della terapia

**Situazionali (personali, ambientali)**

- X Malattia concomitante di un membro della famiglia (mancato sostegno da parte della famiglia/amici/comunità)
- X Barriere alla comprensione (per deficit cognitivi/visivi/uditivi, difficoltà di memoria, ansia, fatigue, ridotta attenzione, problemi motivazionali)

**Stress, sovraccarico psicofisico**

**X**

Fattori correlati

**Fisiopatologici**

- X Necessità di far fronte a malattie acute, croniche, terminali, nuove diagnosi, condizioni deturpanti

**Situazionali (personali, ambientali)**

- X Perdita reale o prevista di una persona significativa (per morte, divorzio, trasloco, servizio militare)
- X Necessità di far fronte a morte, aggressione, guerra
- X Perdite funzionali

**Allegato 3**

**PROBLEMI COLLABORATIVI PRELEVALEMENTEMENTE TRATTATI**  
 Selezionare (X) le caselle relative ai problemi collaborativi di interesse  
 (riferimenti bibliografici: L.J.Carpenito-Diagnosi infermieristiche - 5th. ed. C.E.A. Edizioni, 2010)

<b>Rischio di complicanze (RC) per disfunzione cardiaca/ vascolare</b>	
RC per emorragia	<b>X</b>
RC per aritmie	<b>X</b>
<b>Rischio di complicanze per disfunzione metabolica/immunitaria/ematopoietica</b>	
RC per ipo/iperglicemia	<b>X</b>
RC per squilibri elettrolitici	<b>X</b>
RC per sepsi	<b>X</b>
RC per reazione allergica	<b>X</b>
<b>Rischio di complicanze (RC) per disfunzione neurologica / sensoriale</b>	
RC per crisi convulsiva	<b>X</b>
RC per ipertensione intraoculare	<b>X</b>
<b>Rischio di complicanze (RC) per effetti avversi (EA) della terapia farmacologica</b>	
RC per effetti avversi della terapia con farmaci anticoagulanti	<b>X</b>
RC per effetti avversi della terapia con farmaci ansiolitici	<b>X</b>
RC per effetti avversi della terapia con farmaci adrenocorticosteroidi	<b>X</b>
RC per effetti avversi della terapia con farmaci antiaritmici	<b>X</b>
RC per effetti avversi della terapia con farmaci antipertensivi	<b>X</b>
RC per effetti avversi della terapia con farmaci calcioantagonisti	<b>X</b>



## Allegato 4

### APPRENDIMENTO OFFERTO

In relazione alle diagnosi infermieristiche / problemi collaborativi sopra indicati, descrivere le opportunità formative per lo studente che caratterizzano la sede di apprendimento.

Esempio: interventi assistenziali infermieristici, modelli organizzativi e/o di presa in carico assistenziale, attività di ricerca e innovazione.

- Modello Organizzativo Modulare
- Elevato turnover
- Cartella clinica informatizzata jhis
- Patologie prevalenti:
  - Pazienti MEDICI: Neurite, papillite, uveite, endoftalmite, ascesso corneale congiuntivite ;
  - Pazienti CHIRURGICI: Distacchi di retina, , , traumi, , corpi estranei
- Interventi assistenziali infermieristici:
  - Accettazione e accoglienza
  - Preparazione della persona che deve sottoporsi a intervento chirurgico
  - Preparazione della persona che deve sottoporsi ad esami diagnostici invasivi e non
  - Assistenza post-esame diagnostico
  - Gestione del trauma oculare/orbitale
  - Gestione ossigenoterapia
  - Gestione accessi venosi
  - Gestione della situazione di periarresto e arresto cardiaco
  - Assistenza alla persona con dolore acuto
  - Educazione terapeutica alla dimissione
- Protocolli in uso nel servizio:
  - Utilizzo dei DPI
  - Smaltimento dei rifiuti DPR 254/2003
  - Protocollo isolamento
  - Protocollo lavaggio mani
  - Protocollo MET
  - Protocollo rischio caduta
- Procedure in uso nel servizio:
  - Isolamento dei pazienti affetti da infezioni oculari
  - Gestione del consenso informato per procedure diagnostiche e interventistiche
  - Preparazione del paziente chirurgico in chirurgia oftalmologica bulbare
  - Prevenzione degli infortuni a rischio biologico
- PDTA in uso nel servizio:
  - Cataratta
  - Retina
  - Malattia di Fabry
  - Percorso Macula