

OFFERTA FORMATIVA DELLA SEDE DI TIROCINIO

| Contesto | |
|---|--|
| <p>Tutor clinico Contatti e riferimenti</p> | <p>Nome FEDERICO Cognome NAVARIN Telefono: 011/2402862 – 2006 – 2803 – 2376 – 2003 e-mail: federico.navarin@unito.it</p> |
| <p>Struttura/servizio Nominativo, ubicazione, ecc N°locali, n° posti letto, Orari apertura al pubblico, Orari di lavoro, Figure professionali Risorse strumentali Servizi agli studenti (mensa, biblioteca, accesso internet, ecc)</p> | <p>PRONTO SOCCORSO - situato al Piano Terra (ala nuova) del p.o. S. Giovanni Bosco</p> <p>CONTESTO ASSISTENZIALE DI APPRENDIMENTO La struttura complessa è composta da:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 2 postazioni di triage • 6 posti letto di semi-intensiva di cui 4 predisposte per la ventilazione invasiva e non. • 33 posti letti di degenza temporanea • 1 posto letto in isolamento • 5 sale visita • 1 sala sutura <p>ORARI DI SERVIZIO</p> <ul style="list-style-type: none"> • Mattino: 7 – 14.42 • Pomeriggio: 14.32 – 22.35 • Notte: 22.25 – 7.10 <p>ORARI DI VISITA IN REPARTO</p> <ul style="list-style-type: none"> • Mattino: 12 – 13 • Pomeriggio: 19 – 20 <p>EQUIPE DI LAVORO</p> <ul style="list-style-type: none"> • 1 Direttore di struttura complessa per il Pronto Soccorso • Dirigenti medici strutturati • Dir. medici di chirurgia generale che svolgono attività di pronto soccorso • Specializzandi medici • Dir. medici di ortopedia che svolgono attività di pronto soccorso h 12 • Dirigenti medici di medicina generale • Dirigenti medici specialisti in consulenza • 2 Coordinatori infermieristici • Infermieri dipendenti aziendali, infermieri liberi professionisti, infermieri dipendenti di agenzia di somministrazione di lavoro • Operatori Socio Sanitari (OSS) sia dipendenti aziendali che dipendenti della cooperativa • Operatori tecnici sanitari |

Allegato 1

Problemi di salute / Problemi clinici / Percorso diagnostico terapeutici prevalentemente trattati

Selezionare (X) i problemi di salute prevalenti e indicare le patologie più frequenti

| Malattie Traumatologiche / incidenti | X |
|---|---|
| <ul style="list-style-type: none"> • Patologie dell'apparato cardiovascolare (angine, IMA, scompenso cardiaco, ACC, BAV, FA, TPSV, TV, ischemie, aneurismi) • Patologie dell'apparato respiratorio (BPCO, pemoniti, TEP, EPA, Pneumotorace, neoplasie) • Patologie di origine neurologica (ICTUS, TIA, patologie denegerative, neoplasie) • Patologie di origine neurochirurgica (MAV, emorragie, ernie discali) • Patologie dell'apparato gastrointestinale (emorragie, neoplasie, processi infiammatori, calcoli, patologiche che necessita di intervento chirurgico urgente) • Patologie dell'apparato urinario (processi infiammatori, calcolosi, emorragie, neoplasie, patologie che necessitano di intervento chirurgico urgente) • Piccoli e grandi traumi (contusioni, infortuni sul lavoro, ustioni, frattute, traumi distorsivi, amputazioni, emorragie) • Malattie infettive infettive (Clostridium pos, meningiti batteriche e virali, TBC) • Stati di shock • Reazioni allergiche • Stato di coma • Intossicazioni • Malattie metaboliche (Diabete, tiroiditi, rabdomiolisi, Scompensi metabolici) • Psicosi acute e tentativi anticonservativi, sindromi da astinenza | |

Allegato 2
Diagnosi Infermieristiche prevalentemente trattate

Selezionare (X) le caselle relative alle Diagnosi Infermieristiche e ai fattori correlati di interesse
 (riferimenti bibliografici: L.J.Carpenito-Diagnosi infermieristiche – 5th. ed. C.E.A. Edizioni, 2010)

| Ansia | X |
|--|---|
| Fattori correlati Fisiopatologici <ul style="list-style-type: none"> X Qualsiasi fattore che interferisca con i bisogni relativi ad alimentazione, respirazione, comfort, sicurezza Situazionali (personali, ambientali) <ul style="list-style-type: none"> X Minaccia reale o percepita al concetto di sé (fallimento, modificazione dello status, mancato riconoscimento da parte degli altri...) X Perdita reale o percepita di persone significative X Minaccia reale o percepita all'integrità biologica (per malattia, violenza, procedure invasive, stato terminale) X Cambiamento ambientale reale o percepito (trasloco, ospedalizzazione, pensionamento, condizione di rifugiato, reclusione, calamità naturali, rischi per la sicurezza...) Fasi di sviluppo <ul style="list-style-type: none"> X Adulto: minaccia al concetto di se per gravidanza, ruolo genitoriale, cambiamento di carriera, effetti dell'invecchiamento, complicanze di una precedente gravidanza, aborto, o morte del feto, insufficiente conoscenza dell'esperienza del travaglio X Persona anziana: minaccia al concetto di se secondaria a perdite sensoriali, motorie, problemi finanziari, cambiamenti legati al pensionamento | |
| Aspirazione, rischio di | X |
| Fattori correlati Fisiopatologici <ul style="list-style-type: none"> X Riduzione del livello di coscienza (per demenza pre-senile, trauma cranico, ictus cerebrale, M.di Parkinson, induzione da alcol/sostanze, coma, convulsioni, anestesia) X Depressione dei riflessi della tosse/faringeo X Ritardato svuotamento gastrico (per ostruzione intestinale, sindrome da reflusso, ileo) X Aumento della pressione gastrica (per posizione ginecologica, ascite, obesità, dilatazione uterina) X Compromissione della deglutizione o diminuzione dei riflessi laringeo/glottico (per acalasia, condizioni debilitanti, miastenia grave, catatonìa, Mdi Parkinson, stenosi esofagea, ictus cerebrale, sclerosi multipla, sclerodermia, distrofia muscolare, sindrome di Guillain Barrè) Trattamenti <ul style="list-style-type: none"> X Depressione dei riflessi laringeo/glottico (per tracheostomia/trachetomia, sedazione, nutriz. enterale) X Compromissione della capacità di tossire (per immobilizzazione della mandibola, posizione prona) Situazionali (personali, ambientali) <ul style="list-style-type: none"> X Incapacità/difficoltà di sollevare la parte superiore del corpo Fasi di sviluppo <ul style="list-style-type: none"> X Persona anziana: dentizione inadeguata | |

| | |
|---|----------|
| Attività, intolleranza all'attività | X |
| <p>Fattori correlati</p> <p>Fisiopatologici</p> <p>Compromissione del sistema di apporto di ossigeno per</p> <ul style="list-style-type: none"> X Sistema cardiaco (insufficienza cardiaca, valvolare, aritmie, infarto del miocardio, cardiopatia congenita, angina) X Sistema respiratorio (bronco pneumopatia cronica ostruttiva, atelectasia, dispnea broncopolmonare) X Sistema circolatorio (anemia, ipovolemia, arteriopatia periferica) <p>Aumento del fabbisogno metabolico per</p> <ul style="list-style-type: none"> X Infezioni acute o croniche (virali, epatite, mononucleosi, disordini endocrini/ metabolici) X Malattie croniche (renali, infiammatorie, ,neurologiche, epatiche,, muscolo scheletriche) X Inadeguatezza delle fonti energetiche (per obesità, dieta inadeguata, malnutrizione) <p>Trattamenti</p> <ul style="list-style-type: none"> X Aumento del fabbisogno metabolico (per tumore maligno, intervento chirurgico, indagini diagnostiche, orario e frequenza trattamenti) X Compromissione del trasporto dell'ossigeno (per ipovolemia, prolungato riposo a letto) <p>Situazionali (personali, ambientali)</p> <ul style="list-style-type: none"> X Inattività (secondaria a depressione, mancanza di motivazione, stile di vita sedentario, insufficiente conoscenza) | |
| Autolesionismo, automutilazione, rischio di | X |
| <p>Fattori correlati</p> <p>Fisiopatologici</p> <ul style="list-style-type: none"> X Squilibri biochimici / neurofisiologici (disturbo bipolare, autismo, compromissione mentale) <p>Personali</p> <ul style="list-style-type: none"> X Pregressi episodi di autolesionismo X Abusi fisici, psichici, o sessuali X Inefficaci capacità di coping X Incapacità di esprimere verbalmente i sentimenti | |
| Autostima, Disturbo/Rischio di | X |
| <p>Fattori correlati</p> <p>Fisiopatologici</p> <ul style="list-style-type: none"> X Variazione dell'aspetto (per perdita di parti del corpo, di una o più funzioni organiche) <p>Situazionali (personali, ambientali)</p> <ul style="list-style-type: none"> X Storia di numerosi insuccessi | |
| Avvelenamento, rischio | X |
| <p>Vedere lesione, rischio</p> | |
| Cadute, rischio | X |
| <p>Vedere lesione, rischio</p> | |

| | |
|---|----------|
| Comunicazione, compromissione e Comunicazione verbale, compromissione (incapacità a pronunciare le parole ma è in grado di comprendere) | X |
| <p>Fattori correlati</p> <p>Fisiopatologici</p> <ul style="list-style-type: none"> X Alterazione della funzionalità motoria dei muscoli del linguaggio X Ischemia del lobo frontale temporale (per ictus cerebrale, trauma orale o facciale, danno cerebrale congenito, trauma cranico, depressione del SNC, ipertensione endocranica, tumore della testa/collo/midollo spinale, ipossia cronica, riduzione della circolazione cerebrale. X Compromissione della capacità di produrre il linguaggio (per compromissione respiratoria, dispnea, edema, infezione della laringe, deformità del cavo orale, labio/palatoschisi, mal occlusione o frattura mascellare, adentulia, disartria) <p>Trattamenti</p> <ul style="list-style-type: none"> X Compromissione della capacità di produrre il linguaggio (per intubazione endotracheale, tracheotomia, tracheostomia, laringectomia, intervento chirurgico cranico, al viso, al collo, alla bocca, dolore alla bocca o faringeo, depressione cognitiva da farmaci depressivi il SNC/anestetici) <p>Situazionali (personali, ambientali)</p> <ul style="list-style-type: none"> X Diminuita attenzione (per affaticamento collera, ansia, o dolore) X Mandata disponibilità di apparecchio acustico o suo malfunzionamento X Barriera linguistica (non disponibilità di interprete) | |
| Concetto di se, disturbo del | X |
| <p>Fattori correlati</p> <p>Fisiopatologici</p> <ul style="list-style-type: none"> X Variazioni dell'aspetto, dello stile di vita, di un ruolo o delle risposte altrui (per malattia cronica, dolore, trauma grave, perdita parti del corpo / funzioni organiche) <p>Situazionali (personali, ambientali)</p> <ul style="list-style-type: none"> X Senso di abbandono/fallimento secondario a perdita del lavoro/della capacità di lavorare, divorzio, separazione o perdita di persona significativa X Rapporti insoddisfacenti parentali /coniugali | |
| Confusione mentale acuta | X |
| <p>Fattori correlati</p> <p>Fattori di rischio</p> <p>Improvvisa insorgenza di ipossia cerebrale o disturbi del metabolismo cerebrale per</p> <ul style="list-style-type: none"> X Squilibri idroelettrolitici (disidratazione, ipovolemia, acidosi/alcalosi, iper/ipo calcemia, ipopotassiemia, ipo/iper natremia, ipo/iper glicemia) X Deficit nutrizionali (folati, vitamina B12, anemia, deficit niacina, deficit magnesio) X Disturbi cardiovascolari (infarto miocardio, insufficienza cardiaca congestizia, aritmie, blocco cardiaco, arterite temporale) ematoma subdurale) X Disordini respiratori (BPCO, embolia polmonare, TBC, polmonite) X Infezioni (sepsi, meningite, encefalite, infezione delle vie urinarie nell'anziano) X Disordini metabolici ed endocrini (iper/ipo tiroidismo, disfunzione ipofisaria, disturbi paratiroidei, del corticosurrene, ipotensione posturale, insufficienza epatica o renale) X Disordini del SNC (ictus cerebrale, idrocefalo normoteso, infarti multipli cerebrale, tumore, trauma cranico, crisi convulsive e stati post convulsivi) <p>Trattamenti</p> <ul style="list-style-type: none"> X Disturbo del metabolismo cerebrale per intervento chirurgico, intossicazione da farmaci, anestesia generale, astinenza da alcol, sedativi/ipnotici, metalli pesanti, monossido di carbonio, effetti collaterali dei farmaci (neurolettici/narcotici, anestesia generale, effetti collaterali | |

da farmaci come diuretici, digitale, propranololo, atropina, ipoglicemizzanti, barbiturici, litio, fenitoina, acyclovir, anticolinergici, ecc)

Situazionali (personali, ambientali)

- X Disturbo del metabolismo cerebrale per astinezza da alcool, sedativi, ipnotici, intossicazione da metalli pesanti o da monossido di carbonio.
- X Dolore, fecaloma, immobilità,
- X Depressione, situazioni non familiari
- X Intossicazioni chimiche o da farmaci (cocaina, eroina, metanfetamine, metadone, altri stupefacenti...)

Coping inadeguato della famiglia

X

Fattori correlati

Biofisiopatologici

- X Compromissione della capacità di esercitare la responsabilità di ruolo per malattia acuta/cronica

Situazionali (personali, ambientali)

- X Bisogni psicosociali non soddisfatti dai genitori / dai figli

Coping inefficace

X

Fattori correlati

Fisiopatologici

- X Cronicità della condizione, variazioni biochimiche dell'encefalo (disordine della personalità, disordine bipolare, schizofrenia, disordine da scarsa attenzione)
- X Complessità del regime di autocura, variazioni neurologiche nell'encefalo (Morbo di Alzheimer, infarto cerebrale, sclerosi multipla, malattie in stadio terminale)
- X Alterazione dell'integrità corporea (perdita di una parte del corpo, deturpazione)
- X Alterazione dello stato d'animo (per reazioni organiche, tumore cerebrale, assunzione di sostanze, reazioni organiche, ritardo mentale)

Trattamenti

- X Separazione dalla famiglia e dalla casa (ospedalizzazione, ricovero in struttura sanitaria residenziale, ecc)

Situazionali (personali, ambientali)

- X Disorganizzazione del sistema familiare
- X Inefficace capacità di problem solving
- X Inadeguate risorse psicologiche (per scarsa autostima, considerazione di se negativa, senso di impotenza, mancanza di motivazione per reagire, modelli di ruolo negativi)

Cura di sé, deficit (alimentazione)

X

Incapacità di (specificare):

- X tagliare gli alimenti e/o aprire le confezioni
- X portare il cibo alla bocca

Fattori correlati

Fisiopatologici

- X Mancanza di coordinazione motoria per (specificare)
- X Spasticità o flaccidità per (specificare)
- X Debolezza muscolare per (specificare)
- X Paralisi per (specificare)
- X Atrofia per (specificare)
- X Stato comatoso
- X Deficit somatici

Trattamenti

- X Uso di dispositivi esterni (apparecchio gessato, tutori ortopedici, infusione endovenosa...)

| |
|--|
| <p>Situazionali (personali, ambientali)</p> <ul style="list-style-type: none"> <input checked="" type="checkbox"/> Deficit cognitivi <input checked="" type="checkbox"/> Dolore <input checked="" type="checkbox"/> Scarsa motivazione <input checked="" type="checkbox"/> Affaticamento <input checked="" type="checkbox"/> Confusione mentale <p>Fasi di sviluppo</p> <ul style="list-style-type: none"> <input checked="" type="checkbox"/> Diminuita capacità motoria e visiva o a debolezza muscolare |
|--|

| | |
|---|----------|
| <p>Cura di sé, deficit (bagno/igiene personale)</p> <p>Ridotta e/o incapacità di (specificare):</p> <ul style="list-style-type: none"> <input checked="" type="checkbox"/> lavare il proprio corpo o parti <input checked="" type="checkbox"/> percepire il bisogno di cure igieniche | X |
| <p>Fattori correlati</p> <p>Fisiopatologici</p> <ul style="list-style-type: none"> <input checked="" type="checkbox"/> Mancanza di coordinazione motoria per (specificare) <input checked="" type="checkbox"/> Spasticità o flaccidità per (specificare) <input checked="" type="checkbox"/> Debolezza muscolare per (specificare) <input checked="" type="checkbox"/> Paralisi per (specificare) <input checked="" type="checkbox"/> Atrofia per (specificare) <input checked="" type="checkbox"/> Stato comatoso <input checked="" type="checkbox"/> Arti non funzionanti o mancanti <p>Trattamenti</p> <ul style="list-style-type: none"> <input checked="" type="checkbox"/> Uso di dispositivi esterni (apparecchio gessato, tutori ortopedici, infusione endovenosa...) <p>Situazionali (personali, ambientali)</p> <ul style="list-style-type: none"> <input checked="" type="checkbox"/> Deficit cognitivi <input checked="" type="checkbox"/> Dolore <input checked="" type="checkbox"/> Affaticamento <input checked="" type="checkbox"/> Confusione mentale | |

| | |
|--|----------|
| <p>Cura di sé, deficit (bagno/igiene personale)</p> <p>Ridotta e/o incapacità di (specificare):</p> <ul style="list-style-type: none"> <input checked="" type="checkbox"/> mettersi o togliersi vestiti, allacciare i vestiti <input checked="" type="checkbox"/> percepire il bisogno di cure igieniche | X |
| <p>Fattori correlati</p> <p>Fisiopatologici</p> <ul style="list-style-type: none"> <input checked="" type="checkbox"/> Mancanza di coordinazione motoria per (specificare) <input checked="" type="checkbox"/> Spasticità o flaccidità per (specificare) <input checked="" type="checkbox"/> Debolezza muscolare per (specificare) <input checked="" type="checkbox"/> Paralisi per (specificare) <input checked="" type="checkbox"/> Atrofia per (specificare) <input checked="" type="checkbox"/> Contratture muscolari per (specificare) <input checked="" type="checkbox"/> Stato comatoso <input checked="" type="checkbox"/> Arti non funzionanti o mancanti <p>Trattamenti</p> <ul style="list-style-type: none"> <input checked="" type="checkbox"/> Uso di dispositivi esterni (apparecchio gessato, tutori ortopedici, infusione endovenosa...) <p>Situazionali (personali, ambientali)</p> <ul style="list-style-type: none"> <input checked="" type="checkbox"/> Deficit cognitivi <input checked="" type="checkbox"/> Dolore <input checked="" type="checkbox"/> Affaticamento <input checked="" type="checkbox"/> Confusione mentale | |

| | |
|--|----------|
| Cura di sé, deficit (eliminazione urinaria e fecale) Incapacità o mancanza di volontà per (specificare): <input checked="" type="checkbox"/> servirsi del gabinetto/comoda <input checked="" type="checkbox"/> trasferirsi sul gabinetto/comoda <input checked="" type="checkbox"/> eseguire pratiche igieniche adeguate | X |
| Fattori correlati Fisiopatologici <input checked="" type="checkbox"/> Mancanza di coordinazione motoria per (specificare) <input checked="" type="checkbox"/> Spasticità o flaccidità per (specificare) <input checked="" type="checkbox"/> Debolezza muscolare per (specificare) <input checked="" type="checkbox"/> Paralisi per (specificare) <input checked="" type="checkbox"/> Atrofia per (specificare) <input checked="" type="checkbox"/> Contratture muscolari per (specificare) <input checked="" type="checkbox"/> Stato comatoso <input checked="" type="checkbox"/> Arti non funzionanti o mancanti Trattamenti <input checked="" type="checkbox"/> Uso di dispositivi esterni (apparecchio gessato, tutori ortopedici, infusione endovenosa...) Situazionali (personali, ambientali) <input checked="" type="checkbox"/> Deficit cognitivi <input checked="" type="checkbox"/> Dolore <input checked="" type="checkbox"/> Affaticamento <input checked="" type="checkbox"/> Confusione mentale | |
| Deglutizione, compromissione | X |
| Fattori correlati Fisiopatologici <input checked="" type="checkbox"/> Diminuzione/assenza del riflesso faringeo, difficoltà di masticazione e riduzione della sensibilità (per paralisi cerebrale, miastenia grave, botulismo, M.di Parkinson, tumore cerebrale, danno cerebrale, distrofia muscolare, S. di Guillain Barrè, poliomielite, SLA, ictus cerebrale, danno nervi cranici) | |
| Dolore acuto (Grave fastidio o disagio che dura da 0 a 6 mesi) | X |
| Fattori correlati Fisiopatologici Trauma tissutale e spasmi muscolari riflessi secondari a <input checked="" type="checkbox"/> Disordini muscolo scheletrici (fratture, artrite, contrattura muscolare, spasmi, patologia a carico del midollo spinale) <input checked="" type="checkbox"/> Disordini viscerali (cardiaci, renali, epatici, intestinali, polmonari) <input checked="" type="checkbox"/> Cancro <input checked="" type="checkbox"/> Disordini vascolari (vasospasmo, occlusione, flebite, vasodilatazione/cefalea) <input checked="" type="checkbox"/> Infiammazione di nervi, tendini, capsula articolare, articolazioni, muscoli, strutture articolari. <input checked="" type="checkbox"/> Fatigue, malessere o prurito secondari a malattie infettive (rosolia, pancreatite, epatite, mononucleosi, varicella) <input checked="" type="checkbox"/> Effetti di un tumore su (specificare) <input checked="" type="checkbox"/> Dolori addominali, diarrea, vomito secondari a gastroenterite, ulcera gastrica, influenza. <input checked="" type="checkbox"/> Infiammazione e spasmi della muscolatura liscia per calcoli renali, infezioni gastrointestinali Situazionali (personali, ambientali) <input checked="" type="checkbox"/> Febbre <input checked="" type="checkbox"/> Immobilità/posizionamento inappropriato <input checked="" type="checkbox"/> Iperattività <input checked="" type="checkbox"/> Punti di pressione (es.ingessatura o bendaggio stretti) <input checked="" type="checkbox"/> Risposta allergica <input checked="" type="checkbox"/> Ansia grave e repressa | |

| | |
|--|----------|
| Dolore cronico (Continuo/ intermittente che dura da più di 6 mesi) | X |
| <p>Fattori correlati</p> <p>Fisiopatologici</p> <p>Trauma tissutale e spasmi muscolari riflessi secondari a</p> <ul style="list-style-type: none"> X Disordini muscolo scheletrici (fratture, artrite, contrattura muscolare, spasmi, patologia a carico del midollo spinale) X Disordini viscerali (cardiaci, renali, epatici, intestinali, polmonari) X Cancro X Disordini vascolari (vasospasmo, occlusione, flebite, vasodilatazione/cefalea) X Infiammazione di nervi, tendini, capsula articolare, articolazioni, muscoli, strutture articolari. X Dolori addominali, diarrea, vomito secondari a gastroenterite, ulcera gastrica, influenza. X Infiammazione e spasmi della muscolatura liscia per calcoli renali, infezioni gastrointestinali <p>Situazionali (personali, ambientali)</p> <ul style="list-style-type: none"> X Febbre X Immobilità/posizionamento inappropriato X Iperattività X Punti di pressione (es.ingessatura o bendaggio stretti) X Risposta allergica | |
| Eliminazione urinaria compromessa | X |
| <p>Per Incontinenza urinaria (specificare):</p> <ul style="list-style-type: none"> X Totale (continua, senza presenza di distensione della vescica e/o ritenzione di urine) X Da sforzo (perdita involontaria di urine per aumento della pressione addominale) X Da urgenza (perdita involontaria di urine per urgenza minzionale) X Riflessa (senza sensazione di pienezza vescicale o urgenza minzionale) X Da rigurgito (presenza di distensione della vescica e/o ritenzione di urine) | |
| <p>Fattori correlati</p> <p>Fisiopatologici</p> <ul style="list-style-type: none"> X Anomalie congenite delle vie urinarie X Diminuzione dei segnali vescicali o del loro riconoscimento (per infezioni/tumori/lesioni midollo spinale, neuropatia alcolica e/o diabetica, malattie demielinizzanti, ictus cerebrale, parkinsonismo, sclerosi multipla, farmaci alfa adrenergici) | |
| Fatigue | X |
| <p>Fattori correlati</p> <p>Fisiopatologici</p> <ul style="list-style-type: none"> X Stato ipermetabolico (per malattie virali, febbre, gravidanza) X Inadeguata ossigenazione tissutale (per BPCO, insufficienza cardiaca, anemia, malattia vascolare periferica) X Alterazioni biochimiche (per malattie endocrine e metaboliche come diabete mellito, ipotiroidismo, malattie ipofisarie, AIDS, M Addison, cirrosi epatica, insufficienza renale) X Debolezza muscolare (per miastenia gravis, sclerosi multipla, SLA, M. Parkinson, AIDS) X Stato ipermetabolico, competizione tra organismo e neoplasia per i nutrienti, anemia fattori di stress associati a tumore X Deficit nutrizionali o alterazioni del metabolismo dei nutrienti (per nausea, vomito, diarrea, effetti collaterali dei farmaci, intervento chirurgico allo stomaco, diabete mellito) X Processo infiammatorio cronico (per AIDS, artrite, Lupus eritematoso, epatite, Cirrosi Epatica, malattia infiammatoria intestinale, insufficienza renale) <p>Trattamenti</p> <ul style="list-style-type: none"> X Modificazioni biochimiche secondarie a chemioterapia, radioterapia, effetti collaterali di (specificare) danni tissutali da intervento chirurgico e anestesia, | |

| Immobilizzazione, sindrome da | X |
|--|----------|
| <p>Fattori correlati</p> <p>Fisiopatologici</p> <ul style="list-style-type: none"> X Riduzione del sensorio X Stato di incoscienza X Compromissione muscolo-scheletrica (per fratture e malattie reumatiche) X Disordini psichiatrici/della salute mentale (per depressione grave, stato catatonico, fobie gravi) <p>Trattamenti</p> <ul style="list-style-type: none"> X Ventilazione meccanica X Linee venose X Trazione/gesso/tutore ortopedico X Immobilità prescritta <p>Situazionali (personali, ambientali)</p> <ul style="list-style-type: none"> X Depressione X Fatigue X Stato di debilitazione X Dolore <p>Fasi di sviluppo</p> <ul style="list-style-type: none"> X Persona anziana: ridotta agilità motoria, debolezza muscolare, demenza presenile | |
| Incontinenza fecale | X |
| <p>Fattori correlati</p> <p>Fisiopatologici</p> <ul style="list-style-type: none"> X Compromissione delle funzioni cognitive X Iperdistensione rettale per stipsi cronica X Mancato controllo dello sfintere volontario (per malattia neuromuscolare progressiva, compressione/lesione del midollo spinale, ictus cerebrale, sclerosi multipla) X Trattamenti | |
| Incontinenza urinaria funzionale | X |
| <p>Fattori correlati</p> <p>Fisiopatologici</p> <ul style="list-style-type: none"> X Diminuzione di stimoli vescicali/compromessa capacità di riconoscerli per trauma, infezione, tumore cerebrale, parkinsonismo, sclerosi multipla, neuropatia alcolica, malattie demielinizzanti, ictus cerebrale, demenza progressiva <p>Situazionali (personali, ambientali)</p> <ul style="list-style-type: none"> X Compromissione della mobilità X Diminuita attenzione nei confronti degli stimoli vescicali per depressione, soppressione intenzionale, confusione mentale X Barriere ambientali per l'accesso al bagno (gabinetto distante, letto troppo alto, scarsa illuminazione, spondine laterali, ambiente non familiare) <p>Fasi di sviluppo</p> <ul style="list-style-type: none"> X Persona anziana: perdite motorie/sensitive | |

| Incontinenza urinaria totale (compromessa eliminazione urinaria) | X |
|---|---|
| <p>Fattori correlati</p> <p>Fisiopatologici</p> <ul style="list-style-type: none"> X Anomalie congenite delle vie urinarie X Diminuita capacità vescicale o irritazione vescicale per trauma, carcinoma, infezione uretrite, glicosuria X Diminuzione dei segnali vescicali o compromessa capacità di riconoscerli per infezione/tumore/lesione del midollo spinale, neuropatia diabetica/alcolica, malattie demielinizzanti, ictus cerebrale, parkinsonismo, lesione cerebrale, sclerosi multipla <p>Trattamenti</p> <ul style="list-style-type: none"> X Riduzione del tono muscolare per per anestesia generale o spinale, terapia farmacologica e iatrogenesi (farmaci miorilassanti, anestetici, diuretici, antistaminici, anticolinergici, immunodepressori, adrenalina, ansiolitici) <p>Situazionali (personali, ambientali)</p> <ul style="list-style-type: none"> X Compromissione della mobilità X Barriere ambientali per l'accesso al bagno (gabinetto distante, letto troppo alto, scarsa illuminazione, sponde laterali, ambiente non familiare) <p>Fasi di sviluppo</p> <ul style="list-style-type: none"> X Persona anziana: perdite motorie/sensitive | |

| Infezione, rischio di | X |
|---|---|
| <p>Fattori correlati</p> <p>Fisiopatologici</p> <ul style="list-style-type: none"> X Compromissione delle difese dell'ospite per cancro, malattie respiratorie, ematologiche, periodontali, malattie epatiche, artrite, diabete mellito, malattie ereditarie, AIDS, alcolismo, immunosoppressione (secondaria a- specificare) <p>Trattamenti</p> <ul style="list-style-type: none"> X Sede di possibile invasione di microorganismi per intervento chirurgico, intubazione, linee invasive, nutrizione parenterale totale, dialisi, nutrizione enterale <p>Situazionali (personali, ambientali)</p> <ul style="list-style-type: none"> X Possibile sede di invasione di microorganismi per trauma accidentale/intenzionale, periodo postpartum, morso di insetto/animale/umano, lesione termica, ambiente caldo/umido/buio (apparecchio gessato) X Contatto con agenti contaminanti (infezioni nosocomiali o di comunità) <p>Fasi di sviluppo</p> <ul style="list-style-type: none"> X Persona anziana: maggiore vulnerabilità per diminuzione della risposta immunitaria, condizione debilitante, malattia cronica) | |

| Insonnia | X |
|--|---|
| <p>Fattori correlati</p> <p>Fisiopatologici</p> <ul style="list-style-type: none"> X Compromissione del trasporto di ossigeno (per angina, disturbi circolatori/respiratori, arteriosclerosi periferica) <p>Situazionali (personali, ambientali)</p> <ul style="list-style-type: none"> X Eccessiva iperattività (per disturbo bipolare/ da deficit dell'attenzione, panico, uso di droghe) X Eccessivo dormire di giorno X Depressione X Dolore cronico X Paura | |

| | |
|---|----------|
| Integrità mucosa orale, compromissione | X |
| <p>Fattori correlati</p> <ul style="list-style-type: none"> X Inadeguata igiene orale X Incapacità di provvedere all'igiene orale | |
| Ipertermia | X |
| <p>Fattori correlati</p> <p>Trattamenti</p> <ul style="list-style-type: none"> X Ridotta capacità di sudorazione (specificare il farmaco) <p>Situazionali</p> <ul style="list-style-type: none"> X Diminuzione della circolazione (per persona sovrappeso/sottopeso, disidratazione) | |
| Ipotermia | X |
| <p>Fattori correlati</p> <p>Situazionali (personali, ambientali)</p> <ul style="list-style-type: none"> X Esposizione a freddo, pioggia, neve, vento X Vestiario inadatto al clima X Impossibilità di pagare l'affitto o il riscaldamento | |
| Lesione, rischio di | X |
| <p>Fattori correlati</p> <p>Fisiopatologici</p> <ul style="list-style-type: none"> X Alterazioni delle funzioni cerebrali per ipossia (vertigini, sincope) X Alterazioni della mobilità (ictus cerebrale, artrite, parkinsonismo, perdita di un arto, compromissione della vista/udito) X Fatigue X Ipotensione ortostatica X Disturbi vestibolari X Inadeguata consapevolezza dei rischi ambientali (confusione mentale) X Movimenti tonico-clonici (convulsioni) <p>Trattamenti</p> <ul style="list-style-type: none"> X Lungo allettamento X Effetti sulla mobilità/sensorio (sedativi, miorilassanti...specificare) X Gesso, stampelle, deambulatore, bastone <p>Situazionali (personali, ambientali)</p> <ul style="list-style-type: none"> X Diminuzione o perdita memoria a breve termine X Ambiente non familiare (es. Ospedale) X Andatura instabile <p>Fasi di sviluppo</p> <ul style="list-style-type: none"> X Persona anziana: alterata capacità di giudizio (per deficit cognitivi), stile di vita sedentario, perdita di forza muscolare | |

| Liquidi, eccessivo volume di | X |
|--|---|
| Fattori correlati Fisiopatologici <ul style="list-style-type: none"> X Compromissione dei meccanismi regolatori (per insufficienza renale acuta/cronica, disfunzioni endocrine, anomalie sistemiche metaboliche, lipoedema) X Ipertensione portale, diminuzione della pressione colloidale-osmotica e ritenzione di sodio (per epatopatia, cancro, cirrosi, ascite) X Anomalie venose e arteriose (vene varicose, vasculopatia periferica, Trombosi, flebite, immobilità, linfoedema, infezioni, trauma, neoplasie) Trattamenti <ul style="list-style-type: none"> X Ritenzione di sodio e acqua (terapia corticosteroidica) X Inadeguato drenaggio linfatico (mastectomia) Situazionali (personali, ambientali) <ul style="list-style-type: none"> X Eccessivo apporto di sodio/liquidi X Inadeguato apporto proteico (dieta squilibrata, malnutrizione) X Ristagno venoso declive/venostasi (per immobilità, prolungata stazione eretta/posizione seduta, gesso/fasciatura stretta) Fasi di sviluppo <ul style="list-style-type: none"> X Persona anziana: compromissione del ritorno venoso per aumento delle resistenze periferiche e diminuzione dell'efficienza valvolare | |
| Liquidi, insufficiente volume di | X |
| Fattori correlati Fisiopatologici <ul style="list-style-type: none"> X Eccessiva emissione di urine (per diabete mellito insipido, diabete mellito scompensato) X Aumento della permeabilità capillare e evaporazione da ustioni X Perdite (febbre, aumento del metabolismo, drenaggio accentuato, ferite, peritonite, diarrea, emorragia) Situazionali (personali, ambientali) <ul style="list-style-type: none"> X Vomito/nausea X Diminuita motivazione a bere (depressione, fatigue) X Dieta scorretta/digiuno X Nutrizione per sonda con soluzione concentrata X Difficoltà a deglutire/assumere alimenti (dolore orale, fatigue) X Esposizione a climi estremi X Perdita eccessiva (cateteri a permanenza, drenaggi) X Liquidi insufficienti in rapporto all'esercizio fisico/condizioni climatiche X Uso eccessivo di lassativi o clisteri, diuretici, alcol, caffeina Fasi di sviluppo <ul style="list-style-type: none"> X Persona anziana: aumentata vulnerabilità a ridotta riserva idrica, ridotta sensazione di sete | |
| Memoria, compromissione | X |
| Fattori correlati Fisiopatologici <ul style="list-style-type: none"> X Alterazioni del SNC (per malattia cerebrale degenerativa, ictus cerebrale, lesione/trauma cranico) Trattamenti <ul style="list-style-type: none"> X Effetti dei farmaci sulla memorizzazione delle informazioni | |

| Mobilità, compromissione /rischio di | X |
|---|----------|
| Fattori correlati Fisiopatologici <ul style="list-style-type: none"> X riduzione della forza e della resistenza per compromissione neuromuscolare (malattie autoimmunitarie, del sistema nervoso, respiratorie, distrofia muscolare, paralisi parziale, tumore del SNC, tumore, trauma, ipertensione endocranica, deficit sensoriale) X riduzione della forza e della resistenza per compromissione muscoloscheletrica (fratture, malattie del tessuto connettivo, condizioni cardiache) X rigidità delle articolazioni o contratture (per malattia infiammatoria, interventi endoprotesi ortopedica articolare, malattia degenerativa delle articolazioni e del disco) X edemi X apparecchi esterni (gesso/splint, corsetto ortopedico, catetere venoso) Situazionali (personali, ambientali) <ul style="list-style-type: none"> X fatigue X dispnea X dolore Fasi di sviluppo <ul style="list-style-type: none"> X Persona anziana: diminuzione dell'agilità e debolezza muscolare | |
| Nausea | X |
| Fattori correlati Fisiopatologici <ul style="list-style-type: none"> X Trauma tissutale e spasmi muscolari riflessi (per gastroenterite acuta, ulcera gastrica, sindrome colon irritabile, pancreatite, infezioni, tossoinfezioni alimentari, intossicazioni da farmaci, calcolosi renale, crampi uterini, malessere da movimento, stress) | |
| Non adesione (a indicazioni terapeutiche) | X |
| Fattori correlati Fisiopatologici <ul style="list-style-type: none"> X Compromessa capacità di prestazione a causa di una disabilità (scarsa memoria, deficit motori/sensitivi) X Aumento dei sintomi correlati alla malattia nonostante la precedente adesione al regime terapeutico consigliato Trattamenti <ul style="list-style-type: none"> X Effetti collaterali della terapia X Ambiente non terapeutico X Terapia complessa non controllata/prolungata X Costo economico della terapia Situazionali (personali, ambientali) <ul style="list-style-type: none"> X Presenza di barriere per l'accesso (per problemi di mobilità/trasporto/economici, mancanza di assistenza per i figli, tempo inclemente) X Malattia concomitante di un membro della famiglia (mancato sostegno da parte della famiglia/amici/comunità) X Barriere alla comprensione (per deficit cognitivi/visivi/uditivi, difficoltà di memoria, ansia, fatigue, ridotta attenzione, problemi motivazionali) | |

| Nutrizione inferiore al fabbisogno, rischio di | X |
|--|---|
| <p>Fattori correlati</p> <p>Fisiopatologici</p> <ul style="list-style-type: none"> X Aumentato fabbisogno calorico e difficoltà ad assumere sufficienti calorie (per ustione, trauma, complicanze/deformazioni gastrointestinali, cancro, alcolismo, uso di sostanze stupefacenti, infezione, AIDS) X Disfagia (per ictus cerebrale, M.di Parkinson, palatoschisi, distrofia muscolare, paralisi cerebrale, paralisi facciale, SLA, disturbi neuromuscolari) X Diminuzione dell'appetito (per alterazioni dello stato di coscienza) X Rifiuto ad alimentarsi (timore di essere avvelenato/ comportamento paranoico) X Inappetenza e diarrea (per infezione da protozoi) X Inappetenza e compromissione del metabolismo proteico/lipidico, ipovitaminosi (per cirrosi epatica) X Inappetenza, vomito e alterazione della digestione (per malformazioni del tratto gastrointestinale /enterocolite necrotizzante) <p>Situazionali (personali, ambientali)</p> <ul style="list-style-type: none"> X Incapacità di masticare (per adentulia, carie, protesi non adatta) X Diarrea | |
| Respirazione, inefficace funzionalità, rischio | X |
| <p>Fattori correlati</p> <p>Fisiopatologici</p> <ul style="list-style-type: none"> X Secrezioni eccessive o dense (per infezione, infiammazione, allergia, patologie cardiopolmonari, fumo) X Immobilità stasi delle secrezioni, tosse inefficace (per malattie del SN, depressione del SNC/trauma cranico, ictus cerebrale, tetraplegia) <p>Trattamenti</p> <ul style="list-style-type: none"> X Immobilità (per effetto sedativo di farmaci, droghe o sostanze chimiche, anestesia) | |
| Stipsi | X |
| <p>Fattori correlati</p> <p>Fisiopatologici</p> <ul style="list-style-type: none"> X Diminuita risposta al bisogno di defecare (disturbi dell'umore) X Dolore alla defecazione (per emorroidi, lesione dorsale) X Diminuita peristalsi secondaria a ipossia cardiaca/polmonare X Disturbi della mobilità secondari a sindrome da intestino irritabile <p>Trattamenti</p> <ul style="list-style-type: none"> X Effetti collaterali di farmaci (specificare) X Uso abituale di lassativi <p>Situazionali (personali, ambientali)</p> <ul style="list-style-type: none"> X Diminuzione della peristalsi (per immobilità, gravidanza, stress, mancanza di esercizio fisico) X Modello di evacuazione irregolare X Mancanza di riservatezza X Dieta priva di scorie, assunzione di liquidi inadeguata X Paura di dolore rettale o cardiaco X Incapacità di percepire i segnali intestinali | |



| | |
|--|----------|
| Stress, sovraccarico psicofisico | X |
| Fattori correlati Fisiopatologici X Necessità di far fronte a malattie acute, croniche, terminali, nuove diagnosi, condizioni deturpanti Situazionali (personali, ambientali) X Perdite funzionali | |
| Trauma, rischio Vedere rischio di lesione | X |

Allegato 3
PROBLEMI COLLABORATIVI PRELEVALEMENTE TRATTATI

 Selezionare (X) le caselle relative ai problemi collaborativi di interesse
(riferimenti bibliografici: L.J.Carpenito-Diagnosi infermieristiche - 5th. ed. C.E.A. Edizioni, 2010)

| | |
|---|---|
| Rischio di complicanze (RC) per disfunzione cardiaca/ vascolare | |
| RC per emorragia | X |
| RC per riduzione della gittata cardiaca | X |
| RC per aritmie | X |
| RC per edema polmonare | X |
| RC per trombosi venosa profonda | X |
| RC per ipovolemia | X |
| RC per sindrome compartimentale | X |
| RC per embolia polmonare | X |
| Rischio di complicanze (RC) per disfunzione respiratoria | |
| RC per ipossiemia | X |
| RC per atelectasia/polmonite | X |
| RC per costrizione tracheobronchiale | X |
| RC per pneumotorace | X |
| Rischio di complicanze (RC) per disfunzione metabolica/immunitaria/ematopoietica | |
| RC per ipo/iperglicemia | X |
| RC per bilancio azotato negativo | X |
| RC per squilibri elettrolitici | X |
| RC per sepsi | X |
| RC per acidosi (metabolica, respiratoria) | X |
| RC per alcalosi (metabolica, respiratoria) | X |
| RC per reazione allergica | X |
| Rc per trombocitopenia | X |
| RC per infezioni opportunistiche | X |
| RC per crisi falciforme | X |
| Rischio di complicanze (RC) per disfunzione renale / urinaria | |
| RC per ritenzione urinaria acuta | X |
| RC per insufficienza renale | X |
| RC per calcoli renali | X |
| Rischio di complicanze (RC) per disfunzione neurologica / sensoriale | |
| RC per ipertensione endocranica | X |
| RC per crisi convulsiva | X |
| RC per ipertensione intraoculare | X |
| RC per sindrome neurolettica maligna | X |
| RC per astinenza da alcol | X |

| Rischio di complicanze (RC) per disfunzione gastrointestinale / epatica / biliare | |
|---|----------|
| RC per ileo paralitico | X |
| RC per sanguinamento gastrointestinale | X |
| RC per disfunzione epatica | X |
| RC per iperbilirubinemia | X |
| Rischio di complicanze (RC) per disfunzione muscoloscheletrica | |
| RC per fratture patologiche | X |
| RC per lussazione | X |
| Rischio di complicanze (RC) per effetti avversi (EA) della terapia farmacologica | |
| RC per effetti avversi della terapia con farmaci anticoagulanti | X |
| RC per effetti avversi della terapia con farmaci ansiolitici | X |
| RC per effetti avversi della terapia con farmaci adrenocorticosteroidi | X |
| RC per effetti avversi della terapia con farmaci antineoplastici | X |
| RC per effetti avversi della terapia con farmaci anticonvulsivanti | X |
| RC per effetti avversi della terapia con farmaci antidepressivi | X |
| RC per effetti avversi della terapia con farmaci antiaritmici | X |
| RC per effetti avversi della terapia con farmaci antipsicotici | X |
| RC per effetti avversi della terapia con farmaci antipertensivi | X |
| RC per effetti avversi della terapia con farmaci betabloccanti | X |
| RC per effetti avversi della terapia con farmaci calcioantagonisti | X |
| RC per effetti avversi della terapia con farmaci inibitori dell'enzima di conversione dell'angiotensina | X |
| RC per effetti avversi della terapia con farmaci inibitori dei recettori dell'angiotensina | X |
| RC per effetti avversi della terapia con farmaci diuretici | X |

Allegato 4

APPRENDIMENTO OFFERTO

In relazione alle diagnosi infermieristiche / problemi collaborativi sopra indicati, descrivere le opportunità formative per lo studente che caratterizzano la sede di apprendimento.
Esempio: interventi assistenziali infermieristici, modelli organizzativi e/o di presa in carico assistenziale, attività di ricerca e innovazione.

Nella degenza del nostro pronto soccorso viene impiegato il modello per piccole equipe

ATTIVITA' TECNICHE ASSISTENZIALI SPECIFICHE

- Valutazione della persona in triage in base a un'attribuzione di codice di priorità
- Assistenza alle persone con problematiche potenzialmente evolutive
- Preparazione della persona che si deve sottoporre a intervento chirurgico
- Preparazione della persona che si deve sottoporre a PTCA
- Preparazione della persona che si deve sottoporre a esami diagnostici invasivi e non
- Assistenza post esame diagnostico
- Gestione del politrauma
- Assistenza della persona in stato di coma
- Gestione della NIV
- Gestione dei drenaggi (toracici e addominali)
- Monitorizzazione elettrocardiografica e dei parametri vitali
- Aspirazione vie aeree
- Gestione SNG
- Gestione ossigenoterapia e aerosolterapia
- Gestione accessi venosi centrali e accessi arteriosi
- Gestione vie aeree
- Gestione PIC (pressione intracranica)
- Assistenza alle persone nel soccorso extraospedaliero
- Gestione delle situazioni di periarresto e arresto cardiaco
- Assistenza alla persona con dolore acuto
- Assistenza alle persone con lesioni da ducubito

PROTOCOLLI IN USO NEL SERVIZIO

- Utilizzo dei DPI
- Smaltimento dei rifiuti DPR 254 del 2003
- ALS
- Gestione del politrauma
- Gestione della persona in isolamento
- Gestione della persona sottoposta a trombolisi
- Gestione del rischio biologico
- Emergenza sanitaria extraospedaliera
- Emergenza sanitaria intraospedaliera
- Gestione della persona affetta da SARS
- Gestione della persona con influenza umana A/H1N1