

## OFFERTA FORMATIVA DELLA SEDE DI TIROCINIO

Contesto	
<p><b>Tutor clinico</b> Contatti e riferimenti</p>	<p>Nome <b>RENATO</b> Cognome <b>PORCU</b> Telefono 0112403070 e-mail <a href="mailto:renato.porcu@unito.it">renato.porcu@unito.it</a></p>
<p><b>Struttura/servizio</b> Nominativo, ubicazione, ecc N°locali, n° posti letto, Orari apertura al pubblico, Orari di lavoro, Figure professionali Risorse strumentali Servizi agli studenti (mensa, biblioteca, accesso internet, ecc)</p> <p><b>Contatti e riferimenti</b></p>	<p>Dipartimento Salute Mentale Sc Rot Psichiatria Nord Ovest Via Schio, 1 – Via degli Abeti, 16 Torino DA LUN AL VEN 8,30-16,30 Psichiatri, infermieri, ass.soc, psicologi OSS educatori Auto di servizio. No mensa. Internet rete aziendale</p> <p>Indirizzo Via Schio 1 TORINO Telefono 0112403070 Fax e-mail <a href="mailto:aurora.psichiatria@aslcittaditorino.it">aurora.psichiatria@aslcittaditorino.it</a></p>
<p><b>Come raggiungere il servizio</b> Mappa percorso Mezzi pubblici</p>	<p>GTT: 4, 11,51.</p>

**Allegato 1**
**Problemi di salute / Problemi clinici / Percorso diagnostico terapeutici prevalentemente trattati**

Selezionare (X) i problemi di salute prevalenti e indicare le patologie più frequenti

<b>Salute Mentale</b>	<b>X</b>

**Allegato 2**
**Diagnosi Infermieristiche prevalentemente trattate**

Selezionare (X) le caselle relative alle Diagnosi Infermieristiche e ai fattori correlati di interesse (riferimenti bibliografici: L.J.Carpenito-Diagnosi infermieristiche – 5th. ed. C.E.A. Edizioni, 2010)

<b>Ansia</b>	<b>X</b>
Fattori correlati <b>Situazionali (personali, ambientali)</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>X Minaccia reale o percepita al concetto di sé (fallimento, modificazione dello status, mancato riconoscimento da parte degli altri...)</li> <li>X Perdita reale o percepita di persone significative</li> <li>X Cambiamento ambientale reale o percepito (trasloco, ospedalizzazione, pensionamento, condizione di rifugiato, reclusione, calamità naturali, rischi per la sicurezza...)</li> <li>X Cambiamento reale o percepito delle condizioni socioeconomiche (disoccupazione, cambiamento di lavoro, licenziamento, promozione)</li> </ul> <b>Fasi di sviluppo</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>X Adulto: minaccia al concetto di se per gravidanza, ruolo genitoriale, cambiamento di carriera, effetti dell'invecchiamento, complicanze di una precedente gravidanza, aborto, o morte del feto, insufficiente conoscenza dell'esperienza del travaglio</li> </ul>	

<b>Attività, intolleranza all'attività</b>	<b>X</b>
Fattori correlati <b>Situazionali (personali, ambientali)</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>X Inattività (secondaria a depressione, mancanza di motivazione, stile di vita sedentario, insufficiente conoscenza)</li> <li>X Inadeguata motivazione (secondaria ad utilizzo di ausili, paura di cadere, depressione, obesità, dolore, dispnea)</li> </ul>	

<b>Autolesionismo, automutilazione, rischio di</b>	<b>X</b>
Fattori correlati <b>Fisiopatologici</b> X Squilibri biochimici / neurofisiologici (disturbo bipolare, autismo, compromissione mentale) <b>Personali</b> X Pregressi episodi di autolesionismo X Abusi fisici, psichici, o sessuali X Incapacità di esprimere verbalmente i sentimenti	
<b>Autostima, Disturbo/Rischio di</b>	<b>X</b>
Fattori correlati <b>Situazionali (personali, ambientali)</b> X Bisogno di dipendenza non soddisfatto X Senso di abbandono (per morte di una persona significativa, rapimento/uccisione di un figlio, separazione da una persona significativa) X Senso di fallimento ( per perdita del lavoro/incapacità di lavorare, problemi economici, liti coniugali, parenti acquisiti, aumento/diminuzione del peso, separazione, disoccupazione, problemi relazionali, patrigno/matrigna) X Aggressione subita personalmente o di altra persona della stessa età / comunità X Relazione inefficace con i propri genitori X Relazioni abusive X Aspettative irrealistiche verso di se o verso i propri genitori/figli X Rifiuto da parte dei genitori, punizioni incoerenti, abbandono o insuccesso correlato a istituzionalizzazione X Storia di numerosi insuccessi	
<b>Caregiver, tensione nel ruolo di /Rischio di</b>	<b>X</b>
Fattori correlati <b>Fisiopatologici</b> X Esigenza di assistenza continua/ complessa (per condizioni debilitanti acute/progressive, tossicodipendenza, malattia dal decorso imprevedibile, demenza progressiva, malattia mentale cronica, disabilità) <b>Situazionali (personali, ambientali)</b> X Modello di coping inefficace <b>Fasi di sviluppo</b> X Esigenza di assistenza continua secondaria a disabilità mentali (specificare) o disabilità fisiche (specificare)	
<b>Casa, compromessa gestione</b>	<b>X</b>
Fattori correlati <b>Situazionali (personali, ambientali)</b> X Modificazioni delle capacità funzionali di un membro della famiglia (specificare) per lesione (es. frattura di un arto/lesione del midollo spinale), intervento chirurgico, alterazione dello stato mentale (vuoti di memoria, depressione, ansia-panico grave), abuso di sostanze. X Mancata disponibilità di un sistema di sostegno X Perdita di un familiare X Deficit di conoscenze X Insufficienza di risorse economiche	

<b>Comunicazione, compromissione e Comunicazione verbale, compromissione</b> (incapacità a pronunciare le parole ma è in grado di comprendere)	<b>X</b>
<p>Fattori correlati</p> <p><b>Fisiopatologici</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>X Pensieri disordinati e non realistici secondari a schizofrenia, delirio, psicosi, paranoia</li> </ul> <p><b>Situazionali (personali, ambientali)</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>X Diminuita attenzione (per affaticamento, collera, ansia, o dolore)</li> <li>X Barriere psicologiche (paura, timidezza)</li> <li>X Mancanza di riservatezza</li> </ul> <p><b>Fasi di sviluppo</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>X Compromissione cognitiva per (specificare patologia)</li> </ul>	
<b>Concetto di se, disturbo del</b>	<b>X</b>
<p>Fattori correlati</p> <p><b>Situazionali (personali, ambientali)</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>X Senso di abbandono/fallimento secondario a perdita del lavoro/della capacità di lavorare, divorzio, separazione o perdita di persona significativa</li> <li>X Rapporti insoddisfacenti parentali /coniugali</li> <li>X Preferenze sessuali</li> <li>X Esperienze di violenza da parte dei genitori</li> <li>X Cambiamento del consueto modello di responsabilità</li> </ul> <p><b>Fasi di sviluppo</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>X Età di mezzo (perdita di ruoli/responsabilità)</li> </ul>	
<b>Confusione mentale acuta</b>	<b>X</b>
<p>Fattori correlati</p> <p><b>Fattori di rischio</b></p> <p><b>Situazionali (personali, ambientali)</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>X Disturbo del metabolismo cerebrale per astinenza da alcool, sedativi, ipnotici, intossicazione da metalli pesanti o da monossido di carbonio.</li> </ul>	
<b>Coping inadeguato della famiglia</b>	<b>X</b>
<p>Fattori correlati</p> <p><b>Biofisiopatologici</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>X Compromissione della capacità di esercitare la responsabilità di ruolo per malattia acuta/cronica</li> </ul> <p><b>Situazionali (personali, ambientali)</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>X Compromissione della capacità di gestire in modo costruttivo gli agenti stressanti (per dipendenza da sostanze, scarsa autostima, alcolismo, storia di relazioni inefficaci con i propri genitori, modelli di ruolo negativi, storia di relazioni abusive)</li> <li>X Aspettative non realistiche dei genitori nei confronti di se stessi/dei figli</li> <li>X Aspettative non realistiche dei figli nei confronti di se stessi/dei genitori</li> <li>X Bisogni psicosociali non soddisfatti dai genitori / dai figli</li> </ul>	

<b>Coping inefficace</b>	<b>X</b>
<p>Fattori correlati</p> <p><b>Fisiopatologici</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>X Cronicità della condizione, variazioni biochimiche dell'encefalo (disordine della personalità, disordine bipolare, schizofrenia, disordine da scarsa attenzione)</li> <li>X Alterazione dello stato d'animo (per reazioni organiche, tumore cerebrale, assunzione di sostanze, reazioni organiche, ritardo mentale)</li> </ul> <p><b>Trattamenti</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>X Separazione dalla famiglia e dalla casa (ospedalizzazione, ricovero in struttura sanitaria residenziale, ecc)</li> </ul> <p><b>Situazionali (personali, ambientali)</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>X Scarso controllo degli impulsi e bassa tolleranza alla frustrazione</li> <li>X Criticità delle relazioni con genitori/caregiver</li> <li>X Disorganizzazione del sistema familiare</li> <li>X Inefficace capacità di problem solving</li> <li>X Aumento del consumo di cibo per reazione allo stress</li> <li>X Rottura legami affettivi (morte, separazione, diserzione, carcere, istituzionalizzazione, adozione/affidamento)</li> <li>X Inadeguate risorse psicologiche (per scarsa autostima, considerazione di se negativa, senso di impotenza, mancanza di motivazione per reagire, modelli di ruolo negativi)</li> </ul> <p><b>Fasi di sviluppo</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>X Adulto giovane età: scelte di carriera, condizione di genitore, matrimonio, abbandono della casa dei genitori, esigenze formative.</li> <li>X Adulto mezza età: segni fisici di invecchiamento, bisogni relativi alla condizione sociale, problemi con i familiari, della cura dei figli, pressioni legate alla carriera, genitori anziani.</li> </ul>	
<b>Cura di sé, deficit (alimentazione)</b>	<b>X</b>
<p><b>Incapacità di (specificare):</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>X tagliare gli alimenti e/o aprire le confezioni</li> <li>X portare il cibo alla bocca</li> </ul>	
<p>Fattori correlati</p> <p><b>Fisiopatologici</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>X Comportamenti ritualistici</li> </ul> <p><b>Situazionali (personali, ambientali)</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>X Confusione mentale</li> <li>X Ansia che paralizza</li> </ul>	
<b>Cura di sé, deficit (bagno/igiene personale)</b>	<b>X</b>
<p><b>Ridotta e/o incapacità di (specificare):</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>X lavare il proprio corpo o parti</li> <li>X percepire il bisogno di cure igieniche</li> </ul>	
<p>Fattori correlati</p> <p><b>Fisiopatologici</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>X Comportamenti ritualistici</li> </ul> <p><b>Situazionali (personali, ambientali)</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>X Affaticamento</li> <li>X Confusione mentale</li> <li>X Ansia che paralizza</li> </ul>	

<b>Cura di sé, deficit (bagno/igiene personale)</b> <b>Ridotta e/o incapacità di (specificare):</b> <input checked="" type="checkbox"/> curare il proprio aspetto <input checked="" type="checkbox"/> percepire il bisogno di cure igieniche	<b>X</b>
Fattori correlati <b>Fisiopatologici</b> <input checked="" type="checkbox"/> Comportamenti ritualistici <b>Situazionali (personali, ambientali)</b> <input checked="" type="checkbox"/> Scarsa motivazione <input checked="" type="checkbox"/> Affaticamento <input checked="" type="checkbox"/> Confusione mentale <input checked="" type="checkbox"/> Ansia che paralizza	
<b>Cura di sé, deficit (strumentale)</b> <b>Difficoltà a (specificare)</b> <input checked="" type="checkbox"/> accedere ai mezzi di trasporto <input checked="" type="checkbox"/> lavare e stirare <input checked="" type="checkbox"/> preparare i pasti <input checked="" type="checkbox"/> fare la spesa <input checked="" type="checkbox"/> gestire il denaro <input checked="" type="checkbox"/> assumere i farmaci	<b>X</b>
Fattori correlati <b>Fisiopatologici</b> <input checked="" type="checkbox"/> Comportamenti ritualistici <b>Situazionali (personali, ambientali)</b> <input checked="" type="checkbox"/> Affaticamento <input checked="" type="checkbox"/> Confusione mentale <input checked="" type="checkbox"/> Ansia che paralizza	
<b>Fatigue</b>	<b>X</b>
Fattori correlati <b>Situazionali (personali, ambientali)</b> <input checked="" type="checkbox"/> Diminuzione prolungata dell'attività (per ansia, febbre, diarrea, dolore, isolamento sociale, nausea/vomito, depressione, obesità) <input checked="" type="checkbox"/> Eccessive richieste di ruolo <input checked="" type="checkbox"/> Richieste emozionali sovraccaricanti <input checked="" type="checkbox"/> Stress emotivo <input checked="" type="checkbox"/> Disturbi del sonno	
<b>Immobilizzazione, sindrome da</b>	<b>X</b>
Fattori correlati <b>Situazionali (personali, ambientali)</b> <input checked="" type="checkbox"/> Depressione <input checked="" type="checkbox"/> Fatigue	

<b>Insomnia</b>	<b>X</b>
Fattori correlati <b>Situazionali (personali, ambientali)</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>X Eccessiva iperattività (per disturbo bipolare/ da deficit dell'attenzione, panico, uso di droghe)</li> <li>X Eccessivo dormire di giorno</li> <li>X Depressione</li> <li>X Risposte ansiose</li> <li>X Paura</li> </ul>	
<b>Lesione, rischio di</b>	<b>X</b>
Fattori correlati <ul style="list-style-type: none"> <li>X Alterata capacità di giudizio ( per stress, droghe, alcol, disidratazione, depressione)</li> </ul>	
<b>Mobilità, compromissione /rischio di</b>	<b>X</b>
Fattori correlati <b>Situazionali (personali, ambientali)</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>X fatigue</li> <li>X obesità</li> <li>X mancanza di motivazione</li> </ul>	
<b>Nutrizione inferiore al fabbisogno, rischio di</b>	<b>X</b>
Fattori correlati <b>Fisiopatologici</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>X Vomito autoindotto, esercizio fisico eccessivo in rapporto alle calorie assunte, anoressia</li> <li>X Rifiuto ad alimentarsi (timore di essere avvelenato/ comportamento paranoico)</li> <li>X Inappetenza/agitazione fisica (per disturbo bipolare)</li> </ul>	
<b>Nutrizione superiore al fabbisogno</b>	<b>X</b>
Fattori correlati <b>Fisiopatologici</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>X Alterato modello di sazietà (specificare)</li> </ul> <b>Trattamenti</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>X Alterazione del senso di sazietà (per farmaci, radiazioni)</li> </ul>	
<b>Stress, sovraccarico psicofisico</b>	<b>X</b>
Fattori correlati <b>Situazionali (personali, ambientali)</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>X Perdita reale o prevista di una persona significativa (per morte, divorzio, trasloco, servizio militare)</li> <li>X Necessità di far fronte a morte, aggressione, guerra</li> <li>X Variazione reale o percepita dello stato socio- economico (per disoccupazione, promozione, nuovo lavoro, pensionamento, distruzione di proprietà personali, perdita/cambiamento della casa, malattia)</li> <li>X Necessità di far fronte a violenza in famiglia, abuso di sostanza, nuovo componente familiare, problemi relazionali</li> </ul>	

Trasloco, stress da	X
<p>Fattori correlati</p> <p><b>Fisiopatologici</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>X Compromissione della capacità di adattamento a nuovi ambienti per peggioramento dello stato di salute fisico (difficoltà fisiche), psico-sociale (stress prima del trasloco, depressione, diminuzione dell'autostima)</li> </ul> <p><b>Situazionali (personali, ambientali)</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>X Risorse economiche insufficienti</li> <li>X Elevati livelli di cambiamenti ( per ammissione in strutture residenziali/di assistenza)</li> <li>X Perdita di legami sociali/familiari</li> <li>X Abbandono</li> <li>X Modifica delle relazioni familiari</li> </ul>	

<p><b>Altre Diagnosi Infermieristiche <u>prevalentemente</u> trattate</b> Indicare eventuali diagnosi infermieristiche e fattori correlati non incluse nell'elenco (riferimenti bibliografici: L.J.Carpenito-Diagnosi infermieristiche - 5th. ed. C.E.A. Edizioni, 2010)</p>
MODELLO DI PERCEZIONE E GESTIONE DELLA MALATTIA
MODELLO COGNITIVO PERCETTIVO
MODELLO DELLA SESSUALITA RIPRODUZIONE
RISCHIO DI SUICIDIO, RISCHIO DI VIOLENZA RIVOLTA A SE / ALTRI



### Allegato 3

#### PROBLEMI COLLABORATIVI PRELEVALEMENTE TRATTATI

Selezionare (X) le caselle relative ai problemi collaborativi di interesse  
(riferimenti bibliografici: L.J.Carpenito-Diagnosi infermieristiche - 5th. ed. C.E.A. Edizioni, 2010)

Rischio di complicanze (RC) per effetti avversi (EA) della terapia farmacologica	
RC per effetti avversi della terapia con farmaci antidepressivi	X
RC per effetti avversi della terapia con farmaci antipsicotici	X

### Allegato 4

#### APPRENDIMENTO OFFERTO

In relazione alle diagnosi infermieristiche / problemi collaborativi sopra indicati, descrivere le opportunità formative per lo studente che caratterizzano la sede di apprendimento.  
Esempio: interventi assistenziali infermieristici, modelli organizzativi e/o di presa in carico assistenziale, attività di ricerca e innovazione.

***Lo studente potrà usufruire delle seguenti opportunità formative:***

- Accoglienza primi casi, colloquio esplorativo, raccolta dati, anamnesi e discussione del caso clinico tramite periodica riunione d'equipe

-Somministrazione della terapia neurolettica, monitorandone gli effetti terapeutici e gli eventuali effetti collaterali, distribuzione farmaci prescritti.

-Organizzare l'assistenza tenendo conto di: risorse disponibili del servizio es. auto, locali, e del personale.