

OFFERTA FORMATIVA DELLA SEDE DI TIROCINIO

Contesto	
<p>Tutor clinico Contatti e riferimenti</p>	<p>Nome DAVIDE Cognome SAITTA Telefono 0112402248 - 0112402285 e-mail: davide.saitta@unito.it</p>
<p>Struttura/servizio -Nominativo, ubicazione, ecc -N°locali, n° posti letto, -Orari apertura al pubblico, -Orari di lavoro, -Figure professionali</p> <p>-Risorse strumentali Servizi agli studenti (mensa, biblioteca, accesso internet, ecc)</p> <p>Contatti e riferimenti</p> <p>Come raggiungere il servizio Mappa percorso Mezzi pubblici</p>	<p>-SS UTIC -locali di degenza: 1 - posti letto: 8 -dalle 13 alle 13,30 – dalle 19,30 alle 20 -h24 -Coordinatore infermieristico – infermieri – personale di supporto (OSS – ASSS) – Medici cardiologi - Psicologi</p> <p>Per le pause previste e concordate gli studenti possono accedere alla tisaneria del reparto -Sono presenti in reparto testi di riferimento di infermieristica -È possibile accedere ad internet da più postazioni</p> <p>Indirizzo: piazza Donatori di Sangue, 3 – 10154 Torino Telefono: 0112402248 - 0112402285 Fax: 0112402346</p> <p>uscite autostradali, Torino-Milano e Torino-Aosta. mezzi pubblici: linee 75 – 57 – 27 - 2</p>

Allegato 1

**Problemi di salute / Problemi clinici / Percorso diagnostico terapeutici
prevalentemente trattati**

Selezionare (X) i problemi di salute prevalenti e indicare le patologie più frequenti

Malattie Cardiovascolari	X
<ul style="list-style-type: none">- STEMI - NSTEMI/ANGINA INSTABILE- SCOMPENSO CARDIACO- MALATTIA DELLE VIE DI CONDUZIONE- ARITMIE	

Allegato 2
Diagnosi Infermieristiche prevalentemente trattate

Selezionare (X) le caselle relative alle Diagnosi Infermieristiche e ai fattori correlati di interesse (riferimenti bibliografici: L.J.Carpenito-Diagnosi infermieristiche – 5th. ed. C.E.A. Edizioni, 2010)

Ansia Definizione: Stato in cui una persona prova senso di inquietudine o apprensione in risposta a stimoli interni o esterni che possono essere comportamentali emozionali, cognitivi e fisici.	X
Fattori correlati <input checked="" type="checkbox"/> Modificazione dello status di prestigio <input checked="" type="checkbox"/> Mancato riconoscimento da parte degli altri <input checked="" type="checkbox"/> Trasmissione dell'ansia stessa da altre persone <input checked="" type="checkbox"/> Ospedalizzazione <input checked="" type="checkbox"/> Procedure invasive <input checked="" type="checkbox"/> Separazione <input checked="" type="checkbox"/> Perdite motorie <input checked="" type="checkbox"/> Malattia <input checked="" type="checkbox"/> Minaccia del concetto di sé <input checked="" type="checkbox"/> Problemi finanziari <input checked="" type="checkbox"/> Invecchiamento	
Attività, intolleranza all'attività Definizione: Riduzione della capacità fisica di sopportare l'attività a livello desiderato o richiesto	X
Fattori correlati <input checked="" type="checkbox"/> Compromissione del sistema di trasporto dell'ossigeno secondario a patologie cardiache <input checked="" type="checkbox"/> Bpco <input checked="" type="checkbox"/> Atelecatsia <input checked="" type="checkbox"/> Anemia <input checked="" type="checkbox"/> Ipovolemia e arteriopatia periferica <input checked="" type="checkbox"/> Malattie croniche (IRC – neurologiche- epatiche) <input checked="" type="checkbox"/> Infezioni acute o croniche <input checked="" type="checkbox"/> Malnutrizione (cachessia/obesità) <input checked="" type="checkbox"/> Trattamenti e procedure diagnostiche e terapeutiche <input checked="" type="checkbox"/> Mancanza di motivazione e depressione <input checked="" type="checkbox"/> All'età del paziente	
Cadute, rischio Vedere lesione, rischio	X



Comunicazione, compromissione e Comunicazione verbale, compromissione (incapacità a pronunciare le parole ma è in grado di comprendere)	X
<p>Fattori correlati</p> <p>Fisiopatologici</p> <ul style="list-style-type: none"> X Patologia del sistema nervoso (es miastenia grave, distrofia muscolare, malattia di Alzheimer) X Compromissione della capacità di produrre il linguaggio (per compromissione respiratoria, dispnea, edema, infezione della laringe, deformità del cavo orale, labio/palatoschisi, malocclusione o frattura mascellare, adentulia, disartria) <p>Trattamenti</p> <ul style="list-style-type: none"> X Compromissione della capacità di produrre il linguaggio (per intubazione endotracheale, tracheotomia, tracheostomia, laringectomia, intervento chirurgico cranico, al viso, al collo, alla bocca, dolore alla bocca o faringeo, depressione cognitiva da farmaci depressivi il SNC/anestetici) <p>Situazionali (personali, ambientali)</p> <ul style="list-style-type: none"> X Diminuita attenzione (per affaticamento collera, ansia, o dolore) X Mandata disponibilità di apparecchio acustico o suo malfunzionamento X Barriere psicologiche (paura, timidezza) X Mancanza di riservatezza X Barriera linguistica (non disponibilità di interprete) <p>Fasi di sviluppo</p> <ul style="list-style-type: none"> X Persona anziana (perdite uditive) X Compromissione cognitiva per (specificare patologia) 	
Concetto di se, disturbo del	X
<p>Fattori correlati</p> <p>Situazionali (personali, ambientali)</p> <ul style="list-style-type: none"> X Immobilità o perdita di funzioni <p>Fasi di sviluppo</p> <ul style="list-style-type: none"> X Persona anziana (perdita di ruoli/responsabilità) 	
Confusione mentale acuta Definizione: stato caratterizzato dall'improvvisa insorgenza di un insieme di disturbi globali e fluttuanti che riguardano il livello di coscienza l'attenzione, la percezione, la memoria, l'orientamento, il pensiero, il ciclo sonno veglia, il comportamento psico motorio.	X
<p>Fattori correlati</p> <ul style="list-style-type: none"> X Ipossia cerebrale X Ipovolemia X Acidosi/alcalosi X Squilibri idroelettrolitici X Deficit nutrizionali X Disturbi vascolari X Infezioni X Disordini metabolici X Astinenza da sostanze X Patologie neurologiche X Effetti collaterali da farmaci 	

- X Dolore
- X Immobilità
- X Depressione

Coping inadeguato della famiglia

X

Fattori correlati

Biofisiopatologici

- X Compromissione della capacità di esercitare la responsabilità di ruolo per malattia acuta/cronica

Situazionali (personali, ambientali)

- X Compromissione della capacità di gestire in modo costruttivo gli agenti stressanti (per dipendenza da sostanze, scarsa autostima, alcolismo, storia di relazioni inefficaci con i propri genitori, modelli di ruolo negativi, storia di relazioni abusive)

Coping inefficace

X

Fattori correlati

Fisiopatologici

- X Complessità del regime di autocura, variazioni neurologiche nell'encefalo (Morbo di Alzheimer, infarto cerebrale, sclerosi multipla, malattie in stadio terminale)
- X Alterazione dell'integrità corporea (perdita di una parte del corpo, deturpazione)

Fasi di sviluppo

- X Adulto mezza età: segni fisici di invecchiamento, bisogni relativi alla condizione sociale, problemi con i familiari, della cura dei figli, pressioni legate alla carriera, genitori anziani.
- X Persona anziana: inadeguatezza delle risorse psicologiche per modificazioni fisiche, reazioni degli altri verso l'anziano, pensionamento, cambiamento di residenza, di condizioni economiche

Cura di sé, sindrome da deficit

X

Fattori correlati

Fisiopatologici

- X Mancanza di coordinazione motoria per (specificare)
- X Spasticità o flaccidità per (specificare)
- X Debolezza muscolare per (specificare)
- X Paralisi per (specificare)
- X Atrofia per (specificare)
- X Contratture muscolari per (specificare)
- X Stato comatoso
- X Disturbi visivi
- X Arti non funzionanti o mancanti

Trattamenti

- X Uso di dispositivi esterni (apparecchio gessato, tutori ortopedici, infusione endovenosa...)
- X Affaticamento e dolore post operatori

Situazionali (personali, ambientali)

- X Deficit cognitivi
- X Dolore
- X Scarsa motivazione
- X Affaticamento
- X Confusione mentale
- X Ansia che paralizza

Deambulazione, compromissione, rischio Vedere mobilità, compromissione, rischio	X
--	----------

Deglutizione, compromissione	X
-------------------------------------	----------

<p>Fattori correlati</p> <p>Fisiopatologici</p> <ul style="list-style-type: none"> X Diminuzione/assenza del riflesso faringeo, difficoltà di masticazione e riduzione della sensibilità (per paralisi cerebrale, miastenia grave, botulismo, M.di Parkinson, tumore cerebrale, danno cerebrale, distrofia muscolare, S. di Guillain Barrè, poliomielite, SLA, ictus cerebrale, danno nervi cranici) X Tumore / edema tracheo-esofageo <p>Trattamenti</p> <ul style="list-style-type: none"> X Riduzione della coscienza per anestesia X Ostruzione meccanica secondaria a cannula tracheostomica <p>Situazionali (personali, ambientali)</p> <ul style="list-style-type: none"> X Alterazione del livello di coscienza X Fatigue <p>Fasi di sviluppo</p> <ul style="list-style-type: none"> X Persona anziana: riduzione della salivazione o del gusto 	
--	--

Dolore acuto (Grave fastidio o disagio che dura da 0 a 6 mesi) Definizione: Stato in cui la persona ha o riferisce la presenza di un grave fastidio o di una sensazione di disagio che dura da un secondo a meno sei mesi.	X
--	----------

<p>Fattori correlati</p> <ul style="list-style-type: none"> X vaso spasma X flebite X occlusione coronarica X cefalea X LDP X crampi addominali diarrea e vomito X indagini diagnostiche X ematomi X immobilità 	
--	--

Dolore cronico (Continuo/ intermittente che dura da più di 6 mesi)	X
---	----------

<p>Fattori correlati</p> <p>Fisiopatologici</p> <p>Trauma tissutale e spasmi muscolari riflessi secondari a</p> <ul style="list-style-type: none"> X Disordini viscerali (cardiaci, renali, epatici, intestinali, polmonari) X Cancro X Disordini vascolari (vasospasmo, occlusione, flebite, vasodilatazione/cefalea) X Infiammazione di nervi, tendini, capsula articolare, articolazioni, muscoli, strutture articolari. X Effetti di un tumore su (specificare) X Dolori addominali, diarrea, vomito secondari a gastroenterite, ulcera gastrica, influenza. X Infiammazione e spasmi della muscolatura liscia per calcoli renali, infezioni gastrointestinali 	
--	--



Trattamenti

- X Trauma tissutale e spasmi muscolari riflessi (per intervento chirurgico, ustione, indagini diagnostiche/venipuntura/biopsia, scansiomertria invasiva)
- X Per nausea e vomito secondari a chemioterapia, anestesia, effetti collaterali (specificare)

Situazionali (personali, ambientali)

- X Febbre
- X Immobilità/posizionamento inappropriato
- X Iperattività
- X Punti di pressione (es.ingessatura o bendaggio stretti)
- X Risposta allergica
- X Ansia grave e repressa

Eliminazione urinaria compromessa

Per Incontinenza urinaria (specificare):

- X Totale (continua, senza presenza di distensione della vescica e/o ritenzione di urine)
- X Da sforzo (perdita involontaria di urine per aumento della pressione addominale)
- X Da urgenza (perdita involontaria di urine per urgenza minzionale)
- X Funzionale (per incapacità di raggiungere in tempo il gabinetto)

Fattori correlati

Fisiopatologici

- X Diminuita capacità vescicale/irritazione vescicale (per infezione, glicosuria, carcinoma, uretrite, trauma)
- X Diminuzione dei segnali vescicali o del loro riconoscimento (per infezioni/tumori/lesioni midollo spinale, neuropatia alcolica e/o diabetica, malattie demielinizzanti, ictus cerebrale, parkinsonismo, sclerosi multipla, farmaci alfa adrenergici)

Eminegligenza

Fattori correlati

Fisiopatologici

- X Alterazione delle capacità percettive secondaria ictus cerebrale, tumore cerebrale, lesione/trauma cranico, aneurisma cerebrale

Fatigue

Fattori correlati

Fisiopatologici

- X Stato ipermetabolico (per malattie virali, febbre, gravidanza)
- X Inadeguata ossigenazione tissutale (per BPCO, insufficienza cardiaca, anemia, malattia vascolare periferica)
- X Alterazioni biochimiche (per malattie endocrine e metaboliche come diabete mellito, ipotiroidismo, malattie ipofisarie, AIDS, M Addison, cirrosi epatica, insufficienza renale)
- X Debolezza muscolare (per miastenia gravis, sclerosi multipla,, SLA, M. Parkinson, AIDS)
- X Stato ipermetabolico, competizione tra organismo e neoplasia per i nutrienti, anemia fattori di stress associati a tumore
- X Deficit nutrizionali o alterazioni del metabolismo dei nutrienti (per nausea, vomito, diarrea, effetti collaterali dei farmaci, intervento chirurgico allo stomaco, diabete mellito)
- X Processo infiammatorio cronico (per AIDS, artrite, Lupus eritematoso, epatite, Cirrosi Epatica, malattia infiammatoria intestinale, insufficienza renale)



Trattamenti

- X Modificazioni biochimiche secondarie a chemioterapia, radioterapia, effetti collaterali di (specificare) danni tissutali da intervento chirurgico e anestesia,

Situazionali (personali, ambientali)

- X Diminuzione prolungata dell'attività (per ansia, febbre, diarrea, dolore, isolamento sociale, nausea/vomito, depressione, obesità)
- X Stress emotivo
- X Disturbi del sonno

Immobilizzazione, sindrome da

X

Fattori correlati

Fisiopatologici

- X Riduzione del sensorio
- X Stato di incoscienza
- X Compromissione neuromuscolare (per sclerosi multipla, paralisi parziale/totale, distrofia muscolare, sindrome di Guillain-Barrè, parkinsonismo, lesione del midollo spinale)
- X Malattia terminale (AIDS, cardiopatia, nefropatia)
- X Cancro

Trattamenti

- X Intervento chirurgico
- X Ventilazione meccanica
- X Linee venose
- X Immobilità prescritta

Situazionali (personali, ambientali)

- X Depressione
- X Fatigue
- X Stato di debilitazione
- X Dolore

Fasi di sviluppo

- X Persona anziana: ridotta agilità motoria, debolezza muscolare, demenza presenile

Incontinenza fecale

X

Fattori correlati

Fisiopatologici

- X Compromissione dello sfintere rettale (per chirurgia anale/rettale, lesioni ostetriche, neuropatia periferica)
- X Compromissione delle funzioni cognitive
- X Iperdistensione rettale per stipsi cronica
- X Mancato controllo dello sfintere volontario (per malattia neuromuscolare progressiva, compressione/lesione del midollo spinale, ictus cerebrale, sclerosi multipla)
- X Trattamenti

Incontinenza urinaria da sforzo	X
--	----------

<p>Fattori correlati</p> <p>Fisiopatologici</p> <ul style="list-style-type: none"> X Anomalie congenite delle vie urinarie <p>Situazionali (personali, ambientali)</p> <ul style="list-style-type: none"> X Elevata pressione intra-addominale e debolezza della muscolatura pelvica per obesità, attività sessuale, gravidanza, inadeguata igiene personale <p>Fasi di sviluppo</p> <ul style="list-style-type: none"> X Persona anziana: perdita di tono muscolare 	
--	--

Incontinenza urinaria da urgenza	X
---	----------

<p>Fattori correlati</p> <p>Fisiopatologici</p> <ul style="list-style-type: none"> X Diminuzione della capacità vescicale per infezione, malattie demielinizzanti, ictus cerebrale, trauma, uretrite, neuropatia diabetica, neuropatia alcolica, disturbi/lesioni neurologiche/tumori/infezioni, parkinsonismo <p>Trattamenti</p> <ul style="list-style-type: none"> X Diminuzione della capacità vescicale per intervento chirurgico addominale, X Periodo successivo a cateterismo vescicale a permanenza <p>Situazionali (personali, ambientali)</p> <ul style="list-style-type: none"> X Diminuzione della capacità vescicale secondaria a minzioni frequenti 	
--	--

Incontinenza urinaria funzionale	X
---	----------

<p>Fattori correlati</p> <p>Trattamenti</p> <ul style="list-style-type: none"> X Riduzione del tono vescicale per uso di antistaminici, terapia immunosoppressiva, adrenalina, diuretici, anticolinergici, tranquillanti, sedativi, miorilassanti <p>Situazionali (personali, ambientali)</p> <ul style="list-style-type: none"> X Compromissione della mobilità X Diminuita attenzione nei confronti degli stimoli vescicali per depressione, soppressione intenzionale, confusione mentale X Barriere ambientali per l'accesso al bagno (gabinetto distante, letto troppo alto, scarsa illuminazione, spondine laterali, ambiente non familiare) <p>Fasi di sviluppo</p> <ul style="list-style-type: none"> X Persona anziana: perdite motorie/sensitive 	
--	--

Incontinenza urinaria totale (compromessa eliminazione urinaria)	X
---	----------

<p>Fattori correlati</p> <p>Fisiopatologici</p> <ul style="list-style-type: none"> X Anomalie congenite delle vie urinarie X Diminuita capacità vescicale o irritazione vescicale per trauma, carcinoma, infezione uretrite, glicosuria X Diminuzione dei segnali vescicali o compromessa capacità di riconoscerli per infezione/tumore/lesione del midollo spinale, neuropatia diabetica/alcolica, malattie demielinizzanti, ictus cerebrale, parkinsonismo, lesione cerebrale, sclerosi multipla <p>Trattamenti</p> <ul style="list-style-type: none"> X Effetti del trattamento chirurgico sullo sfintere vescicale per prostatectomia, dissezione 	
---	--

<p>pelvica estensiva</p> <p>X Riduzione del tono muscolare per per anestesia generale o spinale, terapia farmacologica e iatrogenesi (farmaci miorilassanti, anestetici, diuretici, antistaminici, anticolinergici, immunodepressori, adrenalina, ansiolitici)</p> <p>Situazionali (personali, ambientali)</p> <p>X Compromissione della mobilità</p> <p>X Diminuita attenzione nei confronti degli stimoli vescicali per depressione, soppressione intenzionale, confusione mentale</p> <p>X Barriere ambientali per l'accesso al bagno (gabinetto distante, letto troppo alto, scarsa illuminazione, sponde laterali, ambiente non familiare)</p> <p>Fasi di sviluppo</p> <p>X Persona anziana: perdite motorie/sensitive</p>

Infezione, rischio di	X
<p>Fattori correlati</p> <p>Fisiopatologici</p> <p>X Compromissione delle difese dell'ospite per cancro, malattie respiratorie, ematologiche, periodontali, malattie epatiche, artrite, diabete mellito, malattie ereditarie, AIDS, alcolismo, immunosoppressione (secondaria a- specificare)</p> <p>X Compromissione della circolazione per linfedema, obesità, malattia vascolare periferica</p> <p>Trattamenti</p> <p>X Sede di possibile invasione di microorganismi per intervento chirurgico, intubazione, linee invasive, nutrizione parenterale totale, dialisi, nutrizione enterale</p> <p>X Compromissione delle difese dell'ospite per terapia radiante, trapianto d'organo, terapia farmacologica (specificare)</p> <p>Situazionali (personali, ambientali)</p> <p>X Compromissione delle difese dell'ospite per malattie infettive, stress, malnutrizione, prolungata degenza in ospedale, fumo, prolungata immobilità</p> <p>X Possibile sede di invasione di microorganismi per trauma accidentale/intenzionale, periodo postpartum, morso di insetto/animale/umano, lesione termica, ambiente caldo/umido/buio (apparecchio gessato, pieghe cutanee)</p> <p>X Contatto con agenti contaminanti (infezioni nosocomiali o di comunità)</p> <p>Fasi di sviluppo</p> <p>X Persona anziana: maggiore vulnerabilità per diminuzione della risposta immunitaria, condizione debilitante, malattia cronica)</p>	

Insonnia	X
<p>Fattori correlati</p> <p>Fisiopatologici</p> <p>X Compromissione del trasporto di ossigeno (per angina, disturbi circolatori/respiratori, arteriosclerosi periferica)</p> <p>X Compromissione dell'eliminazione fecale o urinaria (per diarrea, disuria, ritenzione, incontinenza, stipsi, pollacchiuria)</p> <p>X Compromissione del metabolismo (per ipertiroidismo, disturbi epatici, ulcera gastrica)</p> <p>Situazionali (personali, ambientali)</p> <p>X Eccessiva iperattività (per disturbo bipolare/ da deficit dell'attenzione, panico, uso di droghe)</p> <p>X Eccessivo dormire di giorno</p> <p>X Depressione</p> <p>X Inadeguata attività fisica durante il giorno</p>	



- X Dolore cronico
- X Risposte ansiose
- X Modifiche ambientali (specificare)
- X Paura
- X Donna adulta: variazioni ormonali (es. Perimenopausa)

Integrità cutanea/tissutale: compromissione, rischio

X

Fattori correlati

Fisiopatologici

- X Infiammazioni delle giunzioni dermo-epidermiche (per lupus eritematoso, sclerodermia, .

Integrità mucosa orale, compromissione

X

Fattori correlati

- X Inadeguata igiene orale
- X Incapacità di provvedere all'igiene orale

Ipertermia

X

Fattori correlati

Trattamenti

- X Ridotta capacità di sudorazione (specificare il farmaco)

Situazionali

- X Esposizione al calore, al sole
- X Abbigliamento inadeguato al clima
- X Diminuzione della circolazione (per persona sovrappeso/sottopeso, disidratazione)

Fasi di sviluppo

- X Inefficacia della termoregolazione secondaria all'età

Ipotermia

X

Fattori correlati

Situazionali (personali, ambientali)

- X Vestiario inadatto al clima
- X Diminuzione della circolazione (per persona sovrappeso/sottopeso, consumo di alcol, disidratazione, inattività)

Fasi di sviluppo

- X Inefficacia della termoregolazione secondaria all'età (es. neonato, anziano)



Lesione, rischio di	X
Fattori correlati	
Fisiopatologici	
X Alterazioni delle funzioni cerebrali per ipossia (vertigini, sincope)	
X Alterazioni della mobilità (ictus cerebrale, artrite, parkinsonismo, perdita di un arto, compromissione della vista/udito)	
X Fatigue	
X Ipotensione ortostatica	
X Insufficienza vertebro basilare	
X Disturbi vestibolari	
X Inadeguata consapevolezza dei rischi ambientali (confusione mentale)	
X Movimenti tonico-clonici (convulsioni)	
Trattamenti	
X Lungo allettamento	
X Effetti sulla mobilità/sensorio (sedativi, miorellassanti...specificare)	
X Gesso, stampelle, deambulatore, bastone	
Situazionali (personali, ambientali)	
X Diminuzione o perdita memoria a breve termine	
X Alterata capacità di giudizio (per stress, droghe, alcol, disidratazione, depressione)	
X Ambiente non familiare (es. Ospedale)	
X Scarpe inadatte,	
X Uso improprio degli ausili	
X Storia di incidenti	
X Andatura instabile	
Fasi di sviluppo	
X Persona anziana: alterata capacità di giudizio (per deficit cognitivi), stile di vita sedentario, perdita di forza muscolare	

Liquidi, eccessivo volume di	X
Fattori correlati	
Fisiopatologici	
X Compromissione dei meccanismi regolatori (per insufficienza renale acuta/cronica, disfunzioni endocrine, anomalie sistemiche metaboliche, lipoedema)	
X Iperensione portale, diminuzione della pressione colloidale-osmotica e ritenzione di sodio (per epatopatia, cancro, cirrosi, ascite)	
X Anomalie venose e arteriose (vene varicose, vasculopatia periferica, Trombosi, flebite, immobilità, linfoedema, infezioni, trauma, neoplasie)	
Trattamenti	
X Ritenzione di sodio e acqua (terapia corticosteroidica)	
Situazionali (personali, ambientali)	
X Eccessivo apporto di sodio/liquidi	
X Inadeguato apporto proteico (dieta squilibrata, malnutrizione)	
X Ristagno venoso declive/venostasi (per immobilità, prolungata stazione eretta/posizione seduta, gesso/fasciatura stretta)	
Fasi di sviluppo	
X Persona anziana: compromissione del ritorno venoso per aumento delle resistenze periferiche e diminuzione dell'efficienza valvolare	



Liquidi, insufficiente volume di	X
<p>Fattori correlati</p> <p>Fisiopatologici</p> <ul style="list-style-type: none"> X Eccessiva emissione di urine (per diabete mellito insipido, diabete mellito scompensato) X Aumento della permeabilità capillare e evaporazione da ustioni X Perdite (febbre, aumento del metabolismo, drenaggio accentuato, ferite, peritonite, diarrea, menorragia) <p>Situazionali (personali, ambientali)</p> <ul style="list-style-type: none"> X Vomito/nausea X Diminuita motivazione a bere (depressione, fatigue) X Dieta scorretta/digiuno X Nutrizione per sonda con soluzione concentrata X Difficoltà a deglutire/assumere alimenti (dolore orale, fatigue) X Esposizione a climi estremi X Perdita eccessiva (cateteri a permanenza, drenaggi) X Liquidi insufficienti in rapporto all'esercizio fisico/condizioni climatiche X Uso eccessivo di lassativi o clisteri, diuretici, alcol, caffeina <p>Fasi di sviluppo</p> <ul style="list-style-type: none"> X Persona anziana: aumentata vulnerabilità a ridotta riserva idrica, ridotta sensazione di sete 	

Memoria, compromissione	X
<p>Fattori correlati</p> <p>Fisiopatologici</p> <ul style="list-style-type: none"> X Alterazioni del SNC (per malattia cerebrale degenerativa, ictus cerebrale, lesione/trauma cranico) X Riduzione della quantità/qualità delle informazioni elaborate (per deficit visivi/uditivi, livello di istruzione, ridotte capacità intellettive, abitudini di apprendimento, benessere fisico insufficiente, affaticamento) X Deficienze nutrizionali <p>Trattamenti</p> <ul style="list-style-type: none"> X Effetti dei farmaci sulla memorizzazione delle informazioni <p>Situazionali (personali, ambientali)</p> <ul style="list-style-type: none"> X Consumo di alcol X Mancanza di motivazione X Inadeguata stimolazione X Difficoltà di concentrazione (per stress, disturbi del sonno, dolore, inadeguata stimolazione intellettiva, distrazioni) 	

Mobilità, compromissione /rischio di	X
<p>Fattori correlati</p> <p>Fisiopatologici</p> <ul style="list-style-type: none"> X riduzione della forza e della resistenza per compromissione neuromuscolare (malattie autoimmunitarie, del sistema nervoso, respiratorie, distrofia muscolare, paralisi parziale, tumore del SNC, tumore, trauma, ipertensione endocranica, deficit sensoriale) X riduzione della forza e della resistenza per compromissione muscoloscheletrica (fratture, malattie del tessuto connettivo, condizioni cardiache) X rigidità delle articolazioni o contratture (per malattia infiammatoria, interventi endoprotesi ortopedica articolare, malattia degenerativa delle articolazioni e del disco) X edemi 	

<ul style="list-style-type: none"> X apparecchi esterni (gesso/splint, corsetto ortopedico, catetere venoso) X forza/resistenza insufficienti per la deambulazione (protesi, stampelle, deambulatore) <p>Situazionali (personali, ambientali)</p> <ul style="list-style-type: none"> X fatigue X obesità X mancanza di motivazione X dispnea X dolore <p>Fasi di sviluppo</p> <ul style="list-style-type: none"> X Persona anziana: diminuzione dell'agilità e debolezza muscolare
--

Nausea	X
<p>Fattori correlati</p> <p>Fisiopatologici</p> <ul style="list-style-type: none"> X Trauma tissutale e spasmi muscolari riflessi (per gastroenterite acuta, ulcera gastrica, sindrome colon irritabile, pancreatite, infezioni, tossoinfezioni alimentari, intossicazioni da farmaci, calcolosi renale, crampi uterini, malessere da movimento, stress) (specificare) <p>Trattamenti</p> <ul style="list-style-type: none"> X Effetti della chemioterapia e/o farmaci X Effetti dell'anestesia 	

Non adesione (a indicazioni terapeutiche)	X
<p>Definizione: Stato nel quale la persona o il gruppo vorrebbe aderire a suggerimenti riguardanti la salute forniti da operatori sanitari e sui quali vi è accordo, ma ne è impedito da fattori che lo scoraggiano.</p>	
<p>Fattori correlati</p> <ul style="list-style-type: none"> X Compromessa a capacità di svolgimento di determinati compiti per disabilità secondaria a X Scarsa memoria, deficit sensitivi. X Aumento dei sintomi correlati alla malattia malgrado la precedente adesione X Effetti collaterali della terapia X Pregresse esperienze di inefficacia del regime terapeutico consigliato X Terapia complessa non controllata o prolungata X Costo della terapia in termini finanziari 	

Nutrizione inferiore al fabbisogno, rischio di	X
<p>Fattori correlati</p> <p>Fisiopatologici</p> <ul style="list-style-type: none"> X Aumentato fabbisogno calorico e difficoltà ad assumere sufficienti calorie (per ustione, trauma, complicanze/deformazioni gastrointestinali, cancro, alcolismo, uso di sostanze stupefacenti, infezione, AIDS) X Disfagia (per ictus cerebrale, M.di Parkinson, palatoschisi, distrofia muscolare, paralisi cerebrale, paralisi facciale, SLA, disturbi neuromuscolari) X Diminuito assorbimento di nutrienti (per M.di Crohn, enterocolite necrotizzante, intolleranza al lattosio, fibrosi cistica) X Diminuzione dell'appetito (per alterazioni dello stato di coscienza) X Vomito autoindotto, esercizio fisico eccessivo in rapporto alle calorie assunte, anoressia X Rifiuto ad alimentarsi (timore di essere avvelenato/ comportamento paranoico) 	



- X Inappetenza/agitazione fisica (per disturbo bipolare)
- X Inappetenza e diarrea (per infezione da protozoi)
- X Vomito, inappetenza e alterazioni della digestione (per pancreatite)
- X Inappetenza e compromissione del metabolismo proteico/lipidico, ipovitaminosi (per cirrosi epatica)
- X Inappetenza, vomito e alterazione della digestione (per malformazioni del tratto gastrointestinale /enterocolite necrotizzante)
- X Inappetenza per reflusso gastroesofageo

Trattamenti

- X Aumentato fabbisogno proteico/vitaminico per la cicatrizzazione di ferite e diminuita assunzione (per intervento chirurgico, farmaci, blocco mandibolare, radioterapia)
- X Inadeguato assorbimento come effetto collaterale di farmaci (specificare)
- X Diminuita assunzione orale, dolore in sede orale, nausea, vomito (per radioterapia, chemioterapia, tonsillectomia)

Situazionali (personali, ambientali)

- X Diminuzione dell'appetito (per nausea, vomito, isolamento sociale, stress, depressione, allergie)
- X Incapacità di procurarsi gli alimenti (per limitazioni fisiche, problemi finanziari/ di trasporto)
- X Incapacità di masticare (per adentulia, carie, protesi non adatta)
- X Diarrea

Fasi di sviluppo

- X Malassorbimento, restrizioni dietetiche, inappetenza (per morbo celiaco, fibrosi cistica, intolleranza la lattosio, malformazioni gastrointestinali, reflusso gastroesofageo, enterocolite necrotizzante)

Nutrizione superiore al fabbisogno

X

Fattori correlati

Fisiopatologici

- X Alterato modello di sazietà (specificare)
- X Riduzione dei sensi di gusto/olfatto

Trattamenti

- X Alterazione del senso di sazietà (per farmaci, radiazioni)

Situazionali (personali, ambientali)

- X Deficit di conoscenze delle basi nutrizionali

Fasi di sviluppo

- X Adulto/persona anziana: diminuzione del modello di attività /di fabbisogno metabolico

Respirazione, inefficace funzionalità, rischio

X

Fattori correlati

Fisiopatologici

- X Secrezioni eccessive o dense (per infezione, infiammazione, allergia, patologie cardiopolmonari, fumo)
- X Immobilità stasi delle secrezioni, tosse inefficace (per malattie del SN, depressione del SNC/trauma cranico, ictus cerebrale, tetraplegia)

Trattamenti

- X Immobilità (per effetto sedativo di farmaci, droghe o sostanze chimiche, anestesia)
- X Soppressione del riflesso della tosse
- X Effetti della tracheostomia (alterazione delle secrezioni)



Stipsi

X

Fattori correlati

Fisiopatologici

- X Innervazione difettosa, debolezza della muscolatura pelvica immobilità (per lesioni/traumi del midollo spinale, spina bifida, ictus cerebrale, malattia neurologica, demenza)
- X Riduzione del metabolismo (per ipotiroidismo, iper paratiroidismo, obesità, feocromocitoma, uremia, neuropatia diabetica, ipo pituitarismo)
- X Diminuita risposta al bisogno di defecare (disturbi dell'umore)
- X Dolore alla defecazione (per emorroidi, lesione dorsale)
- X Diminuita peristalsi secondaria a ipossia cardiaca/polmonare
- X Disturbi della mobilità secondari a sindrome da intestino irritabile
- X Incapacità di rilassare lo sfintere anale e elevata pressione a riposo nel canale anale (parti vaginali multipli, sforzo cronico)

Trattamenti

- X Effetti collaterali di farmaci (specificare)
- X Effetti sulla peristalsi dell'anaestesia e della manipolazione chirurgica
- X Uso abituale di lassativi
- X Mucosite secondaria a radiazioni

Situazionali (personali, ambientali)

- X Diminuzione della peristalsi (per immobilità, gravidanza, stress, mancanza di esercizio fisico)
- X Modello di evacuazione irregolare
- X Credenze culturali/sulla salute
- X Mancanza di riservatezza
- X Dieta priva di scorie, assunzione di liquidi inadeguata
- X Paura di dolore rettale o cardiaco
- X Valutazioni errate
- X Incapacità di percepire i segnali intestinali

Allegato 3
PROBLEMI COLLABORATIVI PRELEVALEMENTEMENTE TRATTATI

 Selezionare (X) le caselle relative ai problemi collaborativi di interesse
 (riferimenti bibliografici: L.J.Carpenito-Diagnosi infermieristiche - 5th. ed. C.E.A. Edizioni, 2010)

Rischio di complicanze (RC) per disfunzione cardiaca/ vascolare	
RC per emorragia	X
RC per riduzione della gittata cardiaca	X
RC per aritmie	X
RC per edema polmonare	X
RC per ipovolemia	X
Rischio di complicanze (RC) per disfunzione respiratoria	
RC per ipossiemia	X
RC per atelectasia/polmonite	X
RC per pneumotorace	X
Rischio di complicanze (RC) per disfunzione metabolica/immunitaria/ematopoietica	
RC per ipo/iperglicemia	X
RC per squilibri elettrolitici	X
RC per sepsi	X
RC per acidosi (metabolica, respiratoria)	X
RC per alcalosi (metabolica, respiratoria)	X
RC per reazione allergica	X
Rc per trombocitopenia	X
RC per infezioni opportunistiche	X
Rischio di complicanze (RC) per disfunzione renale / urinaria	
RC per ritenzione urinaria acuta	X
RC per insufficienza renale	X
Rischio di complicanze (RC) per disfunzione neurologica / sensoriale	
RC per crisi convulsiva	X
RC per astinenza da alcol	X
Rischio di complicanze (RC) per disfunzione gastrointestinale / epatica / biliare	
RC per ileo paralitico	X
RC per sanguinamento gastrointestinale	X
RC per disfunzione epatica	X
RC per iperbilirubinemia	X
Rischio di complicanze (RC) per effetti avversi (EA) della terapia farmacologica	
RC per effetti avversi della terapia con farmaci anticoagulanti	X
RC per effetti avversi della terapia con farmaci ansiolitici	X
RC per effetti avversi della terapia con farmaci antidepressivi	X
RC per effetti avversi della terapia con farmaci antiaritmici	X

RC per effetti avversi della terapia con farmaci antipsicotici	X
RC per effetti avversi della terapia con farmaci antipertensivi	X
RC per effetti avversi della terapia con farmaci betabloccanti	X
RC per effetti avversi della terapia con farmaci calcioantagonisti	X
RC per effetti avversi della terapia con farmaci inibitori dell'enzima di conversione dell'angiotensina	X
RC per effetti avversi della terapia con farmaci inibitori dei recettori dell'angiotensina	X
RC per effetti avversi della terapia con farmaci diuretici	X
RC per effetti avversi della terapia con farmaci antiaggreganti	X

Allegato 4

APPRENDIMENTO OFFERTO

In relazione alle diagnosi infermieristiche / problemi collaborativi sopra indicati, descrivere le opportunità formative per lo studente che caratterizzano la sede di apprendimento.

Esempio: interventi assistenziali infermieristici, modelli organizzativi e/o di presa in carico assistenziale, attività di ricerca e innovazione.

MODELLO ORGANIZZATIVO ADOTTATO:

- Nursing modulare. L'infermiere, nel proprio turno di lavoro, è responsabile dell'assistenza erogata alle persone a lui affidate.

PROGETTO DI PREVENZIONE SECONDARIA su persone colpite da Infarto di età < 75 anni.

- Partendo dai fattori di rischio individuali le persone interessate vengono arruolate al progetto "prevenzione e qualità di vita nella malattia coronarica". Gli obiettivi sono quelli di condurre le persone a stili di vita corretti, ridurre i rientri per stessa patologia e ridurre la mortalità. Dopo l'arruolamento, che avviene in UTIC, sono previsti tre incontri: di gruppo, a distanza di un mese dalla dimissione; follow-up a 6 mesi e a 12 mesi, individuali. Inoltre agli stessi, viene proposta la partecipazione a gruppi di cammino la cui tecnica adottata è quella del fitwalking. Le figure professionali coinvolte in questo progetto, oltre agli infermieri, sono i cardiologi, gli psicologi e le dietiste.

ATTIVITÀ DI IMPIANTISTICA:

- Nella camera operatoria dell'UTIC vengono impiantati PACE-MAKER DEFINITIVI mono, bicamerale e biventricolare (CRT) 1° impianto e sostituzioni.
- LOOP RECORDER (per la monitoraggio prolungata dell'attività elettrica, fino a tre anni)
- DEFIBRILLATORI CARDIOVERTER IMPIANTABILI (ICD) 1° impianto e sostituzioni
- PACE MAKER TEMPORANEI in emergenza/urgenza

ALTRE ATTIVITÀ DI C.O.

- PERICARDIOCENTESI
- CARDIOVERSIONI
- TEST ALLA FLECAINIDE per la slatentizzazione della Sindrome di BRUGADA