

OFFERTA FORMATIVA DELLA SEDE DI TIROCINIO

Contesto	
<p>Tutor clinico Area Torino Sud/Ovest Contatti e riferimenti</p>	<p>Nome ANTONIO GASPARE Cognome LOMAGISTRO Telefono 3484412177 e-mail antoniogaspare.lomagistro@unito.it</p>
<p>Struttura/servizio Nominativo, ubicazione, ecc</p> <p>Orari apertura al pubblico, Orari di lavoro,</p> <p>Figure professionali</p> <p>Risorse strumentali Servizi agli studenti (mensa, biblioteca, accesso internet, ecc)</p> <p>Contatti e riferimenti</p> <p>Come raggiungere il servizio</p> <p>Mappa percorso Mezzi pubblici</p>	<p>CURE DOMICILIARI AREA TORINO SUD/OVEST Via Gorizia, 114 Torino</p> <p>Lunedì/ venerdì 8,00/15.30 Lun/ven. Matt. 7,30-9,00–15,30-16,30. Pom. 12,30-20,00 Week end + festivi 7,30-15,00</p> <p>Medico, infermieri, personale amministrativo</p> <p>Computer e accesso internet, auto di servizio, saletta per incontro studenti, area ristoro</p> <p>Protocolli e procedure aziendali.</p> <p>Telefono 01170953559 Fax 01170953134 e-mail adi.gorizia@ascittaditorino.it</p> <p>NUMERI BUS VICINANZE: 58-58/-17-17/-5-5/-2</p>

Allegato 1
Problemi di salute / Problemi clinici / Percorso diagnostico terapeutici prevalentemente trattati
 Selezionare (X) i problemi di salute prevalenti e indicare le patologie più frequenti

Malattie Cardiovascolari	X
ARITMIE, CORONAROPATIE, SCOMPENSO CARDIACO, VALVULOPATIA, ARTERIOPATIA OSTRUTTIVA, PERICARDITE, IPERTENSIONE.	
Malattie Cerebrovascolari	X
ICTUS, TIA, DEMENZA VASCOLARE.	
Malattie Endocrinologiche, metaboliche	X
DIABETE MELLITO TIPO I E II, SINDROME DI CUSHING, INSUFFICIENZA CORTICOSURRENALICA, IPO E IPERTIROIDISMO.	
Malattie Intestinali / digestive	X
CIRROSI EPATICA, MALATTIE INFIAMMATORIE CRONICHE INTESTINALI.	
Malattie Infettive	X
CLOSTRIDIUM, ERISPELA, ESCHERICCHIA COLI, URINARIA, KLEBSIELLA, LEGIONELLA, ENTEROCOCCO, ENDOCARDITE BATTERICA, EPATITE A E B, AIDS.	
Malattie Nefrologiche, genito/urinarie	X
INSUFFICIENZA RENALE IN EMODIALISI E NON, NEFROPATIA, GLOMERULONEFRITI.	

Malattie Neuromuscolari	X
SCLEROSI MULTIPLA, MORBO DI ALZHEIMER, MORBO DI PARKINSON, EPILESSIA, EMIPLEGIA, PARAPLEGIA, TETRAPLEGIA, MIOPATIA, DISTROFIA DI DUCHENNE.	
Malattie Oncologiche	X
TUMORI DELLA MAMMELLA, COLON, STOMACO, RENI. OSTEOSARCOMI, MELANOMI, TUMORI DELLA VESCICA, PROSTATA, POLMONE, FEGATO, LEUCEMIA.	
Malattie Osteoarticolari	X
AMPUTAZIONE DELLE MANI, AMPUTAZIONE COSCIA O GAMBA, REUMATISMI ARTICOLARI, ARTROSI.	
Malattie Rare	X
FIBROSI CISTICA	
Malattie Respiratorie	X
BPCO, POLMONITI, INTERSTIZIOPATIA, INSUFFICIENZA RESPIRATORIA, TUBERCOLOSI.	
Malattie Traumatologiche / incidenti	X
TRAUMI OSTEOARTICOLARI CONSEGUENTI AD INCIDENTI, CON O SENZA FISSATORI ESTERNI, LESIONI TRAUMATICHE CUTANEE (FERITE, USTIONI, ABRASIONI, INNESTI).	
Salute in area Materno / infantile	X
FIBROSI CISTICA, MALATTIE METABOLICHE, TUMORI, EPILESSIA, MALATTIE NEURODEGENERATIVE CONGENITE O ACQUISITE.	
Salute Mentale	X
SCHIZOFRENIA, DISTURBI DEL COMPORTAMENTO, DEPRESSIONE, PSICOSI.	

Allegato 2

Diagnosi Infermieristiche prevalentemente trattate

Selezionare (X) le caselle relative alle Diagnosi Infermieristiche e ai fattori correlati di interesse (riferimenti bibliografici: L.J.Carpentito-Diagnosi infermieristiche – 5th. ed. C.E.A. Edizioni, 2010)

Ansia	X
Fattori correlati	
Fisiopatologici	
<input type="checkbox"/> X Qualsiasi fattore che interferisca con i bisogni relativi ad alimentazione, respirazione, comfort, sicurezza	
Situazionali (personali, ambientali)	
<input type="checkbox"/> X Minaccia reale o percepita al concetto di sé (fallimento, modificazione dello status, mancato riconoscimento da parte degli altri...)	
<input type="checkbox"/> X Perdita reale o percepita di persone significative	
<input type="checkbox"/> X Minaccia reale o percepita all'integrità biologica (per malattia, violenza, procedure invasive, stato terminale)	
<input type="checkbox"/> X Cambiamento ambientale reale o percepito (trasloco, ospedalizzazione, pensionamento, condizione di rifugiato, reclusione, calamità naturali, rischi per la sicurezza...)	
Fasi di sviluppo	
<input type="checkbox"/> X Persona anziana: minaccia al concetto di sé secondaria a perdite sensoriali, motorie, problemi finanziari, cambiamenti legati al pensionamento	

Aspirazione, rischio di	X
Fattori correlati	
Fisiopatologici	
<input type="checkbox"/> X Riduzione del livello di coscienza (per demenza pre-senile, trauma cranico, ictus cerebrale, M.di Parkinson, induzione da alcol/sostanze, coma, convulsioni, anestesia)	
<input type="checkbox"/> X Depressione dei riflessi della tosse/faringeo	
<input type="checkbox"/> Ritardato svuotamento gastrico (per ostruzione intestinale, sindrome da reflusso, ileo)	
<input type="checkbox"/> Aumento della pressione gastrica (per posizione ginecologica, ascite, obesità, dilatazione uterina)	
<input type="checkbox"/> X Compromissione della deglutizione o diminuzione dei riflessi laringeo/glottico (per acalasia, condizioni debilitanti, miastenia grave, catatonìa, Mdi Parkinson, stenosi esofagea, ictus cerebrale, sclerosi multipla, sclerodermia, distrofia muscolare, sindrome di Guillain Barrè)	
Trattamenti	
<input type="checkbox"/> X Depressione dei riflessi laringeo/glottico (per tracheostomia/trachetomia, sedazione, nutriz. enterale)	
Fasi di sviluppo	
<input type="checkbox"/> X Persona anziana: dentizione inadeguata	

Attività, intolleranza all'attività	X
Fattori correlati	
Fisiopatologici	
Compromissione del sistema di apporto di ossigeno per	
<input type="checkbox"/> X Sistema cardiaco (insufficienza cardiaca, valvolare, aritmie, infarto del miocardio, cardiopatia)	



<p>congenita, angina)</p> <p><input type="checkbox"/> X Sistema respiratorio (bronco pneumopatia cronica ostruttiva, atelectasia, dispnea broncopolmonare)</p> <p><input type="checkbox"/> X Sistema circolatorio (anemia, ipovolemia, arteriopatia periferica)</p> <p>Aumento del fabbisogno metabolico per</p> <p><input type="checkbox"/> X Infezioni acute o croniche (virali, epatite, mononucleosi, disordini endocrini/ metabolici)</p> <p><input type="checkbox"/> X Malattie croniche (renali, infiammatorie, neurologiche, epatiche, muscolo scheletriche)</p> <p><input type="checkbox"/> X Inadeguatezza delle fonti energetiche (per obesità, dieta inadeguata, malnutrizione)</p> <p>Trattamenti</p> <p><input type="checkbox"/> X Aumento del fabbisogno metabolico (per tumore maligno, intervento chirurgico, indagini diagnostiche, orario e frequenza trattamenti)</p> <p><input type="checkbox"/> X Compromissione del trasporto dell'ossigeno (per ipovolemia, prolungato riposo a letto)</p> <p>Situazionali (personali, ambientali)</p> <p><input type="checkbox"/> X Inattività (secondaria a depressione, mancanza di motivazione, stile di vita sedentario, insufficiente conoscenza)</p> <p><input type="checkbox"/> X Aumento del fabbisogno metabolico (per utilizzo di ausili come deambulatore /stampelle /tutori, stress, dolore, barriere ambientali come ad es. scale, estremi climatici, inquinamento dell'aria)</p> <p><input type="checkbox"/> X Inadeguata motivazione (secondaria ad utilizzo di ausili, paura di cadere, depressione, obesità, dolore, dispnea)</p> <p>Fasi di sviluppo</p> <p><input type="checkbox"/> X Processo di invecchiamento con diminuzione della forza e del trofismo muscolare, comparsa di deficit sensoriali</p>

Cadute, rischio	X
Vedere lesione, rischio	

Caregiver, tensione nel ruolo di /Rischio di	X
<p>Fattori correlati</p> <p>Fisiopatologici</p> <p><input type="checkbox"/> X Esigenza di assistenza continua/ complessa (per condizioni debilitanti acute/progressive, tossicodipendenza, malattia dal decorso imprevedibile, demenza progressiva, malattia mentale cronica, disabilità)</p> <p>Trattamenti</p> <p><input type="checkbox"/> X Responsabilità assistenziali legate per tutto l'arco delle 24 ore o assistenza che richiede tempo (dialisi, trasporto)</p> <p>Situazionali (personali, ambientali)</p> <p><input type="checkbox"/> X Aspettative non realistiche dell'assistito nei confronti del caregiver</p> <p><input type="checkbox"/> X Modello di coping inefficace</p> <p><input type="checkbox"/> X Salute fisica compromessa</p> <p><input type="checkbox"/> X Relazioni inadeguate o disfunzioni familiari</p> <p><input type="checkbox"/> X Durata dell'assistenza richiesta</p> <p><input type="checkbox"/> X Isolamento</p> <p><input type="checkbox"/> X Pause di riposo/svago insufficienti o</p> <p><input type="checkbox"/> X Risorse economiche insufficienti</p> <p><input type="checkbox"/> X Assenza o non disponibilità di sostegno</p> <p>Fasi di sviluppo</p> <p><input type="checkbox"/> X Esigenza di assistenza continua secondaria a disabilità mentali (specificare) o disabilità fisiche (specificare)</p>	



Casa, compromessa gestione	X
<p>Fattori correlati</p> <p>Fisiopatologici</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> X Compromissione delle capacità funzionali secondarie a malattia cronica debilitante (diabete mellito, sclerosi multipla, ictus cerebrale, cancro, artrite, insufficienza cardiaca, m. Parkinson, BPCO, distrofia muscolare) <p>Situazionali (personali, ambientali)</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> x Modificazioni delle capacità funzionali di un membro della famiglia (specificare) per lesione (es. frattura di un arto/lesione del midollo spinale), intervento chirurgico, alterazione dello stato mentale (vuoti di memoria, depressione, ansia-panico grave), abuso di sostanze. <input type="checkbox"/> X Mancata disponibilità di un sistema di sostegno <input type="checkbox"/> x Perdita di un familiare <input type="checkbox"/> x Deficit di conoscenze <input type="checkbox"/> x Insufficienza di risorse economiche <p>Fasi di sviluppo</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> x Bambino (correlata all'esigenza di cure molteplici) <input type="checkbox"/> x Persona anziana (correlata all'esigenza di cure molteplici per un familiare che presenta deficit cognitivi, motori, sensoriali) 	
Comunicazione, compromissione e Comunicazione verbale, compromissione (incapacità a pronunciare le parole ma è in grado di comprendere)	X X
<p>Fattori correlati</p> <p>Fisiopatologici</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> x Pensieri disordinati e non realistici secondari a schizofrenia, delirio, psicosi, paranoia <input type="checkbox"/> x Alterazione della funzionalità motoria dei muscoli del linguaggio <input type="checkbox"/> x Ischemia del lobo frontale temporale (per ictus cerebrale, trauma orale o facciale, danno cerebrale congenito, trauma cranico, depressione del SNC, ipertensione endocranica, tumore della testa/collo/midollo spinale, ipossia cronica, riduzione della circolazione cerebrale. <input type="checkbox"/> X Patologia del sistema nervoso (es miastenia grave, distrofia muscolare, malattia di Alzheimer) <input type="checkbox"/> x Paralisi delle corde vocali, tetraplegia <input type="checkbox"/> x Compromissione della capacità di produrre il linguaggio (per compromissione respiratoria, dispnea, edema, infezione della laringe, deformità del cavo orale, labio/palatoschisi, mal occlusione o frattura mascellare, adentulia, disartria) <p>Trattamenti</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> x Compromissione della capacità di produrre il linguaggio (per intubazione endotracheale, tracheotomia, tracheostomia, laringectomia, intervento chirurgico cranico, al viso, al collo, alla bocca, dolore alla bocca o faringeo, depressione cognitiva da farmaci deprimenti il SNC/anestetici) <p>Situazionali (personali, ambientali)</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> x Diminuita attenzione (per affaticamento collera, ansia, o dolore) <input type="checkbox"/> x Mandata disponibilità di apparecchio acustico o suo malfunzionamento <input type="checkbox"/> x Barriere psicologiche (paura, timidezza) <input type="checkbox"/> x Mancanza di riservatezza <input type="checkbox"/> x Barriera linguistica (non disponibilità di interprete) <p>Fasi di sviluppo</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> x Bambino (inadeguata stimolazione sensoriale) <input type="checkbox"/> x Persona anziana (perdite uditive) <input type="checkbox"/> x Compromissione cognitiva per (specificare patologia) 	



Concetto di se, disturbo del	X
<p>Fattori correlati</p> <p>Fisiopatologici</p> <p><input type="checkbox"/> x Variazioni dell'aspetto, dello stile di vita, di un ruolo o delle risposte altrui (per malattia cronica, dolore, trauma grave, perdita parti del corpo / funzioni organiche)</p> <p>Situazionali (personali, ambientali)</p> <p><input type="checkbox"/> x Senso di abbandono/fallimento secondario a perdita del lavoro/della capacità di lavorare, divorzio, separazione o perdita di persona significativa</p> <p><input type="checkbox"/> x Immobilità o perdita di funzioni</p> <p><input type="checkbox"/> x Rapporti insoddisfacenti parentali /coniugali</p> <p>Fasi di sviluppo</p> <p><input type="checkbox"/> x Età di mezzo (perdita di ruoli/responsabilità)</p> <p><input type="checkbox"/> x Persona anziana (perdita di ruoli/responsabilità)</p>	

Confusione mentale acuta	X
<p>Fattori correlati</p> <p>Fattori di rischio</p> <p>Improvvisa insorgenza di ipossia cerebrale o disturbi del metabolismo cerebrale per</p> <p><input type="checkbox"/> x Squilibri idroelettrolitici (disidratazione, ipovolemia, acidosi/alcalosi, iper/ipo calcemia, ipopotassiemia, ipo/iper natremia, ipo/iper glicemia)</p> <p><input type="checkbox"/> x Deficit nutrizionali (folati, vitamina B12, anemia, deficit niacina, deficit magnesio)</p> <p><input type="checkbox"/> x Disturbi cardiovascolari (infarto miocardio, insufficienza cardiaca congestizia, aritmie, blocco cardiaco, arterite temporale) ematoma subdurale)</p> <p><input type="checkbox"/> x Disordini respiratori (BPCO, embolia polmonare, TBC, polmonite)</p> <p><input type="checkbox"/> x Infezioni (sepsi, meningite, encefalite, infezione delle vie urinarie nell'anziano)</p> <p><input type="checkbox"/> x Disordini metabolici ed endocrini (iper/ipo tiroidismo, disfunzione ipofisaria, disturbi paratiroidei, del corticosurrene, ipotensione posturale, insufficienza epatica o renale)</p> <p><input type="checkbox"/> x Disordini del SNC (ictus cerebrale, idrocefalo normoteso, infarti multipli cerebrale, tumore, trauma cranico, crisi convulsive e stati post convulsivi)</p> <p>Trattamenti</p> <p><input type="checkbox"/> x Disturbo del metabolismo cerebrale per intervento chirurgico, intossicazione da farmaci, anestesia generale, astinenza da alcol, sedativi/ipnotici, metalli pesanti, monossido di carbonio, effetti collaterali dei farmaci (neurolettici/narcotici, anestesia generale, effetti collaterali da farmaci come diuretici, digitale, propanololo, atropina, ipoglicemizzanti, barbiturici, litio, fenintoina, acyclovir, anticolinergici, ecc)</p> <p>Situazionali (personali, ambientali)</p> <p><input type="checkbox"/> x Disturbo del metabolismo cerebrale per astinebza da alcool, sedativi, ipnotici, intossicazione da metalli pesanti o da monossido di carbonio.</p> <p><input type="checkbox"/> X Dolore, fecaloma, immobilità,</p> <p><input type="checkbox"/> x Depressione, situazioni non familiari</p> <p><input type="checkbox"/> x Intossicazioni chimiche o da farmaci (cocaina, eroina, metanfetamine, metadone, altri stupefacenti...)</p>	

Contaminazione, rischio di (della persona, della comunità, della famiglia)	X
<p>Fattori correlati</p> <p>Fisiopatologici</p> <p><input type="checkbox"/> x Presenza di batteri, virus, tossine</p>	



- x Fattori nutrizionali (obesità, deficienze di vitamine e sali minerali)
- x Stati patologici pre-esistenti

Trattamenti

- x Insufficiente o nessun uso di del protocollo di decontaminazione
- x Indumenti protettivi inappropriati o non utilizzati

Situazionali (personali, ambientali)

- x Fattori sociali: sovraffollamento carenza servizi igienici, povertà, inadeguate pratiche di igiene personale o della casa, mancato accesso all'assistenza sanitaria
- x Fattori biologici: presenza di vettori (zanzare, zecche, roditori)
- x Pratiche dietetiche
- x Contaminazione accidentale o intenzionale di riserve alimentari o idriche
- Esposizioni concomitanti a metalli pesanti, sostanze chimiche, inquinanti atmosferici, radiazioni

Fasi di sviluppo

- x Bambini di età inferiore a 5 anni
- x Persone anziane

Coping inadeguato della famiglia

X

Fattori correlati

Biofisiopatologici

- x Compromissione della capacità di esercitare la responsabilità di ruolo per malattia acuta/cronica

Situazionali (personali, ambientali)

- x Compromissione della capacità di gestire in modo costruttivo gli agenti stressanti (per dipendenza da sostanze, scarsa autostima, alcolismo, storia di relazioni inefficaci con i propri genitori, modelli di ruolo negativi, storia di relazioni abusive)
- x Aspettative non realistiche dei genitori nei confronti di se stessi/dei figli
- x Aspettative non realistiche dei figli nei confronti di se stessi/dei genitori
- x Bisogni psicosociali non soddisfatti dai genitori / dai figli

Coping inefficace

X

Fattori correlati

Fisiopatologici

- x Cronicità della condizione, variazioni biochimiche dell'encefalo (disordine della personalità, disordine bipolare, schizofrenia, disordine da scarsa attenzione)
- x Complessità del regime di autocura, variazioni neurologiche nell'encefalo (Morbo di Alzheimer, infarto cerebrale, sclerosi multipla, malattie in stadio terminale)
- x Alterazione dell'integrità corporea (perdita di una parte del corpo, deturpazione)
- x Alterazione dello stato d'animo (per reazioni organiche, tumore cerebrale, assunzione di sostanze, reazioni organiche, ritardo mentale)

Trattamenti

- x Separazione dalla famiglia e dalla casa (ospedalizzazione, ricovero in struttura sanitaria residenziale, ecc)

Situazionali (personali, ambientali)

- x Scarso controllo degli impulsi e bassa tolleranza alla frustrazione
- x Criticità delle relazioni con genitori/caregiver
- x Disorganizzazione del sistema familiare
- x Inefficace capacità di problem solving
- x Aumento del consumo di cibo per reazione allo stress



- x Modificazione dell'ambiente (per guerre, mancanza di alloggio, lavoro precario, , trasloco, povertà, disastro naturale)
- x Rottura legami affettivi (morte, separazione, diserzione, carcere, istituzionalizzazione, adozione/affidamento)
- x Sostegno insoddisfacente, sovraccarico sensoriale (ambiente di fabbrica, urbanizzazione, affollamento, inquinamento acustico, attività eccessiva)
- x Inadeguate risorse psicologiche (per scarsa autostima, considerazione di se negativa, senso di impotenza, mancanza di motivazione per reagire, modelli di ruolo negativi)

Fasi di sviluppo

- x Bambino/adolescente: inadeguato controllo degli impulsi, panico, rifiuto da parte dei coetanei, abuso di sostanze da parte dei genitori, metodi disciplinari incoerenti, trauma infantile, rifiuto dei genitori, paura di insuccessi)
- x Adolescente: modificazioni fisiche ed emozionali, relazioni sessuali, consapevolezza sessuale, scelte di carriera, indipendenza dalla famiglia, impegni scolastici.
- X Adulto giovane età: scelte di carriera, condizione di genitore, matrimonio, abbandono della casa dei genitori, esigenze formative.
- X Adulto mezza età: segni fisici di invecchiamento, bisogni relativi alla condizione sociale, problemi con i familiari, della cura dei figli, pressioni legate alla carriera, genitori anziani.
- X Persona anziana: inadeguatezza delle risorse psicologiche per modificazioni fisiche, reazioni degli altri verso l'anziano, pensionamento, cambiamento di residenza, di condizioni economiche

Cura di sé, deficit (alimentazione)

Incapacità di (specificare):

- x tagliare gli alimenti e/o aprire le confezioni
- x portare il cibo alla bocca

X

Fattori correlati

Fisiopatologici

- x Mancanza di coordinazione motoria per (specificare)
- x Spasticità o flaccidità per (specificare)
- x Debolezza muscolare per (specificare)
- x Paralisi per (specificare)
- x Atrofia per (specificare)
- x Contratture muscolari per (specificare)
- x Stato comatoso
- x Disturbi visivi
- x Arti non funzionanti o mancanti
- x Regressione a un precedente stadio di sviluppo
- x Comportamenti ritualistici
- x Deficit somatici

Trattamenti

- x Uso di dispositivi esterni (apparecchio gessato, tutori ortopedici, infusione endovenosa...)
- x Affaticamento e dolore post operatori

Situazionali (personali, ambientali)

- x Deficit cognitivi
- x Dolore
- x Scarsa motivazione
- x Affaticamento
- x Confusione mentale



- x Ansia che paralizza
- Fasi di sviluppo**
- x Diminuita capacità motoria e visiva o a debolezza muscolare

Cura di sé, deficit (bagno/igiene personale)

Ridotta e/o incapacità di (specificare):

- x lavare il proprio corpo o parti
- x procurarsi l'acqua
- x regolare la temperatura o il flusso dell'acqua
- x percepire il bisogno di cure igieniche

X

Fattori correlati

Fisiopatologici

- x Mancanza di coordinazione motoria per (specificare)
- x Spasticità o flaccidità per (specificare)
- x Debolezza muscolare per (specificare)
- x Paralisi per (specificare)
- x Atrofia per (specificare)
- x Contratture muscolari per (specificare)
- x Stato comatoso
- x Disturbi visivi
- x Arti non funzionanti o mancanti
- x Regressione a un precedente stadio di sviluppo
- x Comportamenti ritualistici
- x Deficit somatici

Trattamenti

- x Uso di dispositivi esterni (apparecchio gessato, tutori ortopedici, infusione endovenosa...)
- x Affaticamento e dolore post operatori

Situazionali (personali, ambientali)

- x Deficit cognitivi
- x Dolore
- x Scarsa motivazione
- x Affaticamento
- x Confusione mentale
- x Ansia che paralizza

Fasi di sviluppo

- x Diminuita capacità motoria e visiva o a debolezza muscolare

Cura di sé, deficit (bagno/igiene personale)

Ridotta e/o incapacità di (specificare):

- x mettersi o togliersi vestiti, allacciare i vestiti
- x curare il proprio aspetto
- x acquistare o cambiare capi di vestiario
- x o il flusso dell'acqua
- x percepire il bisogno di cure igieniche

X

Fattori correlati

Fisiopatologici



- x Mancanza di coordinazione motoria per (specificare)
- x Spasticità o flaccidità per (specificare)
- x Debolezza muscolare per (specificare)
- x Paralisi per (specificare)
- x Atrofia per (specificare)
- x Contratture muscolari per (specificare)
- x Stato comatoso
- x Disturbi visivi
- x Arti non funzionanti o mancanti
- x Regressione a un precedente stadio di sviluppo
- x Comportamenti ritualistici
- x Deficit somatici

Trattamenti

- x Uso di dispositivi esterni (apparecchio gessato, tutori ortopedici, infusione endovenosa...)
- x Affaticamento e dolore post operatori

Situazionali (personali, ambientali)

- x Deficit cognitivi
- x Dolore
- x Scarsa motivazione
- x Affaticamento
- x Confusione mentale
- x Ansia che paralizza

Fasi di sviluppo

- x Diminuita capacità motoria e visiva o a debolezza muscolare

Cura di sé, deficit (eliminazione urinaria e fecale)

Incapacità o mancanza di volontà per (specificare):

- x servirsi del gabinetto/comoda
- x trasferirsi sul gabinetto/comoda
- x eseguire pratiche igieniche adeguate
- x pulire il gabinetto o la comoda
- x sistemare gli indumenti per servirsi del gabinetto

X

Fattori correlati

Fisiopatologici

- x Mancanza di coordinazione motoria per (specificare)
- x Spasticità o flaccidità per (specificare)
- x Debolezza muscolare per (specificare)
- x Paralisi per (specificare)
- x Atrofia per (specificare)
- x Contratture muscolari per (specificare)
- x Stato comatoso
- x Disturbi visivi
- x Arti non funzionanti o mancanti
- x Regressione a un precedente stadio di sviluppo
- x Comportamenti ritualistici
- x Deficit somatici



Trattamenti

- x Uso di dispositivi esterni (apparecchio gessato, tutori ortopedici, infusione endovenosa...)
- x Affaticamento e dolore post operatori

Situazionali (personali, ambientali)

- x Deficit cognitivi
- x Dolore
- x Scarsa motivazione
- x Affaticamento
- x Confusione mentale
- x Ansia che paralizza

Fasi di sviluppo

- x Diminuita capacità motoria e visiva o a debolezza muscolare

Cura di sé, deficit (strumentale)

Difficoltà a (specificare)

- x usare il telefono
- x accedere ai mezzi di trasporto
- x lavare e stirare
- x preparare i pasti
- x fare la spesa
- x gestire il denaro
- x assumere i farmaci

X

Fattori correlati

Fisiopatologici

- x Mancanza di coordinazione motoria per (specificare)
- x Spasticità o flaccidità per (specificare)
- x Debolezza muscolare per (specificare)
- x Paralisi per (specificare)
- x Atrofia per (specificare)
- x Contratture muscolari per (specificare)
- x Stato comatoso
- x Disturbi visivi
- x Arti non funzionanti o mancanti
- x Regressione a un precedente stadio di sviluppo
- x Comportamenti ritualistici
- x Deficit somatiformi

Trattamenti

- x Uso di dispositivi esterni (apparecchio gessato, tutori ortopedici, infusione endovenosa...)
- x Affaticamento e dolore post operatori

Situazionali (personali, ambientali)

- x Deficit cognitivi
- x Dolore
- x Scarsa motivazione
- x Affaticamento
- x Confusione mentale
- x Ansia che paralizza

Fasi di sviluppo

- | |
|--|
| <input type="checkbox"/> x Diminuita capacità motoria e visiva o a debolezza muscolare |
|--|

Deambulazione, compromissione, rischio Vedere mobilità, compromissione, rischio	X
---	---

Deglutizione, compromissione	X
-------------------------------------	---

Fattori correlati

Fisiopatologici

- x Diminuzione/assenza del riflesso faringeo, difficoltà di masticazione e riduzione della sensibilità (per paralisi cerebrale, miastenia grave, botulismo, M.di Parkinson, tumore crebrale, danno cerebrale, distrofia muscolare, S. di Guillain Barrè, poliomielite, SLA, ictus cerebrale, danno nervi cranici)
- x Tumore / edema tracheo-esofageo
- x Irritazione della cavità orofaringea
- x Diminuzione della salivazione

Trattamenti

- x Ricostruzione chirurgica della bocca/faringe/mandibola/naso
- x Riduzione della coscienza per anestesia
- x Ostruzione meccanica secondaria a cannula tracheostomica
- x Esofagite da radioterapia

Situazionali (personali, ambientali)

- x Alterazione del livello di coscienza
- x Fatigue

Fasi di sviluppo

- x Bambino: diminuzione della sensibilità e difficoltà di masticazione, scarsa coordinazione tra suzione/deglutizione/respirazione
- x Persona anziana: riduzione della salivazione o del gusto

Dolore acuto (Grave fastidio o disagio che dura da 0 a 6 mesi)	X
---	---

Fattori correlati

Fisiopatologici

Trauma tissutale e spasmi muscolari riflessi secondari a

- x Disordini muscolo scheletrici (fratture, artrite, contrattura muscolare, spasmi, patologia a carico del midollo spinale)
- x Disordini viscerali (cardiaci, renali, epatici, intestinali, polmonari)
- x Cancro
- x Disordini vascolari (vasospasmo, occlusione, flebite, vasodilatazione/cefalea)
- x Infiammazione di nervi, tendini, capsula articolare, articolazioni, muscoli, strutture articolari.
- X Fatigue, malessere o prurito secondari a a malattie infettive (rosolia, pancreatite, epatite, mononucleosi, varicella)
- x Effetti di un tumore su (specificare)
- x Dolori addominali, diarrea, vomito secondari a gastroenterite, ulcera gastrica, influenza.
- X Infiammazione e spasmi della muscolatura liscia per calcoli renali, infezioni gastrointestinali
- x Dolori durante il travaglio / parto, ingorgo mammario

Trattamenti

- x Trauma tissutale e spasmi muscolari riflessi (per intervento chirurgico, ustione, indagini diagnostiche/venipuntura/biopsia, scansioni invasive)
- x Per nausea e vomito secondari a chemioterapia, anestesia, effetti collaterali (specificare)



Situazionali (personali, ambientali)

- x Febbre
- x Immobilità/posizionamento inappropriato
- x Iperattività
- x Punti di pressione (es.ingessatura o bendaggio stretti)
- x Risposta allergica
- x Irritanti chimici
- x Bisogno di dipendenza non soddisfatto
- x Ansia grave e repressa

Fasi di sviluppo

Trauma tissutale e spasmi muscolari riflessi secondari a

- x 1 anno: coliche
- x Prima infanzia: dentizione, otalgia
- x Media infanzia: dolore addominale ricorrente, dolori della crescita
- x Adolescenza: cefalea, dolore toracico, dismenorrea.

Dolore cronico (Continuo/ intermittente che dura da più di 6 mesi)

X

Fattori correlati

Fisiopatologici

Trauma tissutale e spasmi muscolari riflessi secondari a

- X Disordini muscolo scheletrici (fratture, artrite, contrattura muscolare, spasmi, patologia a carico del midollo spinale)
- X Disordini viscerali (cardiaci, renali, epatici, intestinali, polmonari)
- X Cancro
- X Disordini vascolari (vasospasmo, occlusione, flebite, vasodilatazione/cefalea)
- X Infiammazione di nervi, tendini, capsula articolare, articolazioni, muscoli, strutture articolari.
- X Fatigue, malessere o prurito secondari a a malattie infettive (rosolia, pancreatite, epatite, mononucleosi, varicella)
- X Effetti di un tumore su (specificare)
- X Dolori addominali, diarrea, vomito secondari a gastroenterite, ulcera gastrica, influenza.
- X nfiammazione e spasmi della muscolatura liscia per calcoli renali, infezioni gastrointestinali
- X Dolori durante il travaglio / parto, ingorgo mammario

Trattamenti

- X Trauma tissutale e spasmi muscolari riflessi (per intervento chirurgico, ustione, indagini diagnostiche/venipuntura/biopsia, scansiomertria invasiva)
- X Per nausea e vomito secondari a chemioterapia, anestesia, effetti collaterali (specificare)

Situazionali (personali, ambientali)

- X Febbre
- X Immobilità/posizionamento inappropriato
- X Iperattività
- X Punti di pressione (es.ingessatura o bendaggio stretti)
- X Risposta allergica
- X Irritanti chimici
- X Bisogno di dipendenza non soddisfatto
- X Ansia grave e repressa



Eliminazione urinaria compromessa	X
<p>Per Incontinenza urinaria (specificare):</p> <ul style="list-style-type: none"> <input checked="" type="checkbox"/> X Totale (continua, senza presenza di distensione della vescica e/o ritenzione di urine) <input checked="" type="checkbox"/> X Da sforzo (perdita involontaria di urine per aumento della pressione addominale) <input checked="" type="checkbox"/> X Da urgenza (perdita involontaria di urine per urgenza minzionale) <input checked="" type="checkbox"/> X Funzionale (per incapacità di raggiungere in tempo il gabinetto) <input checked="" type="checkbox"/> X Riflessa (senza sensazione di pienezza vescicale o urgenza minzionale) <input checked="" type="checkbox"/> X Da rigurgito (presenza di distensione della vescica e/o ritenzione di urine) 	
<p>Fattori correlati</p> <p>Fisiopatologici</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> X Anomalie congenite delle vie urinarie <input type="checkbox"/> X Diminuita capacità vescicale/irritazione vescicale (per infezione, glicosuria, carcinoma, uretrite, trauma) <input type="checkbox"/> X Diminuzione dei segnali vescicali o del loro riconoscimento (per infezioni/tumori/lesioni midollo spinale, neuropatia alcolica e/o diabetica, malattie demielinizzanti, ictus cerebrale, parkinsonismo, sclerosi multipla, farmaci alfa adrenergici) <p>Trattamenti</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> X Effetti di intervento chirurgico sullo sfintere vescicale (prostatectomia, dissezione pelvica estensiva) 	

Eminegligenza	X
<p>Fattori correlati</p> <p>Fisiopatologici</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> X Alterazione delle capacità percettive secondaria ictus cerebrale, tumore cerebrale, lesione/trauma cranico, aneurisma cerebrale 	

Fatigue	X
<p>Fattori correlati</p> <p>Fisiopatologici</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> X Stato ipermetabolico (per malattie virali, febbre, gravidanza) <input type="checkbox"/> X Inadeguata ossigenazione tissutale (per BPCO, insufficienza cardiaca, anemia, malattia vascolare periferica) <input type="checkbox"/> X Alterazioni biochimiche (per malattie endocrine e metaboliche come diabete mellito, ipotiroidismo, malattie ipofisarie, AIDS, M Addison, cirrosi epatica, insufficienza renale) <input type="checkbox"/> X Debolezza muscolare (per miastenia gravis, sclerosi multipla,, SLA, M. Parkinson, AIDS) <input type="checkbox"/> X Stato ipermetabolico, competizione tra organismo e neoplasia per i nutrienti, anemia fattori di stress associati a tumore <input type="checkbox"/> X Deficit nutrizionali o alterazioni del metabolismo dei nutrienti (per nausea, vomito, diarrea, effetti collaterali dei farmaci, intervento chirurgico allo stomaco, diabete mellito) <input type="checkbox"/> X Processo infiammatorio cronico (per AIDS, artrite, Lupus eritematoso, epatite, Cirrosi Epatica, malattia infiammatoria intestinale, insufficienza renale) <p>Trattamenti</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> X Modificazioni biochimiche secondarie a chemioterapia, radioterapia, effetti collaterali di (specificare) danni tissutali da intervento chirurgico e anestesia, <input type="checkbox"/> X Aumento del consumo energetico (per amputazione, alterazione dell'andatura, uso di deambulatore o stampelle) <p>Situazionali (personali, ambientali)</p>	



- X Diminuzione prolungata dell'attività (per ansia, febbre, diarrea, dolore, isolamento sociale, nausea/vomito, depressione, obesità)
- X Eccessive richieste di ruolo
- X Richieste emozionali sovraccarichi
- X Stress emotivo
- X Disturbi del sonno

Immagine corporea, Disturbo/Rischio di

X

Fattori correlati

Fisiopatologici

- X Variazioni dell'aspetto per malattia cronica, trauma grave, perdita di una parte del corpo, perdita di una funzione organica, invecchiamento

Trattamenti

- X variazione dell'aspetto (per ricovero ospedaliero, radioterapia, chemioterapia, intervento chirurgico)

Situazionali (personali, ambientali)

- X Trauma fisico secondario a abuso sessuale, stupro, aggressione (specificare)
- X Effetti sull'aspetto di obesità, immobilità, gravidanza (specificare)

Immobilizzazione, sindrome da

X

Fattori correlati

Fisiopatologici

- x Riduzione del sensorio
- x Stato di incoscienza
- x Compromissione neuromuscolare (per sclerosi multipla, paralisi parziale/totale, distrofia muscolare, sindrome di Guillain-Barrè, parkinsonismo, lesione del midollo spinale)
- x Compromissione muscolo-scheletrica (per fratture e malattie reumatiche)
- x Malattia terminale (AIDS, cardiopatia, nefropatia)
- x Cancro

Disordini psichiatrici/della salute mentale (per depressione grave, stato catatonico, fobie gravi)

Trattamenti

- x Intervento chirurgico
- x Ventilazione meccanica
- x Linee venose
- x Trazione/gesso/tutore ortopedico
- x Immobilità prescritta

Situazionali (personali, ambientali)

- x Depressione
- x Fatigue
- x Stato di debilitazione
- x Dolore

Fasi di sviluppo

- x Neonato/bambino/adolescente: sindrome Down, artrite giovanile, osteogenesi imperfetta, paralisi cerebrale, disabilità mentale/fisica, autismo, spina bifida
- x Persona anziana: ridotta agilità motoria, debolezza muscolare, demenza presenile



Incontinenza fecale	X
<p>Fattori correlati</p> <p>Fisiopatologici</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> x Compromissione dello sfintere rettale (per chirurgia anale/rettale, lesioni ostetriche, neuropatia periferica) <input type="checkbox"/> x Compromissione delle funzioni cognitive <input type="checkbox"/> x Iperdistensione rettale per stipsi cronica <input type="checkbox"/> x Mancato controllo dello sfintere volontario (per malattia neuromuscolare progressiva, compressione/lesione del midollo spinale, ictus cerebrale, sclerosi multipla) <input type="checkbox"/> x Trattamenti <input type="checkbox"/> x Compromessa capacità del di fungere da serbatoio fecale per colectomia, proctite da radiazioni. <p>Situazionali (personali, ambientali)</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> x Incapacità di riconoscere, interpretare o rispondere ai segnali intestinali (per depressione, compromissione delle funzioni cognitive) 	
Incontinenza urinaria da sforzo	X
<p>Fattori correlati</p> <p>Fisiopatologici</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> x Anomalie congenite delle vie urinarie <input type="checkbox"/> x Alterazioni degenerative della muscolatura pelvica e dei legamenti per deficienza estrogenica <p>Situazionali (personali, ambientali)</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> x Elevata pressione intra-addominale e debolezza della muscolatura pelvica per obesità, attività sessuale, gravidanza, inadeguata igiene personale <input type="checkbox"/> x Debolezza della muscolatura pelvica e dei legamenti per parto, recente rilevante calo ponderale <p>Fasi di sviluppo</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> x Persona anziana: perdita di tono muscolare 	
Incontinenza urinaria da urgenza	X
<p>Fattori correlati</p> <p>Fisiopatologici</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> x Diminuzione della capacità vescicale per infezione, malattie demielinizzanti, ictus cerebrale, trauma, uretrite, neuropatia diabetica, neuropatia alcolica, disturbi/lesioni neurologiche/tumori/infezioni, parkinsonismo <p>Trattamenti</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> x Diminuzione della capacità vescicale per intervento chirurgico addominale, <input type="checkbox"/> x Periodo successivo a cateterismo vescicale a permanenza <p>Situazionali (personali, ambientali)</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> x Irritazione dei recettori vescicali da stiramento per uso di alcol, caffeina, eccessiva assunzione di liquidi <input type="checkbox"/> x Diminuzione della capacità vescicale secondaria a minzioni frequenti <p>Fasi di sviluppo</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> x Bambino: limitata capacità vescicale <input type="checkbox"/> x Persona anziana:diminuita capacità vescicale 	



Incontinenza urinaria funzionale	X
<p>Fattori correlati</p> <p>Fisiopatologici</p> <ul style="list-style-type: none"><input checked="" type="checkbox"/> x Diminuzione di stimoli vescicali/compromessa capacità di riconoscerli per trauma, infezione, tumore cerebrale, parkinsonismo, sclerosi multipla, neuropatia alcolica, malattie demielinizzanti, ictus cerebrale, demenza progressiva <p>Trattamenti</p> <ul style="list-style-type: none"><input checked="" type="checkbox"/> x Riduzione del tono vescicale per uso di antistaminici, terapia immunosoppressiva, adrenalina, diuretici, anticolinergici, tranquillanti, sedativi, miorilassanti <p>Situazionali (personali, ambientali)</p> <ul style="list-style-type: none"><input checked="" type="checkbox"/> x Compromissione della mobilità<input checked="" type="checkbox"/> x Diminuita attenzione nei confronti degli stimoli vescicali per depressione, soppressione intenzionale, confusione mentale<input checked="" type="checkbox"/> x Barriere ambientali per l'accesso al bagno (gabinetto distante, letto troppo alto, scarsa illuminazione, sponde laterali, ambiente non familiare) <p>Fasi di sviluppo</p> <ul style="list-style-type: none"><input checked="" type="checkbox"/> x Persona anziana: perdite motorie/sensitive	
Incontinenza urinaria totale (compromessa eliminazione urinaria)	X
<p>Fattori correlati</p> <p>Fisiopatologici</p> <ul style="list-style-type: none"><input checked="" type="checkbox"/> x Anomalie congenite delle vie urinarie<input checked="" type="checkbox"/> x Diminuita capacità vescicale o irritazione vescicale per trauma, carcinoma, infezione uretrite, glicosuria<input checked="" type="checkbox"/> x Diminuzione dei segnali vescicali o compromessa capacità di riconoscerli per infezione/tumore/lesione del midollo spinale, neuropatia diabetica/alcolica, malattie demielinizzanti, ictus cerebrale, parkinsonismo, lesione cerebrale, sclerosi multipla <p>Trattamenti</p> <ul style="list-style-type: none"><input checked="" type="checkbox"/> x Effetti del trattamento chirurgico sullo sfintere vescicale per prostatectomia, dissezione pelvica estensiva<input checked="" type="checkbox"/> x Strumentazione diagnostica<input checked="" type="checkbox"/> x Riduzione del tono muscolare per per anestesia generale o spinale, terapia farmacologica e iatrogenesi (farmaci miorilassanti, anestetici, diuretici, antistaminici, anticolinergici, immunodepressori, adrenalina, ansiolitici) <p>Situazionali (personali, ambientali)</p> <ul style="list-style-type: none"><input checked="" type="checkbox"/> x Compromissione della mobilità<input checked="" type="checkbox"/> x Diminuita attenzione nei confronti degli stimoli vescicali per depressione, soppressione intenzionale, confusione mentale<input checked="" type="checkbox"/> x Barriere ambientali per l'accesso al bagno (gabinetto distante, letto troppo alto, scarsa illuminazione, sponde laterali, ambiente non familiare) <p>Fasi di sviluppo</p> <ul style="list-style-type: none"><input checked="" type="checkbox"/> x Persona anziana: perdite motorie/sensitive	

Infezione, rischio di	X
<p>Fattori correlati</p> <p>Fisiopatologici</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> x Compromissione delle difese dell'ospite per cancro, malattie respiratorie, ematologiche, periodontali, malattie epatiche, artrite, diabete mellito, malattie ereditarie, AIDS, alcolismo, immunosoppressione (secondaria a- specificare) <input type="checkbox"/> x Compromissione della circolazione per linfedema, obesità, malattia vascolare periferica <p>Trattamenti</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> x Sede di possibile invasione di microorganismi per intervento chirurgico, intubazione, linee invasive, nutrizione parenterale totale, dialisi, nutrizione enterale <input type="checkbox"/> x Compromissione delle difese dell'ospite per terapia radiante, trapianto d'organo, terapia farmacologica (specificare) <p>Situazionali (personali, ambientali)</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> x Compromissione delle difese dell'ospite per malattie infettive, stress, malnutrizione, prolungata degenza in ospedale, fumo, prolungata immobilità <input type="checkbox"/> x Possibile sede di invasione di microorganismi per trauma accidentale/intenzionale, periodo postpartum, morso di insetto/animale/umano, lesione termica, ambiente caldo/umido/buio (apparecchio) <input type="checkbox"/> x gessato, pieghe cutanee) <input type="checkbox"/> x Contatto con agenti contaminanti (infezioni nosocomiali o di comunità) <p>Fasi di sviluppo</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> x Persona anziana: maggiore vulnerabilità per diminuzione della risposta immunitaria, condizione debilitante, malattia cronica) 	

Insonnia	X
<p>Fattori correlati</p> <p>Fisiopatologici</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> x Compromissione del trasporto di ossigeno (per angina, disturbi circolatori/respiratori, arteriosclerosi periferica) <input type="checkbox"/> x Compromissione dell'eliminazione fecale o urinaria (per diarrea, disuria, ritenzione, incontinenza, stipsi, pollacchiuria) <input type="checkbox"/> x Compromissione del metabolismo (per ipertiroidismo, disturbi epatici, ulcera gastrica) <p>Situazionali (personali, ambientali)</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> x Eccessiva iperattività (per disturbo bipolare/ da deficit dell'attenzione, panico, uso di droghe) <input type="checkbox"/> x Eccessivo dormire di giorno <input type="checkbox"/> x Depressione <input type="checkbox"/> x Inadeguata attività fisica durante il giorno <input type="checkbox"/> x Dolore cronico <input type="checkbox"/> x Risposte ansiose <input type="checkbox"/> x Modifiche ambientali (specificare) <input type="checkbox"/> x Paura 	



Integrità mucosa orale, compromissione	X
<p>Fattori correlati</p> <ul style="list-style-type: none"> <input checked="" type="checkbox"/> x Inadeguata igiene orale <input checked="" type="checkbox"/> x Incapacità di provvedere all'igiene orale 	
Ipertermia	X
<p>Fattori correlati</p> <p>Trattamenti</p> <ul style="list-style-type: none"> <input checked="" type="checkbox"/> x Ridotta capacità di sudorazione (specificare il farmaco) <p>Situazionali</p> <ul style="list-style-type: none"> <input checked="" type="checkbox"/> x Esposizione al calore, al sole <input checked="" type="checkbox"/> x Abbigliamento inadeguato al clima <input checked="" type="checkbox"/> x Assenza di condizionamento dell'aria <input type="checkbox"/> Strumenti per il riscaldamento del neonato in ambito ospedaliero <input checked="" type="checkbox"/> x Diminuzione della circolazione (per persona sovrappeso/sottopeso, disidratazione) <input checked="" type="checkbox"/> x Idratazione insufficiente per un'attività fisica vigorosa <p>Fasi di sviluppo</p> <ul style="list-style-type: none"> <input checked="" type="checkbox"/> x Inefficacia della termoregolazione secondaria all'età 	
Ipotermia	X
<p>Fattori correlati</p> <p>Situazionali (personali, ambientali)</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Esposizione a freddo, pioggia, neve, vento <input checked="" type="checkbox"/> x Vestiario inadatto al clima <input checked="" type="checkbox"/> x Impossibilità di pagare l'affitto o il riscaldamento <input checked="" type="checkbox"/> x Diminuzione della circolazione (per persona sovrappeso/sottopeso, consumo di alcol, disidratazione, inattività) <p>Fasi di sviluppo</p> <ul style="list-style-type: none"> <input checked="" type="checkbox"/> x Inefficacia della termoregolazione secondaria all'età (es. neonato, anziano) 	
Lesione, rischio di	X
<p>Fattori correlati</p> <p>Fisiopatologici</p> <ul style="list-style-type: none"> <input checked="" type="checkbox"/> x Alterazioni delle funzioni cerebrali per ipossia (vertigini, sincope) <input checked="" type="checkbox"/> x Alterazioni della mobilità (ictus cerebrale, artrite, parkinsonismo, perdita di un arto, compromissione della vista/udito) <input checked="" type="checkbox"/> x Fatigue <input checked="" type="checkbox"/> x Ipotensione ortostatica <input checked="" type="checkbox"/> x Insufficienza vertebro basilare <input checked="" type="checkbox"/> x Disturbi vestibolari <input checked="" type="checkbox"/> x Inadeguata consapevolezza dei rischi ambientali (confusione mentale) <input checked="" type="checkbox"/> x Movimenti tonico-clonici (convulsioni) <p>Trattamenti</p> <ul style="list-style-type: none"> <input checked="" type="checkbox"/> x Lungo allettamento 	



<input type="checkbox"/> x Effetti sulla mobilità/sensorio (sedativi, miorilassanti...specificare) <input type="checkbox"/> x Gesso, stampelle, deambulatore, bastone Situazionali (personali, ambientali) <input type="checkbox"/> x Diminuzione o perdita memoria a breve termine <input type="checkbox"/> x Alterata capacità di giudizio (per stress, droghe, alcol, disidratazione, depressione) <input type="checkbox"/> x Pericoli domestici (pavimenti sdruciolevoli, scale, illuminazione insufficiente, ingressi/corridoi non sicuri, bagno, giocattoli non sicuri, impianto elettrico difettoso, veleni conservati in modo improprio) <input type="checkbox"/> x Pericoli legati all'uso dell'automobile (cinture, sedile di sicurezza per bambini, meccanica del veicolo non sicura) <input type="checkbox"/> x Pericolo di incendio <input type="checkbox"/> x Ambiente non familiare (es. Ospedale) <input type="checkbox"/> x Scarpe inadatte, <input type="checkbox"/> x Disattenzione del caregiver <input type="checkbox"/> x Uso improprio degli ausili <input type="checkbox"/> x Storia di incidenti <input type="checkbox"/> x Andatura instabile Fasi di sviluppo <input type="checkbox"/> x Bambino: inadeguata consapevolezza dei pericoli <input type="checkbox"/> x Persona anziana: alterata capacità di giudizio (per deficit cognitivi), stile di vita sedentario, perdita di forza muscolare
--

Liquidi, eccessivo volume di	X
<p>Fattori correlati</p> <p>Fisiopatologici</p> <input type="checkbox"/> x Compromissione dei meccanismi regolatori (per insufficienza renale acuta/cronica, disfunzioni endocrine, anomalie sistemiche metaboliche, lipoedema) <input type="checkbox"/> x Iperensione portale, diminuzione della pressione colloidale-osmotica e ritenzione di sodio (per epatopatia, cancro, cirrosi, ascite) <input type="checkbox"/> x Anomalie venose e arteriose (vene varicose, vasculopatia periferica,. Trombosi, flebite, immobilità, linfoedema, infezioni, trauma, neoplasie) <p>Trattamenti</p> <input type="checkbox"/> x Ritenzione di sodio e acqua (terapia corticosteroidea) <input type="checkbox"/> x Inadeguato drenaggio linfatico (mastectomia) <p>Situazionali (personali, ambientali)</p> <input type="checkbox"/> x Eccessivo apporto di sodio/liquidi <input type="checkbox"/> x Inadeguato apporto proteico (dieta squilibrata, malnutrizione) <input type="checkbox"/> x Ristagno venoso declive/venostasi (per immobilità, prolungata stazione eretta/posizione seduta, gesso/fasciatura stretta) <input type="checkbox"/> x Compromissione venosa da utero gravido <p>Fasi di sviluppo</p> <input type="checkbox"/> x Persona anziana: compromissione del ritorno venoso per aumento delle resistenze periferiche e diminuzione dell'efficienza valvolare	

Liquidi, insufficiente volume di	X
<p>Fattori correlati</p> <p>Fisiopatologici</p>	



- x Eccessiva emissione di urine (per diabete mellito insipido, diabete mellito scompensato)
- x Aumento della permeabilità capillare e evaporazione da ustioni
- x Perdite (febbre, aumento del metabolismo, drenaggio accentuato, ferite, peritonite, diarrea, menorragia)

Situazionali (personali, ambientali)

- x Vomito/nausea
- x Diminuita motivazione a bere (depressione, fatigue)
- x Dieta scorretta/digiuno
- x Nutrizione per sonda con soluzione concentrata
- x Difficoltà a deglutire/assumere alimenti (dolore orale, fatigue)
- x Esposizione a climi estremi
- x Perdita eccessiva (cateteri a permanenza, drenaggi)
- x Liquidi insufficienti in rapporto all'esercizio fisico/condizioni climatiche
- x Uso eccessivo di lassativi o clisteri, diuretici, alcol, caffeina

Fasi di sviluppo

- x Bambino: aumentata vulnerabilità (ridotta riserva idrica, ridotta capacità di concentrazione delle urine)
- x Persona anziana: aumentata vulnerabilità a ridotta riserva idrica, ridotta sensazione di sete

Memoria, compromissione

X

Fattori correlati

Fisiopatologici

- x Alterazioni del SNC (per malattia cerebrale degenerativa, ictus cerebrale, lesione/trauma cranico)
- x Riduzione della quantità/qualità delle informazioni elaborate (per deficit visivi/uditivi, livello di istruzione, ridotte capacità intellettive, abitudini di apprendimento, benessere fisico insufficiente, affaticamento)
- x Deficienze nutrizionali

Trattamenti

- x Effetti dei farmaci sulla memorizzazione delle informazioni

Situazionali (personali, ambientali)

- x Aspettative che si auto realizzano
- x Eccessiva attenzione/preoccupazione per se stessi (per lutto, ansia, depressione)
- x Consumo di alcol
- x Mancanza di motivazione
- x Inadeguata stimolazione
- x Difficoltà di concentrazione (per stress, disturbi del sonno, dolore, inadeguata stimolazione intellettuale, distrazioni)

Mobilità, compromissione /rischio di

X

Fattori correlati

Fisiopatologici

- x riduzione della forza e della resistenza per compromissione neuromuscolare (malattie autoimmunitarie, del sistema nervoso, respiratorie, distrofia muscolare, paralisi parziale, tumore del SNC, tumore, trauma, ipertensione endocranica, deficit sensoriale)
- x riduzione della forza e della resistenza per compromissione muscoloscheletrica (fratture, malattie del tessuto connettivo, condizioni cardiache)
- x rigidità delle articolazioni o contratture (per malattia infiammatoria, interventi endoprotesi ortopedica)



<p>articolare, malattia degenerativa delle articolazioni e del disco)</p> <ul style="list-style-type: none"> <input checked="" type="checkbox"/> x edemi <input checked="" type="checkbox"/> x apparecchi esterni (gesso/splint, corsetto ortopedico, catetere venoso) <input checked="" type="checkbox"/> x forza/resistenza insufficienti per la deambulazione (protesi, stampelle, deambulatore) <p>Situazionali (personali, ambientali)</p> <ul style="list-style-type: none"> <input checked="" type="checkbox"/> x fatigue <input checked="" type="checkbox"/> x obesità <input checked="" type="checkbox"/> x mancanza di motivazione <input checked="" type="checkbox"/> x dispnea <input checked="" type="checkbox"/> x dolore <p>Fasi di sviluppo</p> <ul style="list-style-type: none"> <input checked="" type="checkbox"/> x Bambino: alterazione dell'andatura per deficienze scheletriche congenite, displasia congenita dell'anca, osteomielite <input checked="" type="checkbox"/> x Persona anziana: diminuzione dell'agilità e debolezza muscolare
--

Mobilità nel letto, mobilità con la sedia a rotelle, compromissione /rischio Vedere mobilità, compromissione, rischio	X
---	----------

Nausea	X
<p>Fattori correlati</p> <p>Fisiopatologici</p> <ul style="list-style-type: none"> <input checked="" type="checkbox"/> x Trauma tissutale e spasmi muscolari riflessi (per gastroenterite acuta, ulcera gastrica, sindrome colon irritabile, pancreatite, infezioni, tossoinfezioni alimentari, intossicazioni da farmaci, calcolosi renale, crampi uterini, malessere da movimento, stress) (specificare) <p>Trattamenti</p> <ul style="list-style-type: none"> <input checked="" type="checkbox"/> x Effetti della chemioterapia e/o farmaci <input checked="" type="checkbox"/> x Effetti dell'anestesia 	

Non adesione (a indicazioni terapeutiche)	X
<p>Fattori correlati</p> <p>Fisiopatologici</p> <ul style="list-style-type: none"> <input checked="" type="checkbox"/> x Compromessa capacità di prestazione a causa di una disabilità (scarsa memoria, deficit motori/sensitivi) <input checked="" type="checkbox"/> x Aumento dei sintomi correlati alla malattia nonostante la precedente adesione al regime terapeutico consigliato <p>Trattamenti</p> <ul style="list-style-type: none"> <input checked="" type="checkbox"/> x Effetti collaterali della terapia <input checked="" type="checkbox"/> x Ambiente non terapeutico <input checked="" type="checkbox"/> x Terapia complessa non controllata/prolungata <input checked="" type="checkbox"/> x Costo economico della terapia <input checked="" type="checkbox"/> x Pregresse esperienze di regime terapeutico consigliato inefficace <input checked="" type="checkbox"/> x Processo di presa in carico impersonale (multi professionale) <p>Situazionali (personali, ambientali)</p> <ul style="list-style-type: none"> <input checked="" type="checkbox"/> x Presenza di barriere per l'accesso (per problemi di mobilità/trasporto/economici, mancanza di assistenza per i figli, tempo inclemente) <input checked="" type="checkbox"/> x Malattia concomitante di un membro della famiglia (mancato sostegno da parte della 	



famiglia/amici/comunità)

- x Barriere all'assistenza secondarie a mancanza di alloggio
- x Modificazione dello stato lavorativo
- x Modificazione della copertura assicurativa per le spese sanitarie
- x Barriere alla comprensione (per deficit cognitivi/visivi/uditivi, difficoltà di memoria, ansia, fatigue, ridotta attenzione, problemi motivazionali)

Nutrizione inferiore al fabbisogno, rischio di

X

Fattori correlati

Fisiopatologici

- x Aumentato fabbisogno calorico e difficoltà ad assumere sufficienti calorie (per ustione, trauma, complicanze/deformazioni gastrointestinali, cancro, alcolismo, uso di sostanze stupefacenti, infezione, AIDS)
- x Disfagia (per ictus cerebrale, M.di Parkinson, palatoschisi, distrofia muscolare, paralisi cerebrale, paralisi facciale, SLA, disturbi neuromuscolari)
- x Diminuito assorbimento di nutrienti (per M.di Crohn, enterocolite necrotizzante, intolleranza al lattosio, fibrosi cistica)
- x Diminuzione dell'appetito (per alterazioni dello stato di coscienza)
- x Vomito autoindotto, esercizio fisico eccessivo in rapporto alle calorie assunte, anoressia
- x Rifiuto ad alimentarsi (timore di essere avvelenato/ comportamento paranoico)
- x Inappetenza/agitazione fisica (per disturbo bipolare)
- x Inappetenza e diarrea (per infezione da protozoi)
- x Vomito, inappetenza e alterazioni della digestione (per pancreatite)
- x Inappetenza e compromissione del metabolismo proteico/lipidico, ipovitaminosi (per cirrosi epatica)
- x Inappetenza, vomito e alterazione della digestione (per malformazioni del tratto gastrointestinale /enterocolite necrotizzante)
- x Inappetenza per reflusso gastroesofageo

Trattamenti

- x Aumentato fabbisogno proteico/vitaminico per la cicatrizzazione di ferite e diminuita assunzione (per intervento chirurgico, farmaci, blocco mandibolare, radioterapia)
- x Inadeguato assorbimento come effetto collaterale di farmaci (specificare)
- x Diminuita assunzione orale, dolore in sede orale, nausea, vomito (per radioterapia, chemioterapia, tonsillectomia)

Situazionali (personali, ambientali)

- x Diminuzione dell'appetito (per nausea, vomito, isolamento sociale, stress, depressione, allergie)
- x Incapacità di procurarsi gli alimenti (per limitazioni fisiche, problemi finanziari/ di trasporto)
- x Incapacità di masticare (per adentulia, carie, protesi non adatta)
- x Diarrea

Fasi di sviluppo

- x Neonato/bambino: inadeguata assunzione (per carente stimolazione sensoriale, inadeguate conoscenze del care giver, scarsa produzione del latte materno)
- x Malassorbimento, restrizioni dietetiche, inappetenza (per morbo celiaco, fibrosi cistica, intolleranza al lattosio, malformazioni gastrointestinali, reflusso gastroesofageo, enterocolite necrotizzante)
- x Difficoltà di suzione/disfagia (per paralisi, labioschisi, palatoschisi)
- x Inadeguata suzione, astenia e dispnea (per cardiopatia congenita, iperbilirubinemia, sindrome virale, distress respiratorio, prematurità, ritardo di sviluppo)



Respirazione, inefficace funzionalità, rischio	X
<p>Fattori correlati</p> <p>Fisiopatologici</p> <ul style="list-style-type: none"><input type="checkbox"/> x Secrezioni eccessive o dense (per infezione, infiammazione, allergia, patologie cardiopolmonari, fumo)<input type="checkbox"/> x Immobilità stasi delle secrezioni, tosse inefficace (per malattie del SN, depressione del SNC/trauma cranico, ictus cerebrale, tetraplegia) <p>Trattamenti</p> <ul style="list-style-type: none"><input type="checkbox"/> x Immobilità (per effetto sedativo di farmaci, droghe o sostanze chimiche, anestesia)<input type="checkbox"/> x Soppressione del riflesso della tosse<input type="checkbox"/> x Effetti della tracheostomia (alterazione delle secrezioni) <p>Situazionali (personali, ambientali)</p> <ul style="list-style-type: none"><input type="checkbox"/> x Immobilità (per intervento chirurgico/trauma, compromissione percettiva/cognitiva, fatigue, dolore, paura, ansia)<input type="checkbox"/> x Livello di umidità estremamente alto/basso (posizione prona nel sonno, esposizione a freddo, pianto, riso, allergeni, fumo)	
Soffocamento, rischio Vedere rischio di lesione	X
Stipsi	X
<p>Fattori correlati</p> <p>Fisiopatologici</p> <ul style="list-style-type: none"><input type="checkbox"/> x Innervazione difettosa, debolezza della muscolatura pelvica immobilità (per lesioni/traumi del midollo spinale, spina bifida, ictus cerebrale, malattia neurologica, demenza)<input type="checkbox"/> x Riduzione del metabolismo (per ipotiroidismo, iperparatiroidismo, obesità, feocromocitoma, uremia, neuropatia diabetica, ipo pituitarismo)<input type="checkbox"/> x Diminuita risposta al bisogno di defecare (disturbi dell'umore)<input type="checkbox"/> x Dolore alla defecazione (per emorroidi, lesione dorsale)<input type="checkbox"/> x Diminuita peristalsi secondaria a ipossia cardiaca/polmonare<input type="checkbox"/> x Disturbi della mobilità secondari a sindrome da intestino irritabile<input type="checkbox"/> x Incapacità di rilassare lo sfintere anale e elevata pressione a riposo nel canale anale (parti vaginali multipli, sforzo cronico) <p>Trattamenti</p> <ul style="list-style-type: none"><input type="checkbox"/> x Effetti collaterali di farmaci (specificare)<input type="checkbox"/> x Effetti sulla peristalsi dell'anaestesia e della manipolazione chirurgica<input type="checkbox"/> x Uso abituale di lassativi<input type="checkbox"/> x Mucosite secondaria a radiazioni <p>Situazionali (personali, ambientali)</p> <ul style="list-style-type: none"><input type="checkbox"/> x Diminuzione della peristalsi (per immobilità, gravidanza, stress, mancanza di esercizio fisico)<input type="checkbox"/> x Modello di evacuazione irregolare<input type="checkbox"/> x Credenze culturali/sulla salute<input type="checkbox"/> x Mancanza di riservatezza<input type="checkbox"/> x Dieta priva di scorie, assunzione di liquidi inadeguata<input type="checkbox"/> x Paura di dolore rettale o cardiaco<input type="checkbox"/> x Valutazioni errate<input type="checkbox"/> x Incapacità di percepire i segnali intestinali	



Stress, sovraccarico psicofisico	X
Fattori correlati	
Fisiopatologici	
<input checked="" type="checkbox"/> x Necessità di far fronte a malattie acute, croniche, terminali, nuove diagnosi, condizioni deturpanti	
Situazionali (personali, ambientali)	
<input checked="" type="checkbox"/> x Perdita reale o prevista di una persona significativa (per morte, divorzio, trasloco, servizio militare)	
<input checked="" type="checkbox"/> x Necessità di far fronte a morte, aggressione, guerra	
<input checked="" type="checkbox"/> x Variazione reale o percepita dello stato socio- economico (per disoccupazione, promozione, nuovo lavoro, pensionamento, distruzione di proprietà personali, perdita/cambiamento della casa, malattia)	
<input checked="" type="checkbox"/> x Necessità di far fronte a violenza in famiglia, abuso di sostanza, nuovo componente familiare, problemi relazionali	
<input checked="" type="checkbox"/> x Perdite funzionali	
Trauma, rischio	X
Vedere rischio di lesione	

Allegato 3

PROBLEMI COLLABORATIVI PRELEVALEMENTEMENTE TRATTATI	
Selezionare (X) le caselle relative ai problemi collaborativi di interesse (riferimenti bibliografici: L.J.Carpenito-Diagnosi infermieristiche - 5th. ed. C.E.A. Edizioni, 2010)	
Rischio di complicanze (RC) per disfunzione cardiaca/ vascolare	
RC per emorragia	X
RC per riduzione della gittata cardiaca	X
RC per aritmie	X
RC per edema polmonare	X
RC per trombosi venosa profonda	X
RC per sindrome compartimentale	X
RC per embolia polmonare	X
Rischio di complicanze (RC) per disfunzione respiratoria	
RC per ipossiemia	X
RC per atelectasia/polmonite	X
RC per costrizione tracheobronchiale	X
RC per pneumotorace	X
Rischio di complicanze (RC) per disfunzione metabolica/immunitaria/ematopoietica	
RC per ipo/iperglicemia	X
RC per bilancio azotato negativo	X
RC per squilibri elettrolitici	X
RC per sepsi	X
RC per acidosi (metabolica, respiratoria)	X
RC per alcalosi (metabolica, respiratoria)	X
RC per reazione allergica	X
Rc per trombocitopenia	X
RC per infezioni opportunistiche	X
Rischio di complicanze (RC) per disfunzione renale / urinaria	
RC per ritenzione urinaria acuta	X
RC per insufficienza renale	X
RC per calcoli renali	X

Rischio di complicanze (RC) per disfunzione neurologica / sensoriale	
RC per ipertensione endocranica	X
RC per crisi convulsiva	X
RC per ipertensione intraoculare	X
RC per sindrome neurolettica maligna	X
Rischio di complicanze (RC) per disfunzione gastrointestinale / epatica / biliare	
RC per disfunzione epatica	X
RC per iperbilirubinemia	X
Rischio di complicanze (RC) per disfunzione muscoloscheletrica	
RC per fratture patologiche	X
Rischio di complicanze (RC) per effetti avversi (EA) della terapia farmacologica	
RC per effetti avversi della terapia con farmaci anticoagulanti	X
RC per effetti avversi della terapia con farmaci antineoplastici	X
RC per effetti avversi della terapia con farmaci anticonvulsivanti	X
RC per effetti avversi della terapia con farmaci antidepressivi	X
RC per effetti avversi della terapia con farmaci antiaritmici	X
RC per effetti avversi della terapia con farmaci antipertensivi	X
RC per effetti avversi della terapia con farmaci betabloccanti	X
RC per effetti avversi della terapia con farmaci calcioantagonisti	X
RC per effetti avversi della terapia con farmaci inibitori dei recettori dell'angiotensina	X
RC per effetti avversi della terapia con farmaci diuretici	X



Allegato 4

APPRENDIMENTO OFFERTO

In relazione alle diagnosi infermieristiche / problemi collaborativi sopra indicati, descrivere le opportunità formative per lo studente che caratterizzano la sede di apprendimento. Esempio: interventi assistenziali infermieristici, modelli organizzativi e/o di presa in carico assistenziale, attività di ricerca e innovazione.

Le Cure Domiciliari dell'area Torino Sud offrono assistenza alle persone che manifestano necessità assistenziale relative alle componenti della “ cura di sé ” conseguente a malattia d'organo acuta o cronica. Il deficit d'organo deve comportare l'impossibilità per la persona di accedere alle prestazioni erogate nell'ambito dei Poliambulatori Distrettuali dell' ASL Città di Torino o nelle ASO/Presidi Ospedalieri dell' Area Metropolitana.

L'ambito territoriale di competenza si estende dalle zone/quartieri di Lingotto, Nizza, Millefonti, Mirafiori Nord/Sud, Pozzo Strada, Cit Turin, alle zone centrali di Torino, Crocetta, San Secondo, San Salvario, Borgo Po e Cavoretto per una superficie Torinese pari alla metà dell'intera Città di Torino.

Il bacino di utenza è di 680 famiglie.

L'assistenza è rivolta alla popolazione compresa nella fascia di età tra 6 mesi-over 95 aa.

Le prestazioni assistenziali riguardano:

- Terapie infusionali, endovena, intramuscolari, sottocute;
- Applicazioni di medicazioni per ferite cutanee semplici o complesse;
- Prelievi ematochimici e di campioni biologici;
- Bendaggi elastocompressivi;

- Terapia a pressione topica negativa;
- Igiene e cura della persona;
- Medicazioni fissatori esterni in attesa di intervento chirurgico;
- Cateterismi vescicali permanenti ed estemporanei;
- Medicazioni e lavaggi di CVC a inserzione periferica e centrale(tunnellizzati e non, Port).
- NPT; assistenza stomizzati, assistenza respiratori;

In Cure Domiciliari si possono presentare diversi profili di assistenza secondo il numero di accessi necessari a garantire le prestazioni e soprattutto al perseguimento del “ Progetto Personalizzato di Assistenza “.

Il progetto è la stesura degli obiettivi, prestazioni e risultati attesi durante la presa in carico dell’assistito. Viene stilato durante la prima visita domiciliare, discusso con il paziente e la famiglia , in caso di assistenza complessa (ADI) anche dal curante.

La presenza infermieristica al domicilio è garantita con livelli di competenza differenziati e coerenti con le necessità di fornire risposte corrette ai complessi bisogni delle persone.

Si tratta quindi di una metodologia di lavoro che non si limita a svolgere prestazioni e a circoscrivere la sua autonomia nell’individuare e affrontare solamente le problematiche del momento ma è orientata a sviluppare capacità di assistenza sui problemi potenziali, e ad analizzare il rischio di insorgenza e di peggioramento e a porre in atto tutte le misure necessarie.

Lo studente può sperimentarsi rispetto alle competenze agite dagli infermieri:

-capacità di adattamento per l’assenza di standardizzazioni tipiche dell’ospedale e assistenza agita in



presenza di famigliari

- capacità relazionali che consentono di instaurare la relazione terapeutica con l'assistito e i famigliari improntate sulla reciproca conoscenza e fiducia, ma anche all'interno del confronto costante con altri professionisti tra cui i medici di famiglia, responsabili clinici dell'assistito e di tutti gli altri professionisti che a vario titolo intervengono nel progetto di assistenza .

- competenze educative che permettono agli infermieri di condurre gradualmente i malati e i loro famigliari verso l'autonomia e l'autogestione dell'auto-cura nel piu' ampio scenario delle cure primarie volte al modello del Chronic Care Model e dell'Advocacy (infermiere promotore e sostenitore attivo della causa dell'assistito).

Gli infermieri utilizzano un metodo educativo sperimentato e studiato in un progetto di ricerca voluto dalle medesime componenti professionali delle cure domiciliari.

La prima visita domiciliare, anticamera della presa in carico , poggia le basi per valutare l'idoneità del caregiver all'educazione delle tecniche assistenziali che dovrà condurre. L'addestramento guidato ed oggettivato da specifici strumenti operativi sono determinanti per il raggiungimento dell'autonomia del caregiver.

Lo studente avrà quindi modo di esercitarsi nella valutazione delle capacità del self care dell'assistito o del caregiver e verificare come erogare assistenza nell'attesa di educazione terapeutica.

Ma parallelamente potrà sperimentare le abilità nella valutazione dei bisogni assistenziali dell'assistito per definire l'appropriatezza dello stesso nella missione in cure domiciliari; infatti da alcuni anni, le segnalazioni di presa in carico, vengono preliminarmente valutate dal Dirigente Medico del Servizio e dal Coordinatore, ma poi sviluppate dagli infermieri. Questo nel piu' ampio scenario di per rendere



efficace ed efficiente le cure erogate nel setting assistenziale idoneo alle necessità di aiuto degli assistiti.

L'assistenza infermieristica domiciliare è fortemente integrata con quella offerta dai servizi sociali. Si tratta di attività che prevedono coinvolgimenti eterogenei (comunità, singoli , gruppi) e per i quali è l'infermiere *case manager* del caso a rivedere una le potenziali necessità e ad attivare gli appositi interventi.

Gli infermieri sono come sopra accennato, i *case manager* dei loro assistiti; ogni infermiere ha la responsabilità gestionale e assistenziale di un numero preciso di casi ed è coadiuvato dai colleghi che a loro volta possono essere referenti dei casi o di supporto al progetto assistenziale.

Lo studente ha la disponibilità costante di un infermiere affiancatore che potrà seguire durante le visite domiciliari e nella valutazione delle nuove persone prese in carico.

Sono previsti momenti di briefing e debriefing dei casi in carico giornalmente e formalizzati in riunioni di servizio mensili.

La progettualità assistenziale è documentata sulla cartella clinica integrata sia cartacea che informatizzata, a cui lo studente può avere accesso. La documentazione è utilizzata da tutti i professionisti che intervengono nel piano di cura.

Lo studente, inoltre, potrà assistere in qualità di osservatore ai posizionamenti ecoguidati dei cateteri venosi Midline poiché il servizio di cure domiciliari ha al suo attivo infermieri esperti in tale ambito.

Mentre in qualità di partecipante attivo alle valutazioni multidimensionali in vulnologia , poiché anche in tale ambito, vi sono infermieri con acquisite competenze avanzate.