

OFFERTA FORMATIVA DELLA SEDE DI TIROCINIO

Contesto	
<p>Tutor clinico Contatti e riferimenti</p>	<p>Nome BARBARA Cognome BUCCIERO Telefono 011/4393220 e-mail barbara.bucciero@unito.it</p>
<p>Struttura/servizio Nominativo, ubicazione, ecc N°locali, n° posti letto, Orari apertura al pubblico, Orari di lavoro, Figure professionali Risorse strumentali Servizi agli studenti (mensa, biblioteca, accesso internet, ecc)</p> <p>Contatti e riferimenti</p>	<p>Semintensiva, p.o. Maria Vittoria 24 posti letto di cui 8 monitorizzati 13.00-14.00 19.00-20.00 7.00-14.30 14.30-22.30 22.30-7.00 Medici, Infermieri, OSS</p> <p>Indirizzo Via Cibrario 72 Telefono 011/4393220 Fax e-mail</p>
<p>Come raggiungere il servizio Mappa percorso Mezzi pubblici</p>	<p>13-71</p>

Allegato 1

**Problemi di salute / Problemi clinici / Percorso diagnostico terapeutici
prevalentemente trattati**

Selezionare (X) i problemi di salute prevalenti e indicare le patologie più frequenti

Malattie Cardiovascolari	X
Scompenso cardiaco	
Malattie Intestinali / digestive	X
Emorragie digestive; pancreatiti	
Malattie Respiratorie	X
BPCO; Insufficienza respiratoria; polmoniti; edema polmonare acuto.	

Allegato 2

Diagnosi Infermieristiche prevalentemente trattate

Selezionare (X) le caselle relative alle Diagnosi Infermieristiche e ai fattori correlati di interesse
(riferimenti bibliografici: L.J.Carpenito-Diagnosi infermieristiche – 5th. ed. C.E.A. Edizioni, 2010)

Ansia	X
<p>Fattori correlati</p> <p>Fisiopatologici</p> <p>X Qualsiasi fattore che interferisca con i bisogni relativi ad alimentazione, respirazione, comfort, sicurezza</p> <p>Situazionali (personali, ambientali)</p> <p>X Minaccia reale o percepita all'integrità biologica (per malattia, violenza, procedure invasive, stato terminale)</p> <p>X Cambiamento ambientale reale o percepito (trasloco, ospedalizzazione, pensionamento, condizione di rifugiato, reclusione, calamità naturali, rischi per la sicurezza...)</p> <p>Fasi di sviluppo</p> <p>X Adulto: minaccia al concetto di se per gravidanza, ruolo genitoriale, cambiamento di carriera, effetti dell'invecchiamento, complicanze di una precedente gravidanza, aborto, o morte del feto, insufficiente conoscenza dell'esperienza del travaglio</p> <p>X Persona anziana: minaccia al concetto di se secondaria a perdite sensoriali, motorie, problemi finanziari, cambiamenti legati al pensionamento</p>	
Aspirazione, rischio di	X
<p>Fattori correlati</p> <p>Fisiopatologici</p> <p>X Depressione dei riflessi della tosse/faringeo</p> <p>Trattamenti</p> <p>X Depressione dei riflessi laringeo/glottico (per tracheostomia/trachetomia, sedazione, nutriz. enterale)</p> <p>Situazionali (personali, ambientali)</p> <p>X Incapacità/difficoltà di sollevare la parte superiore del corpo</p> <p>Fasi di sviluppo</p> <p>X Persona anziana: dentizione inadeguata</p>	
Attività, intolleranza all'attività	X
<p>Fattori correlati</p> <p>Fisiopatologici</p> <p>Compromissione del sistema di apporto di ossigeno per</p> <p>X Sistema cardiaco (insufficienza cardiaca, valvolare, aritmie, infarto del miocardio, cardiopatia congenita, angina)</p> <p>X Sistema respiratorio (bronco pneumopatia cronica ostruttiva, atelectasia, dispnea broncopolmonare)</p> <p>X Sistema circolatorio (anemia, ipovolemia, arteriopatia periferica)</p> <p>Aumento del fabbisogno metabolico per</p> <p>X Malattie croniche (renali, infiammatorie, neurologiche, epatiche, muscolo scheletriche)</p> <p>X Inadeguatezza delle fonti energetiche (per obesità, dieta inadeguata, malnutrizione)</p> <p>Trattamenti</p> <p>X Aumento del fabbisogno metabolico (per tumore maligno, intervento chirurgico, indagini diagnostiche, orario e frequenza trattamenti)</p>	

<p>X Compromissione del trasporto dell'ossigeno (per ipovolemia, prolungato riposo a letto)</p> <p>Situazionali (personali, ambientali)</p> <p>X Inattività (secondaria a depressione, mancanza di motivazione, stile di vita sedentario, insufficiente conoscenza)</p> <p>Fasi di sviluppo</p> <p>X Processo di invecchiamento con diminuzione della forza e del trofismo muscolare, comparsa di deficit sensoriali</p>

Autostima, Disturbo/Rischio di	X
<p>Fattori correlati</p> <p>Fisiopatologici</p> <p>X Variazione dell'aspetto (per perdita di parti del corpo, di una o più funzioni organiche)</p>	

Cadute, rischio	X
<p>Vedere lesione, rischio</p>	

Caregiver, tensione nel ruolo di /Rischio di	X
<p>Fattori correlati</p> <p>Fisiopatologici</p> <p>X Esigenza di assistenza continua/ complessa (per condizioni debilitanti acute/progressive, tossicodipendenza, malattia dal decorso imprevedibile, demenza progressiva, malattia mentale cronica, disabilità)</p> <p>Situazionali (personali, ambientali)</p> <p>X Durata dell'assistenza richiesta</p>	

Comunicazione, compromissione e Comunicazione verbale, compromissione	X
<p>(incapacità a pronunciare le parole ma è in grado di comprendere)</p>	
<p>Fattori correlati</p> <p>Fisiopatologici</p> <p>X Alterazione della funzionalità motoria dei muscoli del linguaggio</p> <p>X Compromissione della capacità di produrre il linguaggio (per compromissione respiratoria, dispnea, edema, infezione della laringe, deformità del cavo orale, labio/palatoschisi, malocclusione o frattura mascellare, adentulia, disartria)</p> <p>Trattamenti</p> <p>X Compromissione della capacità di produrre il linguaggio (per intubazione endotracheale, tracheotomia, tracheostomia, laringectomia, intervento chirurgico cranico, al viso, al collo, alla bocca, dolore alla bocca o faringeo, depressione cognitiva da farmaci deprimenti il SNC/anestetici)</p> <p>Situazionali (personali, ambientali)</p> <p>X Barriere psicologiche (paura, timidezza)</p> <p>X Mancanza di riservatezza</p> <p>X Barriera linguistica (non disponibilità di interprete)</p> <p>Fasi di sviluppo</p> <p>X Persona anziana (perdite uditive)</p>	

Concetto di se, disturbo del	X
<p>Fattori correlati</p> <p>Fisiopatologici</p> <p>X Variazioni dell'aspetto, dello stile di vita, di un ruolo o delle risposte altrui (per malattia cronica, dolore, trauma grave, perdita parti del corpo / funzioni organiche)</p> <p>Situazionali (personali, ambientali)</p> <p>X Immobilità o perdita di funzioni</p> <p>Fasi di sviluppo</p> <p>X Persona anziana (perdita di ruoli/responsabilità)</p>	
Confusione mentale acuta	X
<p>Fattori correlati</p> <p>Fattori di rischio</p> <p>Improvvisa insorgenza di ipossia cerebrale o disturbi del metabolismo cerebrale per</p> <p>X Squilibri idroelettrolitici (disidratazione, ipovolemia, acidosi/alcalosi, iper/ipo calcemia, ipopotassiemia, ipo/iper natremia, ipo/iper glicemia)</p> <p>X Deficit nutrizionali (folati, vitamina B12, anemia, deficit niacina, deficit magnesio)</p> <p>X Disturbi cardiovascolari (infarto miocardio, insufficienza cardiaca congestizia, aritmie, blocco cardiaco, arterite temporale) ematoma subdurale)</p> <p>X Disordini respiratori (BPCO, embolia polmonare, TBC, polmonite)</p> <p>X Disordini metabolici ed endocrini (iper/ipo tiroidismo, disfunzione ipofisaria, disturbi paratiroidei, del corticosurrene, ipotensione posturale, insufficienza epatica o renale)</p> <p>Trattamenti</p> <p>X Disturbo del metabolismo cerebrale per intervento chirurgico, intossicazione da farmaci, anestesia generale, astinenza da alcol, sedativi/ipnotici, metalli pesanti, monossido di carbonio, effetti collaterali dei farmaci (neurolettici/narcotici, anestesia generale, effetti collaterali da farmaci come diuretici, digitale, propanololo, atropina, ipoglicemizzanti, barbiturici, litio, fenintoina, acyclovir, anticolinergici, ecc)</p> <p>Situazionali (personali, ambientali)</p> <p>X Dolore, fecaloma, immobilità,</p> <p>X Depressione, situazioni non familiari</p>	
Contaminazione, rischio di (della persona, della comunità, della famiglia)	X
<p>Fattori correlati</p> <p>Fisiopatologici</p> <p>X Presenza di batteri, virus, tossine</p> <p>X Fattori nutrizionali (obesità, deficienze di vitamine e sali minerali)</p> <p>X Stati patologici pre-esistenti</p>	
Coping inadeguato della famiglia	X
<p>Fattori correlati</p> <p>Biofisiopatologici</p> <p>X Compromissione della capacità di esercitare la responsabilità di ruolo per malattia acuta/cronica</p>	

<p>Cura di sé, deficit (alimentazione) Incapacità di (specificare): <input checked="" type="checkbox"/> tagliare gli alimenti e/o aprire le confezioni <input checked="" type="checkbox"/> portare il cibo alla bocca</p>	X
<p>Fattori correlati Fisiopatologici <input checked="" type="checkbox"/> Stato comatoso <input checked="" type="checkbox"/> Disturbi visivi Trattamenti <input checked="" type="checkbox"/> Uso di dispositivi esterni (apparecchio gessato, tutori ortopedici, infusione endovenosa...) Situazionali (personali, ambientali) <input checked="" type="checkbox"/> Deficit cognitivi <input checked="" type="checkbox"/> Dolore <input checked="" type="checkbox"/> Affaticamento <input checked="" type="checkbox"/> Confusione mentale Fasi di sviluppo <input checked="" type="checkbox"/> Diminuita capacità motoria e visiva o a debolezza muscolare</p>	
<p>Cura di sé, deficit (bagno/igiene personale) Ridotta e/o incapacità di (specificare): <input checked="" type="checkbox"/> lavare il proprio corpo o parti <input checked="" type="checkbox"/> procurarsi l'acqua <input checked="" type="checkbox"/> regolare la temperatura o il flusso dell'acqua <input checked="" type="checkbox"/> percepire il bisogno di cure igieniche</p>	X
<p>Fattori correlati Fisiopatologici <input checked="" type="checkbox"/> Stato comatoso <input checked="" type="checkbox"/> Disturbi visivi Trattamenti <input checked="" type="checkbox"/> Uso di dispositivi esterni (apparecchio gessato, tutori ortopedici, infusione endovenosa...) Situazionali (personali, ambientali) <input checked="" type="checkbox"/> Deficit cognitivi <input checked="" type="checkbox"/> Dolore <input checked="" type="checkbox"/> Affaticamento <input checked="" type="checkbox"/> Confusione mentale Fasi di sviluppo <input checked="" type="checkbox"/> Diminuita capacità motoria e visiva o a debolezza muscolare</p>	
<p>Cura di sé, deficit (bagno/igiene personale) Ridotta e/o incapacità di (specificare): <input checked="" type="checkbox"/> mettersi o togliersi vestiti, allacciare i vestiti <input checked="" type="checkbox"/> curare il proprio aspetto <input checked="" type="checkbox"/> acquistare o cambiare capi di vestiario o il flusso dell'acqua <input checked="" type="checkbox"/> percepire il bisogno di cure igieniche</p>	X
<p>Fattori correlati Fisiopatologici <input checked="" type="checkbox"/> Stato comatoso <input checked="" type="checkbox"/> Disturbi visivi Trattamenti <input checked="" type="checkbox"/> Uso di dispositivi esterni (apparecchio gessato, tutori ortopedici, infusione endovenosa...) Situazionali (personali, ambientali)</p>	

<ul style="list-style-type: none"> X Deficit cognitivi X Dolore X Affaticamento X Confusione mentale <p>Fasi di sviluppo</p> <ul style="list-style-type: none"> X Diminuita capacità motoria e visiva o a debolezza muscolare 	
---	--

<p>Cura di sé, deficit (eliminazione urinaria e fecale)</p> <p>Incapacità o mancanza di volontà per (specificare):</p> <ul style="list-style-type: none"> X servirsi del gabinetto/comoda X trasferirsi sul gabinetto/comoda X eseguire pratiche igieniche adeguate X pulire il gabinetto o la comoda X sistemare gli indumenti per servirsi del gabinetto 	X
---	----------

<p>Fattori correlati</p> <p>Fisiopatologici</p> <ul style="list-style-type: none"> X Stato comatoso X Disturbi visivi <p>Trattamenti</p> <ul style="list-style-type: none"> X Uso di dispositivi esterni (apparecchio gessato, tutori ortopedici, infusione endovenosa...) <p>Situazionali (personali, ambientali)</p> <ul style="list-style-type: none"> X Deficit cognitivi X Dolore X Affaticamento X Confusione mentale <p>Fasi di sviluppo</p> <ul style="list-style-type: none"> X Diminuita capacità motoria e visiva o a debolezza muscolare 	
--	--

<p>Cura di sé, deficit (strumentale)</p> <p>Difficoltà a (specificare)</p> <ul style="list-style-type: none"> X assumere i farmaci 	X
---	----------

<p>Fattori correlati</p> <p>Fisiopatologici</p> <ul style="list-style-type: none"> X Stato comatoso X Disturbi visivi <p>Trattamenti</p> <ul style="list-style-type: none"> X Uso di dispositivi esterni (apparecchio gessato, tutori ortopedici, infusione endovenosa...) <p>Situazionali (personali, ambientali)</p> <ul style="list-style-type: none"> X Deficit cognitivi X Dolore X Affaticamento X Confusione mentale <p>Fasi di sviluppo</p> <ul style="list-style-type: none"> X Diminuita capacità motoria e visiva o a debolezza muscolare 	
--	--

<p>Deambulazione, compromissione, rischio</p> <p>Vedere mobilità, compromissione, rischio</p>	X
---	----------



Deglutizione, compromissione	X
<p>Fattori correlati</p> <p>Fisiopatologici</p> <ul style="list-style-type: none"> X Diminuzione/assenza del riflesso faringeo, difficoltà di masticazione e riduzione della sensibilità (per paralisi cerebrale, miastenia grave, botulismo, M.di Parkinson, tumore cerebrale, danno cerebrale, distrofia muscolare, S. di Guillain Barrè, poliomielite, SLA, ictus cerebrale, danno nervi cranici) X Tumore / edema tracheo-esofageo X Irritazione della cavità orofaringea X Diminuzione della salivazione <p>Trattamenti</p> <ul style="list-style-type: none"> X Ostruzione meccanica secondaria a cannula tracheostomica <p>Situazionali (personali, ambientali)</p> <ul style="list-style-type: none"> X Alterazione del livello di coscienza X Fatigue <p>Fasi di sviluppo</p> <ul style="list-style-type: none"> X Persona anziana: riduzione della salivazione o del gusto 	
Dolore acuto (Grave fastidio o disagio che dura da 0 a 6 mesi)	X
<p>Fattori correlati</p> <p>Fisiopatologici</p> <p>Trauma tissutale e spasmi muscolari riflessi secondari a</p> <ul style="list-style-type: none"> X Cancro <p>Situazionali (personali, ambientali)</p> <ul style="list-style-type: none"> X Febbre X Immobilità/posizionamento inappropriato X Ansia grave e repressa 	
Dolore cronico (Continuo/ intermittente che dura da più di 6 mesi)	X
<p>Fattori correlati</p> <p>Situazionali (personali, ambientali)</p> <ul style="list-style-type: none"> X Febbre X Immobilità/posizionamento inappropriato 	



Eliminazione urinaria compromessa	X
<p>Per Incontinenza urinaria (specificare):</p> <ul style="list-style-type: none"> <input checked="" type="checkbox"/> Totale (continua, senza presenza di distensione della vescica e/o ritenzione di urine) <input checked="" type="checkbox"/> Da sforzo (perdita involontaria di urine per aumento della pressione addominale) <input checked="" type="checkbox"/> Da urgenza (perdita involontaria di urine per urgenza minzionale) <input checked="" type="checkbox"/> Funzionale (per incapacità di raggiungere in tempo il gabinetto) <input checked="" type="checkbox"/> Riflessa (senza sensazione di pienezza vescicale o urgenza minzionale) <input checked="" type="checkbox"/> Da rigurgito (presenza di distensione della vescica e/o ritenzione di urine) 	

<p>Fattori correlati</p> <p>Fisiopatologici</p> <ul style="list-style-type: none"> <input checked="" type="checkbox"/> Diminuita capacità vescicale/irritazione vescicale (per infezione, glicosuria, carcinoma, uretrite, trauma) <input checked="" type="checkbox"/> Diminuzione dei segnali vescicali o del loro riconoscimento (per infezioni/tumori/lesioni midollo spinale, neuropatia alcolica e/o diabetica, malattie demielinizzanti, ictus cerebrale, parkinsonismo, sclerosi multipla, farmaci alfa adrenergici) 	
--	--

Fatigue	X
----------------	----------

<p>Fattori correlati</p> <p>Fisiopatologici</p> <ul style="list-style-type: none"> <input checked="" type="checkbox"/> Stato ipermetabolico (per malattie virali, febbre, gravidanza) <input checked="" type="checkbox"/> Inadeguata ossigenazione tissutale (per BPCO, insufficienza cardiaca, anemia, malattia vascolare periferica) <input checked="" type="checkbox"/> Alterazioni biochimiche (per malattie endocrine e metaboliche come diabete mellito, ipotiroidismo, malattie ipofisarie, AIDS, M Addison, cirrosi epatica, insufficienza renale) <input checked="" type="checkbox"/> Deficit nutrizionali o alterazioni del metabolismo dei nutrienti (per nausea, vomito, diarrea, effetti collaterali dei farmaci, intervento chirurgico allo stomaco, diabete mellito) <input checked="" type="checkbox"/> Processo infiammatorio cronico (per AIDS, artrite, Lupus eritematoso, epatite, Cirrosi Epatica, malattia infiammatoria intestinale, insufficienza renale) <p>Situazionali (personali, ambientali)</p> <ul style="list-style-type: none"> <input checked="" type="checkbox"/> Diminuzione prolungata dell'attività (per ansia, febbre, diarrea, dolore, isolamento sociale, nausea/vomito, depressione, obesità) 	
--	--

Immagine corporea, Disturbo/Rischio di	X
---	----------

<p>Fattori correlati</p> <p>Situazionali (personali, ambientali)</p> <ul style="list-style-type: none"> <input checked="" type="checkbox"/> Effetti sull'aspetto di obesità, immobilità, gravidanza (specificare) 	
---	--

Immobilizzazione, sindrome da	X
--------------------------------------	----------

<p>Fattori correlati</p> <p>Fisiopatologici</p> <ul style="list-style-type: none"> <input checked="" type="checkbox"/> Riduzione del sensorio <input checked="" type="checkbox"/> Stato di incoscienza <p>Trattamenti</p> <ul style="list-style-type: none"> <input checked="" type="checkbox"/> Ventilazione meccanica <input checked="" type="checkbox"/> Linee venose <input checked="" type="checkbox"/> Immobilità prescritta <p>Situazionali (personali, ambientali)</p> <ul style="list-style-type: none"> <input checked="" type="checkbox"/> Depressione <input checked="" type="checkbox"/> Fatigue <input checked="" type="checkbox"/> Stato di debilitazione 	
---	--

<p>X Dolore</p> <p>Fasi di sviluppo</p> <p>X Persona anziana: ridotta agilità motoria, debolezza muscolare, demenza presenile</p>	
Incontinenza fecale	X
<p>Fattori correlati</p> <p>Fisiopatologici</p> <p>X Compromissione delle funzioni cognitive</p> <p>X Iperdistensione rettale per stipsi cronica</p> <p>X Trattamenti</p> <p>Situazionali (personali, ambientali)</p> <p>X Incapacità di riconoscere, interpretare o rispondere ai segnali intestinali (per depressione, compromissione delle funzioni cognitive)</p>	
Incontinenza urinaria funzionale	X
<p>Fattori correlati</p> <p>Fisiopatologici</p> <p>X Diminuzione di stimoli vescicali/compromessa capacità di riconoscerli per trauma, infezione, tumore cerebrale, parkinsonismo, sclerosi multipla, neuropatia alcolica, malattie demielinizzanti, ictus cerebrale, demenza progressiva</p> <p>Situazionali (personali, ambientali)</p> <p>X Compromissione della mobilità</p> <p>X Diminuita attenzione nei confronti degli stimoli vescicali per depressione, soppressione intenzionale, confusione mentale</p> <p>Fasi di sviluppo</p> <p>X Persona anziana: perdite motorie/sensitive</p>	
Incontinenza urinaria totale (compromessa eliminazione urinaria)	X
<p>Fattori correlati</p> <p>Trattamenti</p> <p>X Riduzione del tono muscolare per per anestesia generale o spinale, terapia farmacologica e iatrogenesi (farmaci miorilassanti, anestetici, diuretici, antistaminici, anticolinergici, immunodepressori, adrenalina, ansiolitici)</p> <p>Situazionali (personali, ambientali)</p> <p>X Compromissione della mobilità</p> <p>X Diminuita attenzione nei confronti degli stimoli vescicali per depressione, soppressione intenzionale, confusione mentale</p> <p>Fasi di sviluppo</p> <p>X Persona anziana: perdite motorie/sensitive</p>	

Infezione, rischio di	X
<p>Fattori correlati</p> <p>Fisiopatologici</p> <p>X Compromissione delle difese dell'ospite per cancro, malattie respiratorie, ematologiche, periodontali, malattie epatiche, artrite, diabete mellito, malattie ereditarie, AIDS, alcolismo, immunosoppressione (secondaria a- specificare)</p> <p>Trattamenti</p> <p>X Sede di possibile invasione di microorganismi per intervento chirurgico, intubazione, linee invasive, nutrizione parenterale totale, dialisi, nutrizione enterale</p> <p>Situazionali (personali, ambientali)</p> <p>X Compromissione delle difese dell'ospite per malattie infettive, stress, malnutrizione, prolungata degenza in ospedale, fumo, prolungata immobilità</p> <p>X Contatto con agenti contaminanti (infezioni nosocomiali o di comunità)</p> <p>Fasi di sviluppo</p> <p>X Persona anziana: maggiore vulnerabilità per diminuzione della risposta immunitaria, condizione debilitante, malattia cronica)</p>	
Insonnia	X
<p>Fattori correlati</p> <p>Fisiopatologici</p> <p>X Compromissione del trasporto di ossigeno (per angina, disturbi circolatori/respiratori, arteriosclerosi periferica)</p> <p>X Compromissione dell'eliminazione fecale o urinaria (per diarrea, disuria, ritenzione, incontinenza, stipsi, pollacchiuria)</p> <p>X Compromissione del metabolismo (per ipertiroidismo, disturbi epatici, ulcera gastrica)</p> <p>Situazionali (personali, ambientali)</p> <p>X Eccessiva iperattività (per disturbo bipolare/ da deficit dell'attenzione, panico, uso di droghe)</p> <p>X Eccessivo dormire di giorno</p> <p>X Depressione</p> <p>X Inadeguata attività fisica durante il giorno</p> <p>X Dolore cronico</p> <p>X Risposte ansiose</p> <p>X Modifiche ambientali (specificare)</p> <p>X Paura</p>	
Integrità cutanea/tissutale: compromissione, rischio	X
Integrità mucosa orale, compromissione	X
<p>Fattori correlati</p> <p>X Inadeguata igiene orale</p> <p>X Incapacità di provvedere all'igiene orale</p>	
Ipertermia	X

Lesione, rischio di	X
<p>Fattori correlati</p> <p>Fisiopatologici</p> <ul style="list-style-type: none"> X Alterazioni delle funzioni cerebrali per ipossia (vertigini, sincope) X Alterazioni della mobilità (ictus cerebrale, artrite, parkinsonismo, perdita di un arto, compromissione della vista/udito) X Fatigue X Ipotensione ortostatica X Inadeguata consapevolezza dei rischi ambientali (confusione mentale) <p>Trattamenti</p> <ul style="list-style-type: none"> X Lungo allettamento X Gesso, stampelle, deambulatore, bastone <p>Situazionali (personali, ambientali)</p> <ul style="list-style-type: none"> X Alterata capacità di giudizio (per stress, droghe, alcol, disidratazione, depressione) X Ambiente non familiare (es. Ospedale) X Andatura instabile <p>Fasi di sviluppo</p> <ul style="list-style-type: none"> X Persona anziana: alterata capacità di giudizio (per deficit cognitivi), stile di vita sedentario, perdita di forza muscolare 	

Liquidi, eccessivo volume di	X
<p>Fattori correlati</p> <p>Fisiopatologici</p> <ul style="list-style-type: none"> X Compromissione dei meccanismi regolatori (per insufficienza renale acuta/cronica, disfunzioni endocrine, anomalie sistemiche metaboliche, lipoedema) X Ipertensione portale, diminuzione della pressione colloidale-osmotica e ritenzione di sodio (per epatopatia, cancro, cirrosi, ascite) X Anomalie venose e arteriose (vene varicose, vasculopatia periferica, Trombosi, flebite, immobilità, linfoedema, infezioni, trauma, neoplasie) <p>Trattamenti</p> <ul style="list-style-type: none"> X Ritenzione di sodio e acqua (terapia corticosteroidica) <p>Situazionali (personali, ambientali)</p> <ul style="list-style-type: none"> X Ristagno venoso declive/venostasi (per immobilità, prolungata stazione eretta/posizione seduta, gesso/fasciatura stretta) <p>Fasi di sviluppo</p> <ul style="list-style-type: none"> X Persona anziana: compromissione del ritorno venoso per aumento delle resistenze periferiche e diminuzione dell'efficienza valvolare 	

Liquidi, insufficiente volume di	X
<p>Fattori correlati</p> <p>Fisiopatologici</p> <ul style="list-style-type: none"> X Perdite (febbre, aumento del metabolismo, drenaggio accentuato, ferite, peritonite, diarrea, menorragia) <p>Situazionali (personali, ambientali)</p> <ul style="list-style-type: none"> X Vomito/nausea X Diminuita motivazione a bere (depressione, fatigue) X Nutrizione per sonda con soluzione concentrata X Difficoltà a deglutire/assumere alimenti (dolore orale, fatigue) X Perdita eccessiva (cateteri a permanenza, drenaggi) <p>Fasi di sviluppo</p> <ul style="list-style-type: none"> X Persona anziana: aumentata vulnerabilità a ridotta riserva idrica, ridotta sensazione di sete 	

Mobilità, compromissione /rischio di	X
<p>Fattori correlati</p> <p>Fisiopatologici</p> <ul style="list-style-type: none"> X riduzione della forza e della resistenza per compromissione muscoloscheletrica (fratture, malattie del tessuto connettivo, condizioni cardiache) X edemi X apparecchi esterni (gesso/splint, corsetto ortopedico, catetere venoso) X forza/resistenza insufficienti per la deambulazione (protesi, stampelle, deambulatore) <p>Situazionali (personali, ambientali)</p> <ul style="list-style-type: none"> X fatigue X obesità X dispnea X dolore <p>Fasi di sviluppo</p> <ul style="list-style-type: none"> X Persona anziana: diminuzione dell'agilità e debolezza muscolare 	
Nausea	X
<p>Fattori correlati</p> <p>Fisiopatologici</p> <ul style="list-style-type: none"> X Trauma tissutale e spasmi muscolari riflessi (per gastroenterite acuta, ulcera gastrica, sindrome colon irritabile, pancreatite, infezioni, tossoinfezioni alimentari, intossicazioni da farmaci, calcolosi renale, crampi uterini, malessere da movimento, stress) (specificare) <p>Trattamenti</p> <ul style="list-style-type: none"> X Effetti della chemioterapia e/o farmaci 	
Nutrizione inferiore al fabbisogno, rischio di	X
<p>Fattori correlati</p> <p>Fisiopatologici</p> <ul style="list-style-type: none"> X Aumentato fabbisogno calorico e difficoltà ad assumere sufficienti calorie (per ustione, trauma, complicanze/deformazioni gastrointestinali, cancro, alcolismo, uso di sostanze stupefacenti, infezione, AIDS) X Disfagia (per ictus cerebrale, M.di Parkinson, palatoschisi, distrofia muscolare, paralisi cerebrale, paralisi facciale, SLA, disturbi neuromuscolari) X Diminuzione dell'appetito (per alterazioni dello stato di coscienza) X Vomito, inappetenza e alterazioni della digestione (per pancreatite) X Inappetenza e compromissione del metabolismo proteico/lipidico, ipovitaminosi (per cirrosi epatica) X Inappetenza per reflusso gastroesofageo <p>Situazionali (personali, ambientali)</p> <ul style="list-style-type: none"> X Diminuzione dell'appetito (per nausea, vomito, isolamento sociale, stress, depressione, allergie) X Incapacità di masticare (per adentulia, carie, protesi non adatta) 	

Nutrizione superiore al fabbisogno	X
Fattori correlati Situazionali (personali, ambientali) X Rischio di aumento ponderale in gravidanza superiore a 12/13 Kg X Deficit di conoscenze delle basi nutrizionali Fasi di sviluppo X Adulto/persona anziana: diminuzione del modello di attività /di fabbisogno metabolico	
Respirazione, inefficace funzionalità, rischio	X
Fattori correlati Fisiopatologici X Secrezioni eccessive o dense (per infezione, infiammazione, allergia, patologie cardiopolmonari, fumo) Trattamenti X Immobilità (per effetto sedativo di farmaci, droghe o sostanze chimiche, anestesia) X Soppressione del riflesso della tosse X Effetti della tracheostomia (alterazione delle secrezioni) Situazionali (personali, ambientali) X Immobilità (per intervento chirurgico/trauma, compromissione percettiva/cognitiva, fatigue, dolore, paura, ansia)	
Soffocamento, rischio Vedere rischio di lesione	X
Stipsi	X
Fattori correlati Fisiopatologici X Riduzione del metabolismo (per ipotiroidismo, iper paratiroidismo, obesità, feocromocitoma, uremia, neuropatia diabetica, ipo pituitarismo) X Dolore alla defecazione (per emorroidi, lesione dorsale) X Diminuita peristalsi secondaria a ipossia cardiaca/polmonare Trattamenti X Uso abituale di lassativi Situazionali (personali, ambientali) X Diminuzione della peristalsi (per immobilità, gravidanza, stress, mancanza di esercizio fisico) X Modello di evacuazione irregolare X Mancanza di riservatezza X Dieta priva di scorie, assunzione di liquidi inadeguata X Paura di dolore rettale o cardiaco	
Trasloco, stress da	X
Fattori correlati Fasi di sviluppo X Persona anziana: necessità della vicinanza dei familiari per l'assistenza, ammissione in struttura di assistenza	



Altre Diagnosi Infermieristiche prevalentemente trattate

Indicare eventuali diagnosi infermieristiche e fattori correlati non incluse nell'elenco
(riferimenti bibliografici: L.J.Carpenito-Diagnosi infermieristiche - 5th. ed. C.E.A. Edizioni, 2010)

Compromissione della comunicazione verbale, correlata al posizionamento di ventilatore meccanico.

Rischio di lesione della cute, correlato al posizionamento di ventilatore meccanico.

Rischio di disturbo di percezione sensoriale, correlato a eccesso di stimoli ambientali e diminuzione di stimoli significativi secondari al trattamento in NIV.

Paura, correlata a natura della situazione e prognosi incerta circa la dipendenza dal ventilatore.

Senso di impotenza, correlato a dipendenza dal respiratore, incapacità di parlare e perdita della mobilità

Rischio di risposta disfunzionale allo svezzamento dal ventilatore, correlato a tentativi di svezzamento insoddisfacenti, affaticamento dei muscoli della respirazione, maggior lavoro respiratorio.

Allegato 3
PROBLEMI COLLABORATIVI PRELEVALEMENTE TRATTATI

Selezionare (X) le caselle relative ai problemi collaborativi di interesse

(riferimenti bibliografici: L.J.Carpenito-Diagnosi infermieristiche - 5th. ed. C.E.A. Edizioni, 2010)

Rischio di complicanze (RC) per disfunzione cardiaca/ vascolare	
RC per emorragia	X
RC per aritmie	X
RC per edema polmonare	X
RC per trombosi venosa profonda	X
RC per ipovolemia	X
RC per embolia polmonare	X
Rischio di complicanze (RC) per disfunzione respiratoria	
RC per ipossiemia	X
RC per atelectasia/polmonite	X
RC per costrizione tracheobronchiale	X
RC per pneumotorace	X
Rischio di complicanze (RC) per disfunzione metabolica/immunitaria/ematopoietica	
RC per ipo/iperglicemia	X
RC per squilibri elettrolitici	X
RC per sepsi	X
RC per acidosi (metabolica, respiratoria)	X
RC per alcalosi (metabolica, respiratoria)	X
RC per infezioni opportunistiche	X
Rischio di complicanze (RC) per disfunzione renale / urinaria	
RC per ritenzione urinaria acuta	X
RC per insufficienza renale	X
Rischio di complicanze (RC) per disfunzione neurologica / sensoriale	
RC per astinenza da alcol	X
Rischio di complicanze (RC) per disfunzione gastrointestinale / epatica / biliare	
RC per sanguinamento gastrointestinale	X
RC per disfunzione epatica	X
Rischio di complicanze (RC) per effetti avversi (EA) della terapia farmacologica	
RC per effetti avversi della terapia con farmaci anticoagulanti	X
RC per effetti avversi della terapia con farmaci adrenocorticosteroidi	X
RC per effetti avversi della terapia con farmaci antiaritmici	X

Allegato 4

APPRENDIMENTO OFFERTO

In relazione alle diagnosi infermieristiche / problemi collaborativi sopra indicati, descrivere le opportunità formative per lo studente che caratterizzano la sede di apprendimento.
Esempio: interventi assistenziali infermieristici, modelli organizzativi e/o di presa in carico assistenziale, attività di ricerca e innovazione.

- modello organizzativo con suddivisione in miniequipe
- attività di posizionamento di accessi venosi eco guidati e di midline
- briefing quotidiano con i medici per discutere delle condizioni delle persone assistite
- utilizzo di NIV (Non Invasive Ventilation)