

OFFERTA FORMATIVA DELLA SEDE DI TIROCINIO

Contesto	
<p>Tutor clinico Contatti e riferimenti</p>	<p>Nome ALESSANDRA Cognome FRINGUELLINO Telefono 3386247281 e-mail: a.fringuellino@ascittaditorino.it</p>
<p>Struttura/servizio Nominativo, ubicazione, ecc N°locali, n° posti letto, Orari apertura al pubblico, Orari di lavoro, Figure professionali Risorse strumentali Servizi agli studenti (mensa, biblioteca, accesso internet, ecc)</p> <p>Contatti e riferimenti</p>	<p>Casa della Salute dei Bambini e dei Ragazzi: 1 sala accoglienza, 4 ambulatori multidisciplinari, 1 ambulatorio infermieristico, 1 sala corsi, locali del centro di Riabilitazione Neuromotoria. Apertura: lunedì e venerdì dalle 8 alle 17. Figure professionali: 3 infermiere, 1 infermiera pediatrica, 1 assistente sanitaria, 1 tecnico di audiometria, medici specialisti, 1 amministrativa Servizi agli studenti: possibilità di accedere ad internet, alla documentazione del servizio (protocolli, procedure, cartelle, etc).</p> <p>Indirizzo via Gorizia 112/a Telefono 01170953621 e-mail cds.bambini@ascittaditorino.it</p>
<p>Come raggiungere il servizio Mappa percorso Mezzi pubblici</p>	<p>Il poliambulatorio è raggiungibile dalle linee bus: 17, 5, 55, 58, 58/, 62 La Casa del Bambino si trova al fondo del parcheggio sulla sinistra.</p>

Allegato 1
Problemi di salute / Problemi clinici / Percorso diagnostico terapeutici prevalentemente trattati

Selezionare (X) i problemi di salute prevalenti e indicare le patologie più frequenti

Disabilità, malattie ad alto grado di tutela **X**

Autismo, sindromi genetiche, disturbi del neuro sviluppo, malattie neuromuscolari

Malattie Endocrinologiche, metaboliche **X**

Obesità, diabete, sindrome dell'ovaio policistico

Malattie Infettive **X**

Malattie diffusibili in comunità infantili e scolastiche

Malattie Osteoarticolari **X**

Displasia congenita dell'anca

Salute degli Immigrati/immigrate **X**

Screening vaccinazioni

Salute in area Materno / infantile **X**

Salute della bambina prepubere, alterazioni mobilità e dolore di origine posturale

Altro (specificare) **X**

Disturbi dell'udito, chirurgia plastica della mano

Allegato 2

Diagnosi Infermieristiche prevalentemente trattate

Selezionare (X) le caselle relative alle Diagnosi Infermieristiche e ai fattori correlati di interesse
(riferimenti bibliografici: L.J.Carpenito-Diagnosi infermieristiche – 6th. ed. C.E.A. Edizioni, 2015)

Ansia	X
<p>Fattori correlati</p> <p>Situazionali (personali, ambientali)</p> <ul style="list-style-type: none"> X Minaccia reale o percepita al concetto di sé (fallimento, modificazione dello status, mancato riconoscimento da parte degli altri) X Minaccia reale o percepita all'integrità biologica (per malattia, violenza, procedure invasive, stato terminale) <p>Fasi di sviluppo</p> <ul style="list-style-type: none"> X Neonato/bambino: separazione, ambiente e persone sconosciuti, variazioni dei rapporti con coetanei X Adolescente: minaccia del concetto di se correlato a sviluppo sessuale o alterazioni corporee, variazione dei rapporti con coetanei 	
Attaccamento genitore-bambino, compromesso /rischio di	X
<p>Fattori correlati</p> <p>Fisiopatologici</p> <p>Interruzione del processo di attaccamento per:</p> <ul style="list-style-type: none"> X Malattia del genitore/del bambino <p>Situazionali (personali, ambientali)</p> <ul style="list-style-type: none"> X Aspettative non realistiche (nei confronti del bambino, di se stessi) X Delusione nei confronti del bambino (es. per il sesso, per l'aspetto) X Fattori stressanti associati alla nascita del bambino e ad altre responsabilità (problemi di salute, difficoltà nelle relazioni, difficoltà economiche) 	
Autostima, Disturbo/Rischio di	X
<p>Fattori correlati</p> <p>Fisiopatologici</p> <ul style="list-style-type: none"> X Variazione dell'aspetto (per perdita di parti del corpo, di una o più funzioni organiche) X Squilibri biochimici, neurofisiologici <p>Situazionali (personali, ambientali)</p> <ul style="list-style-type: none"> X Bisogno di dipendenza non soddisfatto X Senso di fallimento (problemi economici, aumento/diminuzione del peso, problemi relazionali) X Aggressione subita personalmente o di altra persona della stessa età/comunità X Insuccesso scolastico X Relazione inefficace con i propri genitori X Relazioni abusive X Aspettative irrealistiche verso di se o verso i propri genitori/figli X Storia di numerosi insuccesso 	

Fasi di sviluppo

- X Neonato/bambino in età prescolare: mancanza di stimoli e vicinanza emotiva, separazione dai genitori/altre persone significative, valutazione costantemente negativa da parte dei genitori, inadeguato sostegno da parte dei genitori, incapacità di fidarsi di altre persone
- X Età scolare: insuccesso scolastico, perdita del gruppo dei coetanei, ripetuti feedback negativi
- X Adolescente: perdita di autonomia/indipendenza, rottura di relazioni con coetanei/amici, problemi scolastici, perdita di altre persona significative

Cadute, rischio

Vedere lesione, rischio

X

Caregiver, tensione nel ruolo di /Rischio di

X

Fattori correlati

Fisiopatologici

- X Esigenza di assistenza continua/ complessa (per condizioni debilitanti acute/progressive, malattia dal decorso imprevedibile, disabilità)

Situazionali (personali, ambientali)

- X Modello di coping inefficace
- X Relazioni inadeguate o disfunzioni familiari
- X Durata dell'assistenza richiesta
- X Isolamento
- X Pause di riposo/svago insufficienti o
- X Risorse economiche insufficienti
- X Assenza o non disponibilità di sostegno

Fasi di sviluppo

- X Esigenza di assistenza continua secondaria a disabilità mentali o disabilità fisiche

Comunicazione, compromissione e

Comunicazione verbale, compromissione

(incapacità a pronunciare le parole ma è in grado di comprendere)

X

Fattori correlati

Fisiopatologici

- X Alterazione della funzionalità motoria dei muscoli del linguaggio
- X Ischemia del lobo frontale temporale (per ictus cerebrale, trauma orale o facciale, danno cerebrale congenito, trauma cranico, depressione del SNC, ipertensione endocranica, tumore della testa/collo/midollo spinale, ipossia cronica, riduzione della circolazione cerebrale.
- X Patologia del sistema nervoso (es miastenia grave, distrofia muscolare)
- X Paralisi delle corde vocali, tetraplegia
- X Compromissione della capacità di produrre il linguaggio (per compromissione respiratoria, dispnea, edema, infezione della laringe, deformità del cavo orale, labio/palatoschisi, mal occlusione o frattura mascellare, disartria)

Trattamenti

- X Compromissione della capacità di produrre il linguaggio (tracheotomia, tracheostomia, laringectomia)



Situazionali (personali, ambientali)

- X Diminuita attenzione (per affaticamento, collera, ansia, o dolore)
- X Mancata disponibilità di apparecchio acustico o suo malfunzionamento
- X Barriere psicologiche (paura, timidezza)
- X Mancanza di riservatezza
- X Barriera linguistica (non disponibilità di interprete)

Fasi di sviluppo

- X Bambino (inadeguata stimolazione sensoriale)
- X Compromissione cognitiva

Contaminazione, rischio di (della persona, della comunità, della famiglia)

X

Fattori correlati

Fisiopatologici

- X Presenza di batteri, virus, tossine, parassiti

Trattamenti

- X Vaccinazioni recenti
- X Insufficiente o nessun uso di del protocollo di decontaminazione
- X Indumenti protettivi inappropriati o non utilizzati

Situazionali (personali, ambientali)

- X Fattori sociali: sovraffollamento carenza servizi igienici, povertà, inadeguate pratiche di igiene personale o della casa, mancato accesso all'assistenza sanitaria
- X Fattori biologici: presenza di vettori (zanzare, zecche, roditori)
- X Pratiche dietetiche

Fasi di sviluppo

- X Caratteristiche evolutive dei bambini
- X Bambini di età inferiore a 5 anni

Coping inadeguato della famiglia

X

Fattori correlati

Fisiopatologici

- X Compromissione della capacità di esercitare la responsabilità di ruolo per malattia acuta/cronica

Situazionali (personali, ambientali)

- X Compromissione della capacità di gestire in modo costruttivo gli agenti stressanti (per scarsa autostima, storia di relazioni inefficaci con i propri genitori, modelli di ruolo negativi, storia di relazioni abusive)
- X Aspettative non realistiche dei genitori nei confronti di se stessi/dei figli
- X Aspettative non realistiche dei figli nei confronti di se stessi/dei genitori
- X Bisogni psicosociali non soddisfatti dai genitori / dai figli

Coping inefficace	X
Fattori correlati	
Fisiopatologici	
<input checked="" type="checkbox"/> Cronicità della condizione, variazioni biochimiche dell'encefalo (disordine della personalità, disordine bipolare, schizofrenia, disordine da scarsa attenzione)	
<input checked="" type="checkbox"/> Complessità del regime di autocura, variazioni neurologiche	
<input checked="" type="checkbox"/> Alterazione dell'integrità corporea (perdita di una parte del corpo, deturpazione)	
<input checked="" type="checkbox"/> Alterazione dello stato d'animo (per reazioni organiche, tumore cerebrale, assunzione di sostanze, reazioni organiche, ritardo mentale)	
Situazionali (personali, ambientali)	
<input checked="" type="checkbox"/> Scarso controllo degli impulsi e bassa tolleranza alla frustrazione	
<input checked="" type="checkbox"/> Criticità delle relazioni con genitori/caregiver	
<input checked="" type="checkbox"/> Disorganizzazione del sistema familiare	
<input checked="" type="checkbox"/> Inefficace capacità di problem solving	
<input checked="" type="checkbox"/> Aumento del consumo di cibo per reazione allo stress	
<input checked="" type="checkbox"/> Rottura legami affettivi (morte, separazione, adozione/affidamento)	
<input checked="" type="checkbox"/> Sostegno insoddisfacente, sovraccarico sensoriale (ambiente, affollamento, inquinamento acustico, attività eccessiva, tecnologie)	
<input checked="" type="checkbox"/> Inadeguate risorse psicologiche (per scarsa autostima, considerazione di se negativa, senso di impotenza, mancanza di motivazione per reagire, modelli di ruolo negativi)	
Fasi di sviluppo	
<input checked="" type="checkbox"/> Bambino/adolescente: inadeguato controllo degli impulsi, panico, rifiuto da parte dei coetanei, abuso di sostanze da parte dei genitori, metodi disciplinari incoerenti, trauma infantile, rifiuto dei genitori, paura di insuccessi)	
<input checked="" type="checkbox"/> Adolescente: modificazioni fisiche ed emozionali, relazioni sessuali, consapevolezza sessuale, scelte di carriera, indipendenza dalla famiglia, impegni scolastici.	

Cura di sé, deficit (alimentazione)	X
Incapacità di (specificare):	
<input checked="" type="checkbox"/> tagliare gli alimenti e/o aprire le confezioni	
<input checked="" type="checkbox"/> portare il cibo alla bocca	
Fattori correlati	
Fisiopatologici	
<input checked="" type="checkbox"/> Mancanza di coordinazione motoria per (specificare)	
<input checked="" type="checkbox"/> Spasticità o flaccidità per (specificare)	
<input checked="" type="checkbox"/> Debolezza muscolare per (specificare)	
<input checked="" type="checkbox"/> Paralisi per (specificare)	
<input checked="" type="checkbox"/> Atrofia per (specificare)	
<input checked="" type="checkbox"/> Contratture muscolari per (specificare)	
<input checked="" type="checkbox"/> Disturbi visivi	
<input checked="" type="checkbox"/> Arti non funzionanti o mancanti	
<input checked="" type="checkbox"/> Regressione a un precedente stadio di sviluppo	
<input checked="" type="checkbox"/> Comportamenti ritualistici	
<input checked="" type="checkbox"/> Deficit somatici	

Trattamenti

X Uso di dispositivi esterni (apparecchio gessato, tutori ortopedici)

Situazionali (personali, ambientali)

X Deficit cognitivi

X Dolore

X Scarsa motivazione

X Affaticamento

X Confusione mentale

X Ansia che paralizza

Fasi di sviluppo

X Bambino: diminuita capacità motoria e visiva o a debolezza muscolare

Cura di sé, deficit (bagno/igiene personale)

Ridotta e/o incapacità di (specificare):

X lavare il proprio corpo o parti

X procurarsi l'acqua

X regolare la temperatura o il flusso dell'acqua

X percepire il bisogno di cure igieniche

X

Fattori correlati

Fisiopatologici

X Mancanza di coordinazione motoria per (specificare)

X Spasticità o flaccidità per (specificare)

X Debolezza muscolare per (specificare)

X Paralisi per (specificare)

X Atrofia per (specificare)

X Contratture muscolari per (specificare)

X Disturbi visivi

X Arti non funzionanti o mancanti

X Regressione a un precedente stadio di sviluppo

X Comportamenti ritualistici

X Deficit somatici

Trattamenti

X Uso di dispositivi esterni (apparecchio gessato, tutori ortopedici)

Situazionali (personali, ambientali)

X Deficit cognitivi

X Dolore

X Scarsa motivazione

X Affaticamento

X Confusione mentale

X Ansia che paralizza

Fasi di sviluppo

X Bambino: diminuita capacità motoria e visiva o a debolezza muscolare

Cura di sé, deficit (bagno/igiene personale) Ridotta e/o incapacità di (specificare): <input checked="" type="checkbox"/> mettersi o togliersi vestiti, allacciare i vestiti <input checked="" type="checkbox"/> curare il proprio aspetto <input checked="" type="checkbox"/> acquistare o cambiare capi di vestiario <input checked="" type="checkbox"/> o il flusso dell'acqua <input checked="" type="checkbox"/> percepire il bisogno di cure igieniche	X
Fattori correlati <input checked="" type="checkbox"/> Mancanza di coordinazione motoria per (specificare) <input checked="" type="checkbox"/> Spasticità o flaccidità per (specificare) <input checked="" type="checkbox"/> Debolezza muscolare per (specificare) <input checked="" type="checkbox"/> Paralisi per (specificare) <input checked="" type="checkbox"/> Atrofia per (specificare) <input checked="" type="checkbox"/> Contratture muscolari per (specificare) <input checked="" type="checkbox"/> Disturbi visivi <input checked="" type="checkbox"/> Arti non funzionanti o mancanti <input checked="" type="checkbox"/> Regressione a un precedente stadio di sviluppo <input checked="" type="checkbox"/> Comportamenti ritualistici <input checked="" type="checkbox"/> Deficit somatici Trattamenti <input checked="" type="checkbox"/> Uso di dispositivi esterni (apparecchio gessato, tutori ortopedici,) Situazionali (personali, ambientali) <input checked="" type="checkbox"/> Deficit cognitivi <input checked="" type="checkbox"/> Dolore <input checked="" type="checkbox"/> Scarsa motivazione <input checked="" type="checkbox"/> Affaticamento <input checked="" type="checkbox"/> Confusione mentale <input checked="" type="checkbox"/> Ansia che paralizza Fasi di sviluppo <input checked="" type="checkbox"/> Bambino: diminuita capacità motoria e visiva o a debolezza muscolare	
Cura di sé, deficit (eliminazione urinaria e fecale) Incapacità o mancanza di volontà per (specificare): <input checked="" type="checkbox"/> servirsi del gabinetto/comoda <input checked="" type="checkbox"/> trasferirsi sul gabinetto/comoda <input checked="" type="checkbox"/> eseguire pratiche igieniche adeguate <input checked="" type="checkbox"/> pulire il gabinetto o la comoda <input checked="" type="checkbox"/> sistemare gli indumenti per servirsi del gabinetto	X
Fattori correlati Fisiopatologici <input checked="" type="checkbox"/> Mancanza di coordinazione motoria per (specificare) <input checked="" type="checkbox"/> Spasticità o flaccidità per (specificare) <input checked="" type="checkbox"/> Debolezza muscolare per (specificare) <input checked="" type="checkbox"/> Paralisi per (specificare) <input checked="" type="checkbox"/> Atrofia per (specificare) <input checked="" type="checkbox"/> Contratture muscolari per (specificare) <input checked="" type="checkbox"/> Disturbi visivi <input checked="" type="checkbox"/> Arti non funzionanti o mancanti	



- X Regressione a un precedente stadio di sviluppo
- X Comportamenti ritualistici
- X Deficit somatici

Trattamenti

- X Uso di dispositivi esterni (apparecchio gessato, tutori ortopedici, infusione endovenosa...)

Situazionali (personali, ambientali)

- X Deficit cognitivi
- X Dolore
- X Scarsa motivazione
- X Affaticamento
- X Confusione mentale
- X Ansia che paralizza

Fasi di sviluppo

- X Bambino: diminuita capacità motoria e visiva o a debolezza muscolare

**Deambulazione, compromissione, rischio
Vedere mobilità, compromissione, rischio**

X

Deglutizione, compromissione

X

Fattori correlati

Fisiopatologici

- X Diminuzione/assenza del riflesso faringeo, difficoltà di masticazione e riduzione della sensibilità (per paralisi cerebrale, miastenia grave, tumore cerebrale, danno cerebrale, distrofia muscolare, S. di Guillain Barrè, poliomielite, SLA, ictus cerebrale, danno nervi cranici)
- X Tumore / edema tracheo-esofageo
- X Irritazione della cavità orofaringea
- X Diminuzione della salivazione

Situazionali (personali, ambientali)

- X Alterazione del livello di coscienza
- X Fatigue

Fasi di sviluppo

- X Bambino: diminuzione della sensibilità e difficoltà di masticazione, scarsa coordinazione tra suzione/deglutizione/respirazione

Dolore acuto (Grave fastidio o disagio che dura da 0 a 6 mesi)

X

Fattori correlati

Fisiopatologici

Trauma tissutale e spasmi muscolari riflessi secondari a

- X Disordini muscolo scheletrici (fratture, artrite, contrattura muscolare, spasmi, patologia a carico del midollo spinale)
- X Infiammazione di nervi, tendini, capsula articolare, articolazioni, muscoli, strutture articolari.

Trattamenti

- X Trauma tissutale e spasmi muscolari riflessi (medicazione di lesioni cutanee/ustione, venipuntura/iniezione IM)

Situazionali (personali, ambientali)

- X Punti di pressione (es. ingessatura o bendaggio stretti)
- X Risposta allergica
- X Irritanti chimici
- X Bisogno di dipendenza non soddisfatto
- X Ansia grave e repressa

Fasi di sviluppo

Trauma tissutale e spasmi muscolari riflessi secondari a

- X 1 anno: coliche
- X Prima infanzia: dentizione, otalgia
- X Media infanzia: dolore addominale ricorrente, dolori della crescita
- X Adolescenza: cefalea, dolore toracico, dismenorrea

Dolore cronico (Continuo/ intermittente che dura da più di 6 mesi)
X

Fattori correlati

Fisiopatologici

Trauma tissutale e spasmi muscolari riflessi secondari a

- X Disordini muscolo scheletrici (fratture, artrite, contrattura muscolare, spasmi, patologia a carico del midollo spinale)
- X Infiammazione di nervi, tendini, capsula articolare, articolazioni, muscoli, strutture articolari.

Situazionali (personali, ambientali)

- X Immobilità/posizionamento inappropriato
- X Punti di pressione (es. tutori)
- X Risposta allergica

Eminegligenza
X

Fattori correlati

Fisiopatologici

- X Alterazione delle capacità percettive secondaria ictus cerebrale, tumore cerebrale, lesione/trauma cranico, aneurisma cerebrale

Immagine corporea, Disturbo/Rischio di
X

Fattori correlati

Fisiopatologici

- X Variazioni dell'aspetto per malattia cronica, trauma grave, perdita di una parte del corpo, perdita di una funzione organica.

Situazionali (personali, ambientali)

- X Trauma fisico secondario a abuso sessuale, stupro, aggressione (specificare)
- X Effetti sull'aspetto di obesità, immobilità, gravidanza (specificare)

Infezione, rischio di	X
Fattori correlati Fisiopatologici <ul style="list-style-type: none"> X Compromissione delle difese dell'ospite per cancro, malattie respiratorie, ematologiche, periodontali, malattie epatiche, artrite, diabete mellito, malattie ereditarie, AIDS, immunosoppressione (secondaria a- specificare) X Compromissione della circolazione per linfedema, obesità, malattia vascolare periferica Trattamenti <ul style="list-style-type: none"> X Sede di possibile invasione di microorganismi per intervento chirurgico, tracheostoma, nutrizione enterale tramite PEG X Compromissione delle difese dell'ospite per terapia farmacologica (specificare) Situazionali (personali, ambientali) <ul style="list-style-type: none"> X Compromissione delle difese dell'ospite per malattie infettive, stress, malnutrizione, prolungata immobilità X Possibile sede di invasione di microorganismi per trauma accidentale/intenzionale, periodo postpartum, morso di insetto/animale/umano, lesione termica, ambiente caldo/umido/buio (apparecchio gessato, pieghe cutanee) X Contatto con agenti contaminanti (infezioni nosocomiali o di comunità) Fasi di sviluppo <ul style="list-style-type: none"> X Neonato: maggiore vulnerabilità del neonato per madre HIV positiva, carenza di anticorpi materni, flora normale insufficiente, ferite aperte (ombelicale, circoncisione), sistema immunitario immaturo X Bambino-adolescente: maggiore vulnerabilità per perdita dell'immunizzazione, molteplici partner sessuali 	
Integrità cutanea/tissutale: compromissione, rischio	X
Fattori correlati Fisiopatologici <ul style="list-style-type: none"> X Infiammazioni delle giunzioni dermo-epidermiche (per lupus eritematoso, sclerodermia) Situazionali (personali, ambientali) <ul style="list-style-type: none"> X Immobilità/posizionamento inappropriato X Punti di pressione (es.tutori) X Risposta allergica 	



Lesione, rischio di	X
Fattori correlati	
Fisiopatologici	
X Alterazioni delle funzioni cerebrali per ipossia (vertigini, sincope)	
X Alterazioni della mobilità (ictus cerebrale, artrite, perdita di un arto, compromissione della vita/udito)	
X Ipotensione ortostatica	
X Disturbi vestibolari	
X Inadeguata consapevolezza dei rischi ambientali (confusione mentale,..)	
X Movimenti tonico-clonici (convulsioni)	
Trattamenti	
X Effetti sulla mobilità/sensorio (sedativi, miorilassanti...specificare)	
X Gesso, stampelle, deambulatore.	
Situazionali (personali, ambientali)	
X Alterata capacità di giudizio (per stress, droghe, alcol, disidratazione, depressione)	
X Pericoli domestici (pavimenti sdruciolevoli, scale, illuminazione insufficiente, ingressi/corridoi non sicuri, bagno, giocattoli non sicuri, impianto elettrico difettoso, veleni conservati in modo improprio)	
X Ambiente non familiare	
X Disattenzione del caregiver	
X Uso improprio degli ausili	
X Andatura instabile	
Fasi di sviluppo	
X Bambino: inadeguata consapevolezza dei pericoli	

Liquidi, insufficiente volume di	X
Fattori correlati	
Fisiopatologici	
X Eccessiva emissione di urine (per diabete mellito insipido, diabete mellito scompensato)	
X Aumento della permeabilità capillare e evaporazione da ustioni	
X Perdite (febbre, aumento del metabolismo, ferite, peritonite, diarrea, metrorragia)	
Situazionali (personali, ambientali)	
X Vomito/nausea	
X Diminuita motivazione a bere (depressione)	
X Dieta scorretta/digiuno	
X Nutrizione per sonda con soluzione concentrata	
X Difficoltà a deglutire/assumere alimenti (dolore orale, fatigue)	
X Liquidi insufficienti in rapporto all'esercizio fisico/condizioni climatiche	
Fasi di sviluppo	
X Bambino: aumentata vulnerabilità (ridotta riserva idrica, ridotta capacità di concentrazione delle urine)	

Mobilità, compromissione /rischio di	X
<p>Fattori correlati</p> <p>Fisiopatologici</p> <ul style="list-style-type: none"> X riduzione della forza e della resistenza per compromissione neuromuscolare (malattie autoimmunitarie, del sistema nervoso, respiratorie, distrofia muscolare, paralisi parziale, tumore del SNC, trauma, ipertensione endocranica, deficit sensoriale) X riduzione della forza e della resistenza per compromissione muscoloscheletrica (fratture, malattie del tessuto connettivo, condizioni cardiache) X rigidità delle articolazioni o contratture (per malattia infiammatoria, interventi endoprotesi ortopedica articolare, malattia degenerativa delle articolazioni e del disco) X apparecchi esterni (gesso/splint, corsetto ortopedico) X forza/resistenza insufficienti per la deambulazione (protesi, stampelle, deambulatore) <p>Situazionali (personali, ambientali)</p> <ul style="list-style-type: none"> X mancanza di motivazione X dispnea X dolore <p>Fasi di sviluppo</p> <ul style="list-style-type: none"> X Bambino: alterazione dell'andatura per deficienze scheletriche congenite, displasia congenita dell'anca, osteomielite 	
Mobilità nel letto, mobilità con la sedia a rotelle, compromissione /rischio Vedere mobilità, compromissione, rischio	X
Non adesione (a indicazioni terapeutiche)	X
<p>Fattori correlati</p> <p>Fisiopatologici</p> <ul style="list-style-type: none"> X Compromessa capacità di prestazione a causa di una disabilità (scarsa memoria, deficit motori/sensitivi) X Aumento dei sintomi correlati alla malattia nonostante la precedente adesione al regime terapeutico consigliato <p>Trattamenti</p> <ul style="list-style-type: none"> X Effetti collaterali della terapia X Ambiente non terapeutico X Terapia complessa non controllata/prolungata X Costo economico della terapia X Pregresse esperienze di regime terapeutico consigliato inefficace X Processo di presa in carico impersonale (multi professionale) <p>Situazionali (personali, ambientali)</p> <ul style="list-style-type: none"> X Presenza di barriere per l'accesso (per problemi di mobilità/trasporto/economici, mancanza di assistenza per i figli, tempo inclemente) X Malattia concomitante di un membro della famiglia (mancato sostegno da parte della famiglia/amici/comunità) X Barriere alla comprensione (per deficit cognitivi/visivi/uditivi, difficoltà di memoria, ansia, ridotta attenzione, problemi motivazionali) 	

Nutrizione inferiore al fabbisogno, rischio di	X
<p>Fattori correlati</p> <p>Fisiopatologici</p> <ul style="list-style-type: none"> X Disfagia (distrofia muscolare, paralisi cerebrale, paralisi facciale, SLA, disturbi neuromuscolari) X Inappetenza per (agitazione fisica, infezioni, compromissione del metabolismo proteico/lipidico, ipovitaminosi) <p>Trattamenti</p> <ul style="list-style-type: none"> X Aumentato fabbisogno proteico/vitaminico per la cicatrizzazione di ferite e diminuita assunzione X Inadeguato assorbimento come effetto collaterale di farmaci (specificare) <p>Situazionali (personali, ambientali)</p> <ul style="list-style-type: none"> X Diminuzione dell'appetito (per nausea, vomito, isolamento sociale, stress, depressione, allergie) X Incapacità di masticare <p>Fasi di sviluppo</p> <ul style="list-style-type: none"> X Neonato/bambino: inadeguata assunzione (per carente stimolazione sensoriale, inadeguate conoscenze del care giver, scarsa produzione del latte materno) X Malassorbimento, restrizioni dietetiche, inappetenza (per morbo celiaco, fibrosi cistica, intolleranza la lattosio, malformazioni gastrointestinali, reflusso gastroesofageo, enterocolite necrotizzante) X Difficoltà di suzione/disfagia (per paralisi , labioschisi, palatoschisi) X Inadeguata suzione, astenia e dispnea (per cardiopatia congenita, iperbilirubinemia, sindrome virale, distress respiratorio, prematurità, ritardo di sviluppo) 	
Nutrizione superiore al fabbisogno	X
<p>Fattori correlati</p> <p>Fisiopatologici</p> <ul style="list-style-type: none"> X Alterato modello di sazietà (specificare) X Riduzione dei sensi di gusto/olfatto <p>Trattamenti</p> <ul style="list-style-type: none"> X Alterazione del senso di sazietà (per farmaci, radiazioni) <p>Situazionali (personali, ambientali)</p> <ul style="list-style-type: none"> X Deficit di conoscenze delle basi nutrizionali X utilizzo del cibo come compenso a carenze affettive 	
Respirazione, inefficace funzionalità, rischio	X
<p>Fattori correlati</p> <p>Fisiopatologici</p> <ul style="list-style-type: none"> X Secrezioni eccessive o dense (per infezione, infiammazione, allergia, patologie cardiopolmonari) X Immobilità stasi delle secrezioni, tosse inefficace (per malattie del SNC, fibrosi cistica, debolezza) <p>Trattamenti</p>	



X Effetti della tracheostomia (alterazione delle secrezioni)

Situazionali (personali, ambientali)

X Immobilità (per malattia neuromuscolare, retrazioni muscoloscheletriche, compromissione percettiva/cognitiva, fatigue, dolore, ansia)

X Livello di umidità estremamente alto/basso (posizione prona nel sonno, esposizione a freddo, allergeni, fumo)

Soffocamento, rischio Vedere rischio di lesione	X
---	----------

Trasferimento, compromissione, rischio Vedere mobilità, compromissione, rischio	X
---	----------

Trauma, rischio Vedere rischio di lesione	X
---	----------



Altre Diagnosi Infermieristiche prevalentemente trattate

Indicare eventuali diagnosi infermieristiche e fattori correlati non incluse nell'elenco
(riferimenti bibliografici: L.J.Carpenito-Diagnosi infermieristiche – 6th. ed. C.E.A. Edizioni, 2015)

Disturbo della percezione sensoriale uditiva

X

Fattori correlati

Fisiologici

- X Disturbo della percezione sensoriale alterazione della ricezione, della trasmissione e/o dell'integrazione sensoriale;
- X malattia trauma o deficit neurologico.

Situazionali

- X eccessivi/insufficienti stimoli ambientali
- X ambiente sociale limitato
- X stress psicologico

Comportamento disorganizzato del bambino, rischio di

X

Fattori correlati

Fisiopatologici

- X dolore
- X problemi motori o di alterata percezione
- X Prematurità (immaturità del SNC, ipossia alla nascita)
- X problemi genetici

Trattamenti

- X procedure invasive/dolorose
- X eccessiva manipolazione
- X luci/rumori eccessive

Situazionali

- X iperstimolazione ambientale
- X assenza di contenimento/limiti

Fasi di sviluppo

- X Neonato/bambino
- X adolescente

Allegato 3
PROBLEMI COLLABORATIVI PRELEVALEMENTE TRATTATI

Selezionare (X) le caselle relative ai problemi collaborativi di interesse

(riferimenti bibliografici: L.J.Carpenito-Diagnosi infermieristiche - 5th. ed. C.E.A. Edizioni, 2015)

Rischio di complicanze (RC) per disfunzione cardiaca/ vascolare	
RC per emorragia	X
RC per ipovolemia	X
Rischio di complicanze (RC) per disfunzione respiratoria	
RC per ipossiemia	X
Rischio di complicanze (RC) per disfunzione metabolica/immunitaria/ematopoietica	
RC per ipo/iperglicemia	X
RC per reazione allergica	X
RC per infezioni opportunistiche	X
RC per crisi convulsiva	X
Rischio di complicanze (RC) per disfunzione gastrointestinale / epatica / biliare	
RC per iperbilirubinemia	X
Rischio di complicanze (RC) per effetti avversi (EA) della terapia farmacologica	
RC per effetti avversi della terapia con farmaci anticonvulsivanti	X
RC per effetti avversi della terapia con farmaci soppressori della secrezione delle gonadotropine ipofisarie	X
RC per effetti avversi della terapia antibiotica per la profilassi della febbre reumatica.	X



Allegato 4

APPRENDIMENTO OFFERTO

In relazione alle diagnosi infermieristiche / problemi collaborativi sopra indicati, descrivere le opportunità formative per lo studente che caratterizzano la sede di apprendimento. Esempio: interventi assistenziali infermieristici, modelli organizzativi e/o di presa in carico assistenziale, attività di ricerca e innovazione.

Casa della Salute dei Bambini e dei Ragazzi ha un'utenza che possiamo differenziare macroscopicamente in :

- bambini afferenti al Centro di rieducazione neuromotoria della Neuropsichiatria Infantile (NPI)
- bambini cronici che accedono per somministrazione di farmaci/monitoraggio del dosaggio plasmatico
- bambini che accedono per prelievi di campioni biologici e accesso ai percorsi diagnostici (ORL, Ginecologia Infanzia e Adolescenza, Allergologia, Prevenzione del Sovrappeso, Screening displasia anche, Fisiatria)

I modelli di presa in carico sono ovviamente differenziati: la parte ambulatoriale ha prestazioni puntuali che possono limitarsi ad una sola seduta, o richiedere un follow up periodico; i bambini che necessitano di somministrazione di farmaco IM hanno una presa in carico a lungo periodo (spesso per molti anni) così come i bambini del centro NPI per i quali viene attuato un progetto di rieducazione neuromotoria multiprofessionale di durata variabile.

Il centro è aperto dal lunedì al venerdì, l'attività inizia sempre alle 8 con l'apertura del punto prelievi (che dura fino alle 10) mentre gli specialisti hanno un orario variabile nella settimana. Le attività vengono svolte a rotazione da tutte le infermiere per garantire la maggior uniformità ed estensione nella copertura del servizio.

Alcune attività vengono svolte nelle scuole (sorveglianza sanitaria, formazione e addestramento di caregivers scolastici di minori portatori di bisogni di salute in ambito scolastico). In questo caso l'infermiere referente sul caso porta a termine l'intero percorso formativo.

Casa della Salute dei Bambini e dei Ragazzi è un progetto sperimentale: come tale ha la funzione di rilevare i bisogni di salute della popolazione 0-14, identificare i percorsi adatti ad offrire una risposta territoriale innovativa, di qualità e sostenuta da evidenze.

Attività e tecniche:

rilevazione parametri vitali, prelievo venoso da sangue periferico e prelievo capillare, iniezione intramuscolare e sottocutanea, utilizzo DPI, medicazione lesioni cutanee e rimozione punti, esecuzione elettrocardiogramma.

Per consentire l'apprendimento di alcune tecniche come prelievi, terapia iniettiva, medicazioni di CVC o di lesioni cutanee, nonché per poter osservare le diverse specificità dall'età pediatrica e dell'età adulta, è possibile che lo studente svolga alcune giornate in affiancamento all'infermiere del poliambulatorio di via Gorizia 114, adiacente alla Casa della Salute dei Bambini e dei Ragazzi.