

## OFFERTA FORMATIVA DELLA SEDE DI TIROCINIO

Contesto	
Tutor clinico Contatti e riferimenti	Nome M.Giovanna Cognome Ciarlariello Telefono 011 2402378-2306 e-mail <a href="mailto:mariagiovanna.ciarlariello@unito.it">mariagiovanna.ciarlariello@unito.it</a>
Struttura/servizio Nominativo, ubicazione, ecc N°locali, n° posti letto, Orari apertura al pubblico, Orari di lavoro, Figure professionali Risorse strumentali Servizi agli studenti (mensa, biblioteca, accesso internet, ecc)	p.o. S.Giovanni Bosco S.C. Chirurgia Vascolare-ORL 2, 4°piano  orario di lavoro:7-14.30/14.30-22.30/22.30-7 medici chirurghi,1 cpse,13 cpsi,5 oss,logopedisti,nutrizionist,fisioterapisti accesso a internet,consultazione di linee guida ,protocolli ospedalieri,procedure ,piani standard mensa ospedaliera,bar esterno, punti ristoro interni
Contatti e riferimenti	Indirizzo Piazza Donatori di Sangue, 3 Torino Telefono 011 2402378-2306 Fax 0112402940 e-mail
Come raggiungere il servizio Mappa percorso Mezzi pubblici	tram 4, bus 2,75,27

Allegato 1

**Problemi di salute / Problemi clinici / Percorso diagnostico terapeutici  
prevalentemente trattati**

Selezionare (X) i problemi di salute prevalenti e indicare le patologie più frequenti

Dipendenze patologiche

Disabilità, malattie ad alto grado di tutela

Amputazione arto

Malattie Intestinali / digestive

appendicopatie,colecistiti,pancreatiti,rimozione  
stomie,px,chemioembolizzazioni,occlusioni intestinali

Malattie Traumatologiche / incidenti

politraumi,fratture facciali da aggressioni/incidenti, fratture del frontale,timpanoplastiche

Salute in area Materno / infantile

tonsilliti,adenoidite nel bambino

Altro (specificare)

chirurgia odontostomatologica

### Diagnosi Infermieristiche prevalentemente trattate

Selezionare (X) le caselle relative alle Diagnosi Infermieristiche e ai fattori correlati di interesse  
(riferimenti bibliografici: L.J.Carpentito-Diagnosi infermieristiche – 5th. ed. C.E.A. Edizioni, 2010)

<b>Ansia</b>	<b>X</b>
<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>	

<b>Attività, intolleranza all'attività</b>	<b>X</b>
<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>	

<b>Cadute, rischio</b> Vedere lesione, rischio	<b>X</b>
---	----------

<b>Comunicazione, compromissione e</b> <b>Comunicazione verbale, compromissione</b> (incapacità a pronunciare le parole ma è in grado di comprendere)	<b>X</b>
---	----------

**Fattori correlati**

**Fisiopatologici**

- Pensieri disordinati e non realistici secondari a schizofrenia, delirio, psicosi, paranoia
- xAlterazione della funzionalità motoria dei muscoli del linguaggio
- Ischemia del lobo frontale temporale (per ictus cerebrale, trauma orale o facciale, danno cerebrale congenito, trauma cranico, depressione del SNC, ipertensione endocranica, tumore della testa/collo/midollo spinale, ipossia cronica, riduzione della circolazione cerebrale.
- Patologia del sistema nervoso (es miastenia grave, distrofia muscolare, malattia di Alzheimer)
- Paralisi delle corde vocali, tetraplegia
- xCompromissione della capacità di produrre il linguaggio (per compromissione respiratoria, dispnea, edema, infezione della laringe, deformità del cavo orale, labio/palatoschisi, mal occlusione o frattura mascellare, adentulia, disartria)

**Trattamenti**

- xCompromissione della capacità di produrre il linguaggio (per intubazione endotracheale, tracheotomia, tracheostomia, laringectomia, intervento chirurgico cranico, al viso, al collo, alla bocca, dolore alla bocca o faringeo, depressione cognitiva da farmaci deprimenti il SNC/anestetici)

**Situazionali (personali, ambientali)**

- Diminuita attenzione (per affaticamento collera, ansia, o dolore)
- Mandata disponibilità di apparecchio acustico o suo malfunzionamento
- Barriere psicologiche (paura, timidezza)
- Mancanza di riservatezza
- Barriera linguistica (non disponibilità di interprete)

**Fasi di sviluppo**

- Bambino (inadeguata stimolazione sensoriale)
- Persona anziana (perdite uditive)
- Compromissione cognitiva per (specificare patologia)



Concetto di se, disturbo del	X
<p>Fattori correlati</p> <p>Fisiopatologici</p> <ul style="list-style-type: none"><li><input type="checkbox"/> xVariazioni dell'aspetto, dello stile di vita, di un ruolo o delle risposte altrui (per malattia cronica, dolore, trauma grave, perdita parti del corpo / funzioni organiche)</li></ul> <p>Situazionali (personali, ambientali)</p> <ul style="list-style-type: none"><li><input type="checkbox"/> Senso di abbandono/fallimento secondario a perdita del lavoro/della capacità di lavorare, divorzio, separazione o perdita di persona significativa</li><li><input type="checkbox"/> Immobilità o perdita di funzioni</li><li><input type="checkbox"/> Rapporti insoddisfacenti parentali /coniugali</li><li><input type="checkbox"/> Preferenze sessuali</li><li><input type="checkbox"/> Gravidanza nel corso dell'adolescenza</li><li><input type="checkbox"/> Differenza di sesso nell'educazione dei figli</li><li><input type="checkbox"/> Esperienze di violenza da parte dei genitori</li><li><input type="checkbox"/> Cambiamento del consueto modello di responsabilità</li></ul> <p>Fasi di sviluppo</p> <ul style="list-style-type: none"><li><input type="checkbox"/> Età di mezzo (perdita di ruoli/responsabilità)</li><li><input type="checkbox"/> Persona anziana (perdita di ruoli/responsabilità)</li></ul>	



<b>Cura di sé, deficit (bagno/igiene personale)</b> Ridotta e/o incapacità di (specificare): <ul style="list-style-type: none"><li><input type="checkbox"/> lavare il proprio corpo o parti</li><li><input type="checkbox"/> procurarsi l'acqua</li><li><input type="checkbox"/> regolare la temperatura o il flusso dell'acqua</li><li><input type="checkbox"/> percepire il bisogno di cure igieniche</li></ul>	<b>X</b>
<b>Fattori correlati</b> <b>Fisiopatologici</b> <ul style="list-style-type: none"><li><input type="checkbox"/> Mancanza di coordinazione motoria per (specificare)</li><li><input type="checkbox"/> Spasticità o flaccidità per (specificare)</li><li><input type="checkbox"/> Debolezza muscolare per (specificare)</li><li><input type="checkbox"/> Paralisi per (specificare)</li><li><input type="checkbox"/> Atrofia per (specificare)</li><li><input type="checkbox"/> Contratture muscolari per (specificare)</li><li><input type="checkbox"/> Stato comatoso</li><li><input type="checkbox"/> Disturbi visivi</li><li><input type="checkbox"/> x Arti non funzionanti o mancanti</li><li><input type="checkbox"/> Regressione a un precedente stadio di sviluppo</li><li><input type="checkbox"/> Comportamenti ritualistici</li><li><input type="checkbox"/> Deficit somatici</li></ul> <b>Trattamenti</b> <ul style="list-style-type: none"><li><input type="checkbox"/> Uso di dispositivi esterni (apparecchio gessato, tutori ortopedici, infusione endovenosa...)</li><li><input checked="" type="checkbox"/> x Affaticamento e dolore post operatori</li></ul> <b>Situazionali (personali, ambientali)</b> <ul style="list-style-type: none"><li><input type="checkbox"/> Deficit cognitivi</li><li><input type="checkbox"/> Dolore</li><li><input type="checkbox"/> Scarsa motivazione</li><li><input type="checkbox"/> Affaticamento</li><li><input type="checkbox"/> Confusione mentale</li><li><input type="checkbox"/> Ansia che paralizza</li></ul> <b>Fasi di sviluppo</b> <ul style="list-style-type: none"><li><input type="checkbox"/> Diminuita capacità motoria e visiva o a debolezza muscolare</li></ul>	



<b>Cura di sé, deficit (bagno/igiene personale)</b> Ridotta e/o incapacità di (specificare): <ul style="list-style-type: none"><li><input type="checkbox"/> mettersi o togliersi vestiti, allacciare i vestiti</li><li><input type="checkbox"/> curare il proprio aspetto</li><li><input type="checkbox"/> acquistare o cambiare capi di vestiario</li><li><input type="checkbox"/> o il flusso dell'acqua</li><li><input type="checkbox"/> percepire il bisogno di cure igieniche</li></ul>	<b>X</b>
<b>Fattori correlati</b> <b>Fisiopatologici</b> <ul style="list-style-type: none"><li><input type="checkbox"/> Mancanza di coordinazione motoria per (specificare)</li><li><input type="checkbox"/> Spasticità o flaccidità per (specificare)</li><li><input type="checkbox"/> Debolezza muscolare per (specificare)</li><li><input type="checkbox"/> Paralisi per (specificare)</li><li><input type="checkbox"/> Atrofia per (specificare)</li><li><input type="checkbox"/> Contratture muscolari per (specificare)</li><li><input type="checkbox"/> Stato comatoso</li><li><input type="checkbox"/> Disturbi visivi</li><li><input checked="" type="checkbox"/> x Arti non funzionanti o mancanti</li><li><input type="checkbox"/> Regressione a un precedente stadio di sviluppo</li><li><input type="checkbox"/> Comportamenti ritualistici</li><li><input type="checkbox"/> Deficit somatici</li></ul> <b>Trattamenti</b> <ul style="list-style-type: none"><li><input type="checkbox"/> Uso di dispositivi esterni (apparecchio gessato, tutori ortopedici, infusione endovenosa...)</li><li><input checked="" type="checkbox"/> x Affaticamento e dolore post operatori</li></ul> <b>Situazionali (personali, ambientali)</b> <ul style="list-style-type: none"><li><input type="checkbox"/> Deficit cognitivi</li><li><input checked="" type="checkbox"/> x Dolore</li><li><input type="checkbox"/> Scarsa motivazione</li><li><input type="checkbox"/> Affaticamento</li><li><input type="checkbox"/> Confusione mentale</li><li><input type="checkbox"/> Ansia che paralizza</li></ul> <b>Fasi di sviluppo</b> <ul style="list-style-type: none"><li><input type="checkbox"/> Diminuita capacità motoria e visiva o a debolezza muscolare</li></ul>	



<p><b>Cura di sé, deficit (eliminazione urinaria e fecale)</b> Incapacità o mancanza di volontà per (specificare):</p> <ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> servirsi del gabinetto/comoda</li> <li><input type="checkbox"/> trasferirsi sul gabinetto/comoda</li> <li><input type="checkbox"/> eseguire pratiche igieniche adeguate</li> <li><input type="checkbox"/> pulire il gabinetto o la comoda</li> <li><input type="checkbox"/> sistemare gli indumenti per servirsi del gabinetto</li> </ul>	<b>X</b>
<p><b>Fattori correlati</b> <b>Fisiopatologici</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> Mancanza di coordinazione motoria per (specificare)</li> <li><input type="checkbox"/> Spasticità o flaccidità per (specificare)</li> <li><input type="checkbox"/> Debolezza muscolare per (specificare)</li> <li><input type="checkbox"/> Paralisi per (specificare)</li> <li><input type="checkbox"/> Atrofia per (specificare)</li> <li><input type="checkbox"/> Contratture muscolari per (specificare)</li> <li><input type="checkbox"/> Stato comatoso</li> <li><input type="checkbox"/> Disturbi visivi</li> <li><input checked="" type="checkbox"/> x Arti non funzionanti o mancanti</li> <li><input type="checkbox"/> Regressione a un precedente stadio di sviluppo</li> <li><input type="checkbox"/> Comportamenti ritualistici</li> <li><input type="checkbox"/> Deficit somatici</li> </ul> <p><b>Trattamenti</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li><input checked="" type="checkbox"/> x Uso di dispositivi esterni (apparecchio gessato, tutori ortopedici, infusione endovenosa...)</li> <li><input checked="" type="checkbox"/> x Affaticamento e dolore post operatori</li> </ul> <p><b>Situazionali (personali, ambientali)</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> Deficit cognitivi</li> <li><input checked="" type="checkbox"/> x Dolore</li> <li><input type="checkbox"/> Scarsa motivazione</li> <li><input type="checkbox"/> Affaticamento</li> <li><input type="checkbox"/> Confusione mentale</li> <li><input type="checkbox"/> Ansia che paralizzava</li> </ul> <p><b>Fasi di sviluppo</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> Diminuita capacità motoria e visiva o a debolezza muscolare</li> </ul>	
<p><b>Deambulazione, compromissione, rischio</b> Vedere mobilità, compromissione, rischio</p>	<b>X</b>

Dolore acuto (Grave fastidio o disagio che dura da 0 a 6 mesi)	X
<b>Fattori correlati</b>	
<b>Fisiopatologici</b>	
Trauma tissutale e spasmi muscolari riflessi secondari a	
<input type="checkbox"/>	xDisordini muscolo scheletrici (fratture, artrite, contrattura muscolare, spasmi, patologia a carico del midollo spinale)
<input type="checkbox"/>	Disordini viscerali (cardiaci, renali, epatici, intestinali, polmonari)
<input type="checkbox"/>	Cancro
<input type="checkbox"/>	xDisordini vascolari (vasospasmo, occlusione, flebite, vasodilatazione/cefalea)
<input type="checkbox"/>	Infiammazione di nervi, tendini, capsula articolare, articolazioni, muscoli, strutture articolari.
<input type="checkbox"/>	Fatigue, malessere o prurito secondari a malattie infettive (rosolia, pancreatite, epatite, mononucleosi, varicella)
<input type="checkbox"/>	xEffetti di un tumore su (specificare)
<input type="checkbox"/>	Dolori addominali, diarrea, vomito secondari a gastroenterite, ulcera gastrica, influenza.
<input type="checkbox"/>	Infiammazione e spasmi della muscolatura liscia per calcoli renali, infezioni gastrointestinali
<input type="checkbox"/>	Dolori durante il travaglio / parto, ingorgo mammario
<b>Trattamenti</b>	
<input type="checkbox"/>	xTrauma tissutale e spasmi muscolari riflessi (per intervento chirurgico, ustione, indagini diagnostiche/venipuntura/biopsia, scansiomertria invasiva)
<input type="checkbox"/>	Per nausea e vomito secondari a chemioterapia, anestesia, effetti collaterali (specificare)
<b>Situazionali (personali, ambientali)</b>	
<input type="checkbox"/>	Febbre
<input type="checkbox"/>	Immobilità/posizionamento inappropriato
<input type="checkbox"/>	Iperattività
<input type="checkbox"/>	Punti di pressione (es. ingessatura o bendaggio stretti)
<input type="checkbox"/>	Risposta allergica
<input type="checkbox"/>	Irritanti chimici
<input type="checkbox"/>	Bisogno di dipendenza non soddisfatto
<input type="checkbox"/>	Ansia grave e repressa
<b>Fasi di sviluppo</b>	
Trauma tissutale e spasmi muscolari riflessi secondari a	
<input type="checkbox"/>	1 anno: coliche
<input type="checkbox"/>	Prima infanzia: dentizione, otalgia
<input type="checkbox"/>	Media infanzia: dolore addominale ricorrente, dolori della crescita
<input type="checkbox"/>	Adolescenza: cefalea, dolore toracico, dismenorrea.





Dolore cronico (Continuo/ intermittente che dura da più di 6 mesi)	X
<p>Fattori correlati</p> <p>Fisiopatologici</p> <p>Trauma tissutale e spasmi muscolari riflessi secondari a</p> <ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> Disordini muscolo scheletrici (fratture, artrite, contrattura muscolare, spasmi, patologia a carico del midollo spinale)</li> <li><input type="checkbox"/> xDisordini viscerali (cardiaci, renali, epatici, intestinali, polmonari)</li> <li><input type="checkbox"/> Cancro</li> <li><input type="checkbox"/> Disordini vascolari (vasospasmo, occlusione, flebite, vasodilatazione/cefalea)</li> <li><input type="checkbox"/> Infiammazione di nervi, tendini, capsula articolare, articolazioni, muscoli, strutture articolari.</li> <li><input type="checkbox"/> Fatigue, malessere o prurito secondari a a malattie infettive (rosolia, pancreatite, epatite, mononucleosi, varicella)</li> <li><input type="checkbox"/> Effetti di un tumore su (specificare)</li> <li><input type="checkbox"/> Dolori addominali, diarrea, vomito secondari a gastroenterite, ulcera gastrica, influenza.</li> <li><input type="checkbox"/> Infiammazione e spasmi della muscolatura liscia per calcoli renali, infezioni gastrointestinali</li> <li><input type="checkbox"/> Dolori durante il travaglio / parto, ingorgo mammario</li> </ul> <p>Trattamenti</p> <ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> xTrauma tissutale e spasmi muscolari riflessi (per intervento chirurgico, ustione, indagini diagnostiche/venipuntura/biopsia, scansiomertria invasiva)</li> <li><input type="checkbox"/> Per nausea e vomito secondari a chemioterapia, anestesia, effetti collaterali (specificare)</li> </ul> <p>Situazionali (personali, ambientali)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> Febbre</li> <li><input type="checkbox"/> Immobilità/posizionamento inappropriato</li> <li><input type="checkbox"/> Iperattività</li> <li><input type="checkbox"/> Punti di pressione (es.ingessatura o bendaggio stretti)</li> <li><input type="checkbox"/> Risposta allergica</li> <li><input type="checkbox"/> Irritanti chimici</li> <li><input type="checkbox"/> Bisogno di dipendenza non soddisfatto</li> <li><input type="checkbox"/> Ansia grave e repressa</li> </ul>	

Immagine corporea, Disturbo/Rischio di	X
<p>Fattori correlati</p> <p>Fisiopatologici</p> <ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> xVariazioni dell'aspetto per malattia cronica, trauma grave, perdita di una parte del corpo, perdita di una funzione organica, invecchiamento</li> </ul> <p>Trattamenti</p> <ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> xvariazione dell'aspetto ( per ricovero ospedaliero, radioterapia, chemioterapia, intervento chirurgico)</li> </ul> <p>Situazionali (personali, ambientali)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> Trauma fisico secondario a abuso sessuale, stupro, aggressione (specificare)</li> <li><input type="checkbox"/> Effetti sull'aspetto di obesità, immobilità, gravidanza (specificare)</li> </ul>	

Infezione, rischio di	X
<p>Fattori correlati</p> <p>Fisiopatologici</p> <ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> xCompromissione delle difese dell'ospite per cancro, malattie respiratorie, ematologiche, periodontali, malattie epatiche, artrite, diabete mellito, malattie ereditarie, AIDS, alcolismo, immunosoppressione (secondaria a- specificare)</li> <li><input type="checkbox"/> xCompromissione della circolazione per linfedema, obesità, malattia vascolare periferica</li> </ul> <p>Trattamenti</p> <ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> xSede di possibile invasione di microorganismi per intervento chirurgico, intubazione, linee invasive, nutrizione parenterale totale, dialisi, nutrizione enterale</li> <li><input type="checkbox"/> Compromissione delle difese dell'ospite per terapia radiante, trapianto d'organo, terapia farmacologica (specificare)</li> </ul> <p>Situazionali (personali, ambientali)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> Compromissione delle difese dell'ospite per malattie infettive, stress, malnutrizione, prolungata degenza in ospedale, fumo, prolungata immobilità</li> <li><input type="checkbox"/> Possibile sede di invasione di microorganismi per trauma accidentale/intenzionale, periodo postpartum, morso di insetto/animale/umano, lesione termica, ambiente caldo/umido/buio (apparecchio</li> <li><input type="checkbox"/> gessato, pieghe cutanee)</li> <li><input type="checkbox"/> xContatto con agenti contaminanti (infezioni nosocomiali o di comunità)</li> </ul> <p>Fasi di sviluppo</p> <ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> Neonato: maggiore vulnerabilità del neonato per madre HIV positiva, carenza di anticorpi materni, flora normale insufficiente, ferite aperte (ombelicale, circoncisione), sistema immunitario immaturo</li> <li><input type="checkbox"/> Bambino-adolescente: maggiore vulnerabilità per perdita dell'immunizzazione, molteplici partner sessuali</li> <li><input type="checkbox"/> xPersona anziana: maggiore vulnerabilità per diminuzione della risposta immunitaria, condizione debilitante, malattia cronica)</li> </ul>	

Insonnia	X
<p>Fattori correlati</p> <p>Fisiopatologici</p> <ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> Compromissione del trasporto di ossigeno (per angina, disturbi circolatori/respiratori, arteriosclerosi periferica)</li> <li><input type="checkbox"/> Compromissione dell'eliminazione fecale o urinaria (per diarrea, disuria, ritenzione, incontinenza, stipsi, pollacchiuria)</li> <li><input type="checkbox"/> Compromissione del metabolismo (per ipertiroidismo, disturbi epatici, ulcera gastrica)</li> </ul> <p>Situazionali (personali, ambientali)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> Eccessiva iperattività (per disturbo bipolare/ da deficit dell'attenzione, panico, uso di droghe)</li> <li><input type="checkbox"/> xEccessivo dormire di giorno</li> <li><input type="checkbox"/> Depressione</li> <li><input type="checkbox"/> xInadeguata attività fisica durante il giorno</li> <li><input type="checkbox"/> xDolore cronico</li> <li><input type="checkbox"/> Risposte ansiose</li> <li><input type="checkbox"/> Modifiche ambientali (specificare)</li> <li><input type="checkbox"/> Paura</li> <li><input type="checkbox"/> Frequenti risvegli dei bambini</li> <li><input type="checkbox"/> Donna adulta: variazioni ormonali (es. Perimenopausa)</li> </ul>	



<b>Integrità mucosa orale, compromissione</b>	<b>X</b>
---	----------

Fattori correlati

- xInadeguata igiene orale
- xIncapacità di provvedere all'igiene orale

<b>Lesione, rischio di_</b>	<b>X</b>
-----------------------------	----------

Fattori correlati

Fisiopatologici

- Alterazioni delle funzioni cerebrali per ipossia (vertigini, sincope)
- xAlterazioni della mobilità (ictus cerebrale, artrite, parkinsonismo, perdita di un arto, compromissione della vista/udito)
- Fatigue
- Ipotensione ortostatica
- Insufficienza vertebro basilare
- Disturbi vestibolari
- Inadeguata consapevolezza dei rischi ambientali (confusione mentale)
- Movimenti tonico-clonici (convulsioni)

Trattamenti

- xLungo allettamento
- Effetti sulla mobilità/sensorio (sedativi, miorilassanti...specificare)
- Gesso, stampelle, deambulatore, bastone

Situazionali (personali, ambientali)

- Diminuzione o perdita memoria a breve termine
- Alterata capacità di giudizio ( per stress, droghe, alcol, disidratazione, depressione)
- Pericoli domestici (pavimenti sdruciolevoli, scale, illuminazione insufficiente, ingressi/corridoi non sicuri, bagno, giocattoli non sicuri, impianto elettrico difettoso, veleni conservati in modo improprio)
- Pericoli legati all'uso dell'automobile (cinture, sedile di sicurezza per bambini, meccanica del veicolo non sicura)
- Pericolo di incendio
- Ambiente non familiare (es. Ospedale)
- Scarpe inadatte,
- Disattenzione del caregiver
- Uso improprio degli ausili
- Storia di incidenti
- Andatura instabile

Fasi di sviluppo

- Bambino: inadeguata consapevolezza dei pericoli
- Persona anziana: alterata capacità di giudizio (per deficit cognitivi), stile di vita sedentario, perdita di forza muscolare



Lesione da posizionamento perioperatorio, rischio	X
<p>Fattori correlati</p> <p>Fisiopatologici</p> <ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> Aumentata vulnerabilità (per malattia cronica, cancro, corporatura esile, terapia radiante, osteoporosi, compromissione del sistema immunitario, disfunzione renale/epatica, infezione)</li> <li><input type="checkbox"/> xCompromissione della perfusione tissutale (per diabete mellito, anemia, ascite, malattia cardiovascolare, ipotermia, disidratazione, vasculopatia periferica, trombosi, edemi)</li> <li><input type="checkbox"/> Vulnerabilità della stomia durante il posizionamento</li> <li><input type="checkbox"/> Contratture preesistenti/alterazioni fisiche (artrite reumatoide, poliomielite)</li> </ul> <p>Trattamenti</p> <ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> xNecessità di posizionamento e perdita delle abituali risposte sensoriali/protettive per anestesia</li> <li><input type="checkbox"/> xProcedure chirurgiche della durata di 2 o più ore</li> <li><input type="checkbox"/> Vulnerabilità degli impianti/protesi durante il posizionamento</li> </ul> <p>Situazionali (personali, ambientali)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> Compromissione circolatoria (obesità, consumo di tabacco, gravidanza, neonato, temperatura bassa in sala operatoria, anziano)</li> </ul> <p>Fasi di sviluppo</p> <ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> Aumentata vulnerabilità alle lesioni tissutali (condizione infantile, età avanzata)</li> </ul>	

Mobilità, compromissione /rischio di	X
<p>Fattori correlati</p> <p>Fisiopatologici</p> <ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> riduzione della forza e della resistenza per compromissione neuromuscolare (malattie autoimmunitarie, del sistema nervoso, respiratorie, distrofia muscolare, paralisi parziale, tumore del SNC, tumore, trauma, ipertensione endocranica, deficit sensoriale)</li> <li><input type="checkbox"/> riduzione della forza e della resistenza per compromissione muscoloscheletrica (fratture, malattie del tessuto connettivo, condizioni cardiache)</li> <li><input type="checkbox"/> rigidità delle articolazioni o contratture (per malattia infiammatoria, interventi endoprotesi ortopedica articolare, malattia degenerativa delle articolazioni e del disco)</li> <li><input type="checkbox"/> edemi</li> <li><input type="checkbox"/> apparecchi esterni (gesso/splint, corsetto ortopedico, catetere venoso)</li> <li><input type="checkbox"/> forza/resistenza insufficienti per la deambulazione (protesi, stampelle, deambulatore)</li> </ul> <p>Situazionali (personali, ambientali)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> fatigue</li> <li><input type="checkbox"/> obesità</li> <li><input type="checkbox"/> mancanza di motivazione</li> <li><input type="checkbox"/> dispnea</li> <li><input type="checkbox"/> dolore</li> </ul> <p>Fasi di sviluppo</p> <ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> Bambino: alterazione dell'andatura per deficienze scheletriche congenite, displasia congenita dell'anca, osteomielite</li> <li><input type="checkbox"/> Persona anziana: diminuzione dell'agilità e debolezza muscolare</li> </ul>	

**Nutrizione inferiore al fabbisogno, rischio di**

**X**

**Fattori correlati**

**Fisiopatologici**

- xAumentato fabbisogno calorico e difficoltà ad assumere sufficienti calorie (per ustione, trauma, complicanze/deformazioni gastrointestinali, cancro, alcolismo, uso di sostanze stupefacenti, infezione, AIDS)
- Disfagia (per ictus cerebrale, M.di Parkinson, palatoschisi, distrofia muscolare, paralisi cerebrale, paralisi facciale, SLA, disturbi neuromuscolari)
- Diminuito assorbimento di nutrienti (per M.di Crohn, enterocolite necrotizzante, intolleranza al lattosio, fibrosi cistica)
- Diminuzione dell'appetito (per alterazioni dello stato di coscienza)
- Vomito autoindotto, esercizio fisico eccessivo in rapporto alle calorie assunte, anoressia
- Rifiuto ad alimentarsi (timore di essere avvelenato/ comportamento paranoico)
- Inappetenza/agitazione fisica (per disturbo bipolare)
- Inappetenza e diarrea (per infezione da protozoi)
- Vomito, inappetenza e alterazioni della digestione (per pancreatite)
- Inappetenza e compromissione del metabolismo proteico/lipidico, ipovitaminosi (per cirrosi epatica)
- Inappetenza, vomito e alterazione della digestione (per malformazioni del tratto gastrointestinale /enterocolite necrotizzante)
- Inappetenza per reflusso gastroesofageo

**Trattamenti**

- xAumentato fabbisogno proteico/vitaminico per la cicatrizzazione di ferite e diminuita assunzione (per intervento chirurgico, farmaci, blocco mandibolare, radioterapia)
- Inadeguato assorbimento come effetto collaterale di farmaci (specificare)
- Diminuita assunzione orale, dolore in sede orale, nausea, vomito (per radioterapia, chemioterapia, tonsillectomia)

**Situazionali (personali, ambientali)**

- Diminuzione dell'appetito (per nausea, vomito, isolamento sociale, stress, depressione, allergie)
- Incapacità di procurarsi gli alimenti (per limitazioni fisiche, problemi finanziari/ di trasporto)
- Incapacità di masticare (per adentulia, carie, protesi non adatta)
- Diarrea

**Fasi di sviluppo**

- Neonato/bambino: inadeguata assunzione (per carente stimolazione sensoriale, inadeguate conoscenze del care giver, scarsa produzione del latte materno)
- Malassorbimento, restrizioni dietetiche, inappetenza (per morbo celiaco, fibrosi cistica, intolleranza al lattosio, malformazioni gastrointestinali, reflusso gastroesofageo, enterocolite necrotizzante)
- Difficoltà di suzione/disfagia (per paralisi, labioschisi, palatoschisi)
- Inadeguata suzione, astenia e dispnea (per cardiopatia congenita, iperbilirubinemia, sindrome virale, distress respiratorio, prematurità, ritardo di sviluppo)



<b>Respirazione, inefficace funzionalità, rischio</b>	<b>X</b>
Fattori correlati	
Fisiopatologici	
<input type="checkbox"/> xSecrezioni eccessive o dense (per infezione, infiammazione, allergia, patologie cardiopolmonari, fumo)	
<input type="checkbox"/> Immobilità stasi delle secrezioni, tosse inefficace (per malattie del SN, depressione del SNC/trauma cranico, ictus cerebrale, tetraplegia)	
Trattamenti	
<input type="checkbox"/> Immobilità (per effetto sedativo di farmaci, droghe o sostanze chimiche, anestesia)	
<input type="checkbox"/> Soppressione del riflesso della tosse	
<input type="checkbox"/> xEffetti della tracheostomia (alterazione delle secrezioni)	
Situazionali (personali, ambientali)	
<input type="checkbox"/> xImmobilità (per intervento chirurgico/trauma, compromissione percettiva/cognitiva, fatigue, dolore, paura, ansia)	
<input type="checkbox"/> Livello di umidità estremamente alto/basso (posizione prona nel sonno, esposizione a freddo, pianto, riso, allergeni, fumo)	
<b>Trauma, rischio</b>	<b>X</b>
Vedere rischio di lesione	



**PROBLEMI COLLABORATIVI PRELEVALEMENTE TRATTATI**

Selezionare (X) le caselle relative ai problemi collaborativi di interesse  
(riferimenti bibliografici: L.J.Carpenito-Diagnosi infermieristiche - 5th. ed. C.E.A. Edizioni, 2010)

Rischio di complicanze (RC) per disfunzione cardiaca/ vascolare	
RC per emorragia	<input checked="" type="checkbox"/>
RC per riduzione della gittata cardiaca	<input type="checkbox"/>
RC per aritmie	<input type="checkbox"/>
RC per edema polmonare	<input type="checkbox"/>
RC per trombosi venosa profonda	<input type="checkbox"/>
RC per ipovolemia	<input type="checkbox"/>
RC per sindrome compartimentale	<input checked="" type="checkbox"/>
RC per embolia polmonare	<input type="checkbox"/>
Rischio di complicanze (RC) per disfunzione respiratoria	
RC per ipossiemia	<input type="checkbox"/>
RC per atelectasia/polmonite	<input type="checkbox"/>
RC per costrizione tracheobronchiale	<input type="checkbox"/>
RC per pneumotorace	<input checked="" type="checkbox"/>
Rischio di complicanze (RC) per disfunzione metabolica/immunitaria/ematopoietica	
RC per ipo/iperglicemia	<input checked="" type="checkbox"/>
RC per bilancio azotato negativo	<input type="checkbox"/>
RC per squilibri elettrolitici	<input type="checkbox"/>
RC per sepsi	<input checked="" type="checkbox"/>
RC per acidosi (metabolica, respiratoria)	<input type="checkbox"/>
RC per alcalosi (metabolica, respiratoria)	<input type="checkbox"/>
RC per reazione allergica	<input type="checkbox"/>
Rc per trombocitopenia	<input type="checkbox"/>
RC per infezioni opportunistiche	<input checked="" type="checkbox"/>
RC per crisi falciforme	<input type="checkbox"/>
Rischio di complicanze (RC) per disfunzione renale / urinaria	
RC per ritenzione urinaria acuta	<input type="checkbox"/>
RC per insufficienza renale	<input type="checkbox"/>
RC per calcoli renali	<input type="checkbox"/>



Rischio di complicanze (RC) per disfunzione neurologica / sensoriale	
RC per ipertensione endocranica	<input type="checkbox"/>
RC per crisi convulsiva	<input type="checkbox"/>
RC per ipertensione intraoculare	<input type="checkbox"/>
RC per sindrome neurolettica maligna	<input type="checkbox"/>
RC per astinenza da alcol	<input type="checkbox"/>
Rischio di complicanze (RC) per disfunzione gastrointestinale / epatica / biliare	
RC per ileo paralitico	<input type="checkbox"/>
RC per sanguinamento gastrointestinale	<input type="checkbox"/>
RC per disfunzione epatica	<input type="checkbox"/>
RC per iperbilirubinemia	<input type="checkbox"/>
Rischio di complicanze (RC) per disfunzione muscoloscheletrica	
RC per fratture patologiche	<input type="checkbox"/>
RC per lussazione	<input type="checkbox"/>
Rischio di complicanze (RC) per disfunzione riproduttiva	
RC per sanguinamento genitale pretravaglio	<input type="checkbox"/>
RC per parto pretermine	<input type="checkbox"/>
RC per ipertensione gestazionale	<input type="checkbox"/>
RC per condizioni del feto non rassicuranti	<input type="checkbox"/>
RC per emorragia postpartum	<input type="checkbox"/>
Rischio di complicanze (RC) per effetti avversi (EA) della terapia farmacologica	
RC per effetti avversi della terapia con farmaci anticoagulanti	<input checked="" type="checkbox"/>
RC per effetti avversi della terapia con farmaci ansiolitici	<input type="checkbox"/>
RC per effetti avversi della terapia con farmaci adrenocorticosteroidi	<input type="checkbox"/>
RC per effetti avversi della terapia con farmaci antineoplastici	<input type="checkbox"/>
RC per effetti avversi della terapia con farmaci anticonvulsivanti	<input type="checkbox"/>
RC per effetti avversi della terapia con farmaci antidepressivi	<input type="checkbox"/>
RC per effetti avversi della terapia con farmaci antiaritmici	<input type="checkbox"/>
RC per effetti avversi della terapia con farmaci antipsicotici	<input type="checkbox"/>
RC per effetti avversi della terapia con farmaci antipertensivi	<input checked="" type="checkbox"/>
RC per effetti avversi della terapia con farmaci betabloccanti	<input checked="" type="checkbox"/>
RC per effetti avversi della terapia con farmaci calcioantagonisti	<input checked="" type="checkbox"/>
RC per effetti avversi della terapia con farmaci inibitori dell'enzima di conversione dell'angiotensina	<input type="checkbox"/>
RC per effetti avversi della terapia con farmaci inibitori dei recettori dell'angiotensina	<input type="checkbox"/>
RC per effetti avversi della terapia con farmaci diuretici	<input type="checkbox"/>





## APPRENDIMENTO OFFERTO

In relazione alle diagnosi infermieristiche / problemi collaborativi sopra indicati, descrivere le opportunità formative per lo studente che caratterizzano la sede di apprendimento.

Esempio: interventi assistenziali infermieristici, modelli organizzativi e/o di presa in carico assistenziale, attività di ricerca e innovazione.

Patologie cardiovascolari: lo studente viene messo nelle condizioni di rapportarsi con l'utenza affetta da malattia cardiovascolare. Gli obiettivi di apprendimento sono organizzati secondo le funzioni di assistenza (prima durante e dopo indagini diagnostiche, trattamenti terapeutici invasivi, interventi chirurgici, medicazioni di ferite chirurgiche, ulcere vascolari, accessi venosi centrali e periferici, gestione di persone che hanno subito amputazione di un arto), organizzazione e lavoro di equipe, formazione e autoformazione.

Patologie tumorali: mette lo studente nelle condizioni di rapportarsi con persone affette da neoplasia della laringe, faringe e cavo orale. Gli obiettivi di apprendimento sono organizzati secondo le funzioni di assistenza (assistere la persona prima durante e dopo indagini diagnostiche, interventi chirurgici, nell'applicazione di programmi terapeutici, medicazioni complesse, assistere una persona sottoposta a tracheostomia chirurgica), organizzazione e lavoro di equipe, formazione ed autoformazione.

Incidenti: lo studente viene messo nelle condizioni di rapportarsi con l'utente politraumatizzato. Gli obiettivi di apprendimento sono organizzati secondo le funzioni di assistenza (cura di sé, mobilizzazione, alimentazione, gestione di medicazioni, drenaggi chirurgici, cateteri vescicali, utilizzo di apparecchiature terapeutiche), organizzazione e lavoro di equipe, formazione ed autoformazione.