

## OFFERTA FORMATIVA DELLA SEDE DI TIROCINIO

Contesto	
<b>Tutor clinico</b> Contatti e riferimenti	Nome <b>SERGIO</b> Cognome <b>RIOLFO</b> Telefono 011 9026076 e-mail <a href="mailto:hospiceanemos@sanluigi.piemonte.it">hospiceanemos@sanluigi.piemonte.it</a> <a href="mailto:sergio.riolfo@unito.it">sergio.riolfo@unito.it</a>
<b>Struttura/servizio</b> Nominativo, ubicazione, ecc N°locali, n° posti letto, Orari apertura al pubblico, Orari di lavoro, Figure professionali Risorse strumentali Servizi agli studenti (mensa, biblioteca, accesso internet, ecc)	Hospice Anemos, al fondo del terzo padiglione all'interno dell'AOU San Luigi, 8 posti letto, circa 20 spazi comprensivi di soggiorno e di sale dedicate agli incontri degli operatori. L'orario di apertura al pubblico è di 24/24, da normativa non esiste orario vincolato per le visite. Gli orari di lavoro sono variabili a seconda delle figura professionale. Infermieri: 1 per turno, dalle 07.00 alle 14.00, dalle 14.00 alle 21.00, dalle 21.00 alle 07.00; OSS: 1 per turno, in alcune giornate 2 al mattino; dalle 07.00 alle 15.00, dalle 14.00 alle 22.00, dalle 21.00 alle 07.00; Medici: prevalentemente presenti durante la mattinata e su chiamata per reperibilità 24/24, 7/7; Fisioterapisti: prevalentemente presenti il lunedì e il giovedì dalle 09.00 alle 14.00 Psicologi: su pianificazione di équipe, almeno 2 volte la settimana Assistente spirituale laico: su pianificazione in équipe, almeno 2 volte la settimana. Coordinatore presente prevalentemente dalle 08.00 alle 13.00 dal lunedì al venerdì. Riunione di équipe il giovedì dalle 13.30 alle 15.30. Risorse strumentali: letti articolati, ecografo, saturimetro, sfigmomanometro, sollevamalati, rollator, carrozzine, bascule, PC per cartella elettronica. Mensa, biblioteca e accesso internet secondo indicazioni dell'AOU che li gestisce.
<b>Contatti e riferimenti</b>	Indirizzo regione Gonzole 10, Orbassano Telefono 011 9026076 Fax ----- e-mail <a href="mailto:hospiceanemos@sanluigi.piemonte.it">hospiceanemos@sanluigi.piemonte.it</a>
<b>Come raggiungere il servizio</b> Mappa percorso Mezzi pubblici	<a href="http://www.sanluigi.piemonte.it/come_arrivare/">http://www.sanluigi.piemonte.it/come_arrivare/</a>



**Allegato 1**

**Problemi di salute / Problemi clinici / Percorso diagnostico terapeutici  
prevalentemente trattati**

Selezionare (X) i problemi di salute prevalenti e indicare le patologie più frequenti

**Malattie Oncologiche**

**X**

**Altro (specificare)**

**X**

In hospice possono essere ricoverate persone in fase avanzata di malattia affette da ogni patologia d'organo end stage

**Allegato 2**
**Diagnosi Infermieristiche prevalentemente trattate**

Selezionare (X) le caselle relative alle Diagnosi Infermieristiche e ai fattori correlati di interesse (riferimenti bibliografici: L.J.Carpenito-Diagnosi infermieristiche – 5th. ed. C.E.A. Edizioni, 2010)

Ansia	X
Fattori correlati	
<b>Fisiopatologici</b>	
X Qualsiasi fattore che interferisca con i bisogni relativi ad alimentazione, respirazione, comfort, sicurezza	
<b>Situazionali (personali, ambientali)</b>	
X Minaccia reale o percepita al concetto di sé (fallimento, modificazione dello status, mancato riconoscimento da parte degli altri...)	
X Perdita reale o percepita di persone significative	
X Minaccia reale o percepita all'integrità biologica (per malattia, violenza, procedure invasive, stato terminale)	
X Cambiamento ambientale reale o percepito (trasloco, ospedalizzazione, pensionamento, condizione di rifugiato, reclusione, calamità naturali, rischi per la sicurezza...)	
X Cambiamento reale o percepito delle condizioni socioeconomiche (disoccupazione, cambiamento di lavoro, licenziamento, promozione)	
<b>Fasi di sviluppo</b>	
X Neonato/bambino: separazione, ambiente e persone sconosciuti, variazioni dei rapporti con coetanei, morte di (specificare) con rituali non familiari e adulti in lutto	
X Adolescente: morte di (specificare), minaccia del concetto di se correlato a sviluppo sessuale, variazione dei rapporti con coetanei	
X Adulto: minaccia al concetto di se per gravidanza, ruolo genitoriale, cambiamento di carriera, effetti dell'invecchiamento, complicanze di una precedente gravidanza, aborto, o morte del feto, insufficiente conoscenza dell'esperienza del travaglio	
X Persona anziana: minaccia al concetto di se secondaria a perdite sensoriali, motorie, problemi finanziari, cambiamenti legati al pensionamento	

Attività, intolleranza all'attività	X
Fattori correlati	
<b>Fisiopatologici</b>	
Compromissione del sistema di apporto di ossigeno per	
X Sistema cardiaco (insufficienza cardiaca, valvolare, aritmie, infarto del miocardio, cardiopatia congenita, angina)	
X Sistema respiratorio (bronco pneumopatia cronica ostruttiva, atelectasia, dispnea broncopolmonare)	
X Sistema circolatorio (anemia, ipovolemia, arteriopatia periferica)	
<b>Aumento del fabbisogno metabolico per</b>	
X Infezioni acute o croniche (virali, epatite, mononucleosi, disordini endocrini/ metabolici)	
X Malattie croniche (renali, infiammatorie, neurologiche, epatiche, muscolo scheletriche)	
X Inadeguatezza delle fonti energetiche (per obesità, dieta inadeguata, malnutrizione)	
<b>Trattamenti</b>	
X Aumento del fabbisogno metabolico (per tumore maligno, intervento chirurgico, indagini diagnostiche, orario e frequenza trattamenti)	
X Compromissione del trasporto dell'ossigeno ( per ipovolemia, prolungato riposo a letto)	
<b>Situazionali (personali, ambientali)</b>	
X Inattività (secondaria a depressione, mancanza di motivazione, stile di vita	

sedentario, insufficiente conoscenza)

- X Aumento del fabbisogno metabolico (per utilizzo di ausili come deambulatore /stampelle /tutori, stress, dolore, barriere ambientali come ad es. scale, estremi climatici, inquinamento dell'aria)
- X Inadeguata motivazione (secondaria ad utilizzo di ausili, paura di cadere, depressione, obesità, dolore, dispnea)

**Fasi di sviluppo**

- X Processo di invecchiamento con diminuzione della forza e del tonico muscolare, comparsa di deficit sensoriali

**Cadute, rischio**

Vedere lesione, rischio

X

**Caregiver, tensione nel ruolo di /Rischio di**

X

Fattori correlati

**Fisiopatologici**

- X Esigenza di assistenza continua/ complessa (per condizioni debilitanti acute/progressive, tossicodipendenza, malattia dal decorso imprevedibile, demenza progressiva, malattia mentale cronica, disabilità)

**Trattamenti**

- X Responsabilità assistenziali legate per tutto l'arco delle 24 ore o assistenza che richiede tempo (dialisi, trasporto)

**Situazionali (personali, ambientali)**

- X Aspettative non realistiche dell'assistito nei confronti del caregiver
- X Modello di coping inefficace
- X Salute fisica compromessa
- X Relazioni inadeguate o disfunzioni familiari
- X Durata dell'assistenza richiesta
- X Isolamento
- X Pause di riposo/ svago insufficienti o
- X Risorse economiche insufficienti
- X Assenza o non disponibilità di sostegno

**Fasi di sviluppo**

- X Esigenza di assistenza continua secondaria a disabilità mentali (specificare) o disabilità fisiche (specificare)

**Coping inadeguato della famiglia**

X

Fattori correlati

**Biofisiopatologici**

- X Compromissione della capacità di esercitare la responsabilità di ruolo per malattia acuta/cronica

**Situazionali (personali, ambientali)**

- X Compromissione della capacità di gestire in modo costruttivo gli agenti stressanti (per dipendenza da sostanze, scarsa autostima, alcolismo, storia di relazioni inefficaci con i propri genitori, modelli di ruolo negativi, storia di relazioni abusive)
- X Aspettative non realistiche dei genitori nei confronti di se stessi/dei figli
- X Aspettative non realistiche dei figli nei confronti di se stessi/dei genitori
- X Bisogni psicosociali non soddisfatti dai genitori / dai figli

<b>Coping inefficace</b>	<b>X</b>
<p>Fattori correlati</p> <p><b>Fisiopatologici</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>X Cronicità della condizione, variazioni biochimiche dell'encefalo (disordine della personalità, disordine bipolare, schizofrenia, disordine da scarsa attenzione)</li> <li>X Complessità del regime di autocura, variazioni neurologiche nell'encefalo (Morbo di Alzheimer, infarto cerebrale, sclerosi multipla, malattie in stadio terminale)</li> <li>X Alterazione dell'integrità corporea (perdita di una parte del corpo, deturpazione)</li> <li>X Alterazione dello stato d'animo (per reazioni organiche, tumore cerebrale, assunzione di sostanze, reazioni organiche, ritardo mentale)</li> </ul> <p><b>Trattamenti</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>X Separazione dalla famiglia e dalla casa (ospedalizzazione, ricovero in struttura sanitaria residenziale, ecc)</li> </ul> <p><b>Situazionali (personali, ambientali)</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>X Scarso controllo degli impulsi e bassa tolleranza alla frustrazione</li> <li>X Criticità delle relazioni con genitori/caregiver</li> <li>X Disorganizzazione del sistema familiare</li> <li>X Inefficace capacità di problem solving</li> <li>X Aumento del consumo di cibo per reazione allo stress</li> <li>X Modificazione dell'ambiente (per guerre, mancanza di alloggio, lavoro precario, trasloco, povertà, disastro naturale)</li> <li>X Rottura legami affettivi (morte, separazione, diserzione, carcere, istituzionalizzazione, adozione/affidamento)</li> <li>X Sostegno insoddisfacente, sovraccarico sensoriale (ambiente di fabbrica, urbanizzazione, affollamento, inquinamento acustico, attività eccessiva)</li> <li>X Inadeguate risorse psicologiche (per scarsa autostima, considerazione di se negativa, senso di impotenza, mancanza di motivazione per reagire, modelli di ruolo negativi)</li> </ul> <p><b>Fasi di sviluppo</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>X Bambino/adolescente: inadeguato controllo degli impulsi, panico, rifiuto da parte dei coetanei, abuso di sostanze da parte dei genitori, metodi disciplinari incoerenti, trauma infantile, rifiuto dei genitori, paura di insuccessi)</li> <li>X Adolescente: modificazioni fisiche ed emozionali, relazioni sessuali, consapevolezza sessuale, scelte di carriera, indipendenza dalla famiglia, impegni scolastici.</li> <li>X Adulto giovane età: scelte di carriera, condizione di genitore, matrimonio, abbandono della casa dei genitori, esigenze formative.</li> <li>X Adulto mezza età: segni fisici di invecchiamento, bisogni relativi alla condizione sociale, problemi con i familiari, della cura dei figli, pressioni legate alla carriera, genitori anziani.</li> <li>X Persona anziana: inadeguatezza delle risorse psicologiche per modificazioni fisiche, reazioni degli altri verso l'anziano, pensionamento, cambiamento di residenza, di condizioni economiche</li> </ul>	

<b>Cura di sé, deficit (alimentazione)</b>	<b>X</b>
<p><b>Incapacità di (specificare):</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>X tagliare gli alimenti e/o aprire le confezioni</li> <li>X portare il cibo alla bocca</li> </ul>	
<p>Fattori correlati</p> <p><b>Fisiopatologici</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>X Mancanza di coordinazione motoria per (specificare)</li> <li>X Spasticità o flaccidità per (specificare)</li> <li>X Debolezza muscolare per (specificare)</li> <li>X Paralisi per (specificare)</li> <li>X Atrofia per (specificare)</li> <li>X Contratture muscolari per (specificare)</li> </ul>	

- X Stato comatoso
- X Disturbi visivi
- X Arti non funzionanti o mancanti
- X Regressione a un precedente stadio di sviluppo
- X Comportamenti ritualistici
- X Deficit somatici

**Trattamenti**

- X Uso di dispositivi esterni (apparecchio gessato, tutori ortopedici, infusione endovenosa...)
- X Affaticamento e dolore post operatori

**Situazionali (personali, ambientali)**

- X Deficit cognitivi
- X Dolore
- X Scarsa motivazione
- X Affaticamento
- X Confusione mentale
- X Ansia che paralizza

**Fasi di sviluppo**

- X Diminuita capacità motoria e visiva o a debolezza muscolare

**Cura di sé, deficit (bagno/igiene personale)**
**Ridotta e/o incapacità di (specificare):**

- X lavare il proprio corpo o parti
- X procurarsi l'acqua
- X regolare la temperatura o il flusso dell'acqua
- X percepire il bisogno di cure igieniche

**X**

## Fattori correlati

**Fisiopatologici**

- X Mancanza di coordinazione motoria per (specificare)
- X Spasticità o flaccidità per (specificare)
- X Debolezza muscolare per (specificare)
- X Paralisi per (specificare)
- X Atrofia per (specificare)
- X Contratture muscolari per (specificare)
- X Stato comatoso
- X Disturbi visivi
- X Arti non funzionanti o mancanti
- X Regressione a un precedente stadio di sviluppo
- X Comportamenti ritualistici
- X Deficit somatici

**Trattamenti**

- X Uso di dispositivi esterni (apparecchio gessato, tutori ortopedici, infusione endovenosa...)
- X Affaticamento e dolore post operatori

**Situazionali (personali, ambientali)**

- X Deficit cognitivi
- X Dolore
- X Scarsa motivazione
- X Affaticamento
- X Confusione mentale
- X Ansia che paralizza

**Fasi di sviluppo**

- X Diminuita capacità motoria e visiva o a debolezza muscolare

<b>Cura di sé, deficit (bagno/igiene personale)</b> <b>Ridotta e/o incapacità di (specificare):</b> <input checked="" type="checkbox"/> mettersi o togliersi vestiti, allacciare i vestiti <input checked="" type="checkbox"/> curare il proprio aspetto <input checked="" type="checkbox"/> acquistare o cambiare capi di vestiario <input checked="" type="checkbox"/> o il flusso dell'acqua <input checked="" type="checkbox"/> percepire il bisogno di cure igieniche	<b>X</b>
Fattori correlati <b>Fisiopatologici</b> <input checked="" type="checkbox"/> Mancanza di coordinazione motoria per (specificare) <input checked="" type="checkbox"/> Spasticità o flaccidità per (specificare) <input checked="" type="checkbox"/> Debolezza muscolare per (specificare) <input checked="" type="checkbox"/> Paralisi per (specificare) <input checked="" type="checkbox"/> Atrofia per (specificare) <input checked="" type="checkbox"/> Contratture muscolari per (specificare) <input checked="" type="checkbox"/> Stato comatoso <input checked="" type="checkbox"/> Disturbi visivi <input checked="" type="checkbox"/> Arti non funzionanti o mancanti <input checked="" type="checkbox"/> Regressione a un precedente stadio di sviluppo <input checked="" type="checkbox"/> Comportamenti ritualistici <input checked="" type="checkbox"/> Deficit somatici <b>Trattamenti</b> <input checked="" type="checkbox"/> Uso di dispositivi esterni (apparecchio gessato, tutori ortopedici, infusione endovenosa...) <input checked="" type="checkbox"/> Affaticamento e dolore post operatori <b>Situazionali (personali, ambientali)</b> <input checked="" type="checkbox"/> Deficit cognitivi <input checked="" type="checkbox"/> Dolore <input checked="" type="checkbox"/> Scarsa motivazione <input checked="" type="checkbox"/> Affaticamento <input checked="" type="checkbox"/> Confusione mentale <input checked="" type="checkbox"/> Ansia che paralizza <b>Fasi di sviluppo</b> <input checked="" type="checkbox"/> Diminuita capacità motoria e visiva o a debolezza muscolare	

<b>Cura di sé, deficit (eliminazione urinaria e fecale)</b> <b>Incapacità o mancanza di volontà per (specificare):</b> <input checked="" type="checkbox"/> servirsi del gabinetto/comoda <input checked="" type="checkbox"/> trasferirsi sul gabinetto/comoda <input checked="" type="checkbox"/> eseguire pratiche igieniche adeguate <input checked="" type="checkbox"/> pulire il gabinetto o la comoda <input checked="" type="checkbox"/> sistemare gli indumenti per servirsi del gabinetto	<b>X</b>
Fattori correlati <b>Fisiopatologici</b> <input checked="" type="checkbox"/> Mancanza di coordinazione motoria per (specificare) <input checked="" type="checkbox"/> Spasticità o flaccidità per (specificare) <input checked="" type="checkbox"/> Debolezza muscolare per (specificare) <input checked="" type="checkbox"/> Paralisi per (specificare) <input checked="" type="checkbox"/> Atrofia per (specificare) <input checked="" type="checkbox"/> Contratture muscolari per (specificare) <input checked="" type="checkbox"/> Stato comatoso <input checked="" type="checkbox"/> Disturbi visivi <input checked="" type="checkbox"/> Arti non funzionanti o mancanti <input checked="" type="checkbox"/> Regressione a un precedente stadio di sviluppo <input checked="" type="checkbox"/> Comportamenti ritualistici	

<p>X Deficit somatici</p> <p><b>Trattamenti</b></p> <p>X Uso di dispositivi esterni (apparecchio gessato, tutori ortopedici, infusione endovenosa...)</p> <p>X Affaticamento e dolore post operatori</p> <p><b>Situazionali (personali, ambientali)</b></p> <p>X Deficit cognitivi</p> <p>X Dolore</p> <p>X Scarsa motivazione</p> <p>X Affaticamento</p> <p>X Confusione mentale</p> <p>X Ansia che paralizza</p> <p><b>Fasi di sviluppo</b></p> <p>X Diminuita capacità motoria e visiva o a debolezza muscolare</p>
--

<b>Deambulazione, compromissione, rischio</b>	<b>X</b>
<b>Vedere mobilità, compromissione, rischio</b>	

<b>Dolore acuto (Grave fastidio o disagio che dura da 0 a 6 mesi)</b>	<b>X</b>
---	----------

<p>Fattori correlati</p> <p><b>Fisiopatologici</b></p> <p>Trauma tissutale e spasmi muscolari riflessi secondari a</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>X Disordini muscolo scheletrici (fratture, artrite, contrattura muscolare, spasmi, patologia a carico del midollo spinale)</li> <li>X Disordini viscerali (cardiaci, renali, epatici, intestinali, polmonari)</li> <li>X Cancro</li> <li>X Disordini vascolari (vasospasmo, occlusione, flebite, vasodilatazione/cefalea)</li> <li>X Infiammazione di nervi, tendini, capsula articolare, articolazioni, muscoli, strutture articolari.</li> <li>X Fatigue, malessere o prurito secondari a malattie infettive (rosolia, pancreatite, epatite, mononucleosi, varicella)</li> <li>X Effetti di un tumore su (specificare)</li> <li>X Dolori addominali, diarrea, vomito secondari a gastroenterite, ulcera gastrica, influenza.</li> <li>X Infiammazione e spasmi della muscolatura liscia per calcoli renali, infezioni gastrointestinali</li> <li>X Dolori durante il travaglio / parto, ingorgo mammario</li> </ul> <p><b>Trattamenti</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>X Trauma tissutale e spasmi muscolari riflessi (per intervento chirurgico, ustione, indagini diagnostiche/venipuntura/biopsia, scansiomertria invasiva)</li> <li>X Per nausea e vomito secondari a chemioterapia, anestesia, effetti collaterali (specificare)</li> </ul> <p><b>Situazionali (personali, ambientali)</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>X Febbre</li> <li>X Immobilità/posizionamento inappropriato</li> <li>X Iperattività</li> <li>X Punti di pressione (es.ingessatura o bendaggio stretti)</li> <li>X Risposta allergica</li> <li>X Irritanti chimici</li> <li>X Bisogno di dipendenza non soddisfatto</li> <li>X Ansia grave e repressa</li> </ul> <p><b>Fasi di sviluppo</b></p> <p>Trauma tissutale e spasmi muscolari riflessi secondari a</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>X 1 anno: coliche</li> <li>X Prima infanzia: dentizione, otalgia</li> <li>X Media infanzia: dolore addominale ricorrente, dolori della crescita</li> <li>X Adolescenza: cefalea, dolore toracico, dismenorrea.</li> </ul>
--

<b>Dolore cronico (Continuo/ intermittente che dura da più di 6 mesi)</b>	<b>X</b>
<p>Fattori correlati</p> <p><b>Fisiopatologici</b></p> <p>Trauma tissutale e spasmi muscolari riflessi secondari a</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>X Disordini muscolo scheletrici (fratture, artrite, contrattura muscolare, spasmi, patologia a carico del midollo spinale)</li> <li>X Disordini viscerali (cardiaci, renali, epatici, intestinali, polmonari)</li> <li>X Cancro</li> <li>X Disordini vascolari (vasospasmo, occlusione, flebite, vasodilatazione/cefalea)</li> <li>X Infiammazione di nervi, tendini, capsula articolare, articolazioni, muscoli, strutture articolari.</li> <li>X Fatigue, malessere o prurito secondari a malattie infettive (rosolia, pancreatite, epatite, mononucleosi, varicella)</li> <li>X Effetti di un tumore su (specificare)</li> <li>X Dolori addominali, diarrea, vomito secondari a gastroenterite, ulcera gastrica, influenza.</li> <li>X Infiammazione e spasmi della muscolatura liscia per calcoli renali, infezioni gastrointestinali</li> <li>X Dolori durante il travaglio / parto, ingorgo mammario</li> </ul> <p><b>Trattamenti</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>X Trauma tissutale e spasmi muscolari riflessi (per intervento chirurgico, ustione, indagini diagnostiche/venipuntura/biopsia, scansiomertria invasiva)</li> <li>X Per nausea e vomito secondari a chemioterapia, anestesia, effetti collaterali (specificare)</li> </ul> <p><b>Situazionali (personali, ambientali)</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>X Febbre</li> <li>X Immobilità/posizionamento inappropriato</li> <li>X Iperattività</li> <li>X Punti di pressione (es.ingessatura o bendaggio stretti)</li> <li>X Risposta allergica</li> <li>X Irritanti chimici</li> <li>X Bisogno di dipendenza non soddisfatto</li> <li>X Ansia grave e repressa</li> </ul>	
<b>Eliminazione urinaria compromessa</b>	<b>X</b>
<p><b>Per Incontinenza urinaria (specificare):</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>X Totale (continua, senza presenza di distensione della vescica e/o ritenzione di urine)</li> <li>X Da sforzo ( perdita involontaria di urine per aumento della pressione addominale)</li> <li>X Da urgenza (perdita involontaria di urine per urgenza minzionale)</li> <li>X Funzionale (per incapacità di raggiungere in tempo il gabinetto)</li> <li>X Riflessa (senza sensazione di pienezza vescicale o urgenza minzionale)</li> <li>X Da rigurgito ( presenza di distensione della vescica e/o ritenzione di urine)</li> </ul>	
<p>Fattori correlati</p> <p><b>Fisiopatologici</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>X Anomalie congenite delle vie urinarie</li> <li>X Diminuita capacità vescicale/irritazione vescicale (per infezione, glicosuria, carcinoma, uretrite, trauma)</li> <li>X Diminuzione dei segnali vescicali o del loro riconoscimento (per infezioni/tumori/lesioni midollo spinale, neuropatia alcolica e/o diabetica, malattie demielinizzanti, ictus cerebrale, parkinsonismo, sclerosi multipla, farmaci alfa adrenergici)</li> </ul> <p><b>Trattamenti</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>X Effetti di intervento chirurgico sullo sfintere vescicale (prostatectomia, dissezione pelvica estensiva)</li> </ul>	

<b>Fatigue</b>	<b>X</b>
Fattori correlati <b>Fisiopatologici</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>X Stato ipermetabolico (per malattie virali, febbre, gravidanza)</li> <li>X Inadeguata ossigenazione tissutale ( per BPCO, insufficienza cardiaca, anemia, malattia vascolare periferica)</li> <li>X Alterazioni biochimiche (per malattie endocrine e metaboliche come diabete mellito, ipotiroidismo, malattie ipofisarie, AIDS, M Addison, cirrosi epatica, insufficienza renale)</li> <li>X Debolezza muscolare (per miastenia gravis, sclerosi multipla,, SLA, M. Parkinson, AIDS)</li> <li>X Stato ipermetabolico, competizione tra organismo e neoplasia per i nutrienti, anemia fattori di stress associati a tumore</li> <li>X Deficit nutrizionali o alterazioni del metabolismo dei nutrienti (per nausea, vomito, diarrea, effetti collaterali dei farmaci, intervento chirurgico allo stomaco, diabete mellito)</li> <li>X Processo infiammatorio cronico (per AIDS, artrite, Lupus eritematoso, epatite, Cirrosi Epatica, malattia infiammatoria intestinale, insufficienza renale)</li> </ul> <b>Trattamenti</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>X Modificazioni biochimiche secondarie a chemioterapia, radioterapia, effetti collaterali di (specificare) danni tissutali da intervento chirurgico e anestesia,</li> <li>X Aumento del consumo energetico (per amputazione, alterazione dell'andatura, uso di deambulatore o stampelle)</li> </ul> <b>Situazionali (personali, ambientali)</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>X Diminuzione prolungata dell'attività (per ansia, febbre, diarrea, dolore, isolamento sociale, nausea/vomito, depressione, obesità)</li> <li>X Eccessive richieste di ruolo</li> <li>X Richieste emozionali soverchianti</li> <li>X Stress emotivo</li> <li>X Disturbi del sonno</li> </ul>	
<b>Immagine corporea, Disturbo/Rischio di</b>	<b>X</b>
Fattori correlati <b>Fisiopatologici</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>X Variazioni dell'aspetto per malattia cronica, trauma grave, perdita di una parte del corpo, perdita di una funzione organica, invecchiamento</li> </ul> <b>Trattamenti</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>X variazione dell'aspetto ( per ricovero ospedaliero, radioterapia, chemioterapia, intervento chirurgico)</li> </ul> <b>Situazionali (personali, ambientali)</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>X Trauma fisico secondario a abuso sessuale, stupro, aggressione (specificare)</li> <li>X Effetti sull'aspetto di obesità, immobilità, gravidanza (specificare)</li> </ul>	

Immobilizzazione, sindrome da	X
Fattori correlati <b>Fisiopatologici</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>X Riduzione del sensorio</li> <li>X Stato di incoscienza</li> <li>X Compromissione neuromuscolare (per sclerosi multipla, paralisi parziale/totale, distrofia muscolare, sindrome di Guillain-Barrè, parkinsonismo, lesione del midollo spinale)</li> <li>X Compromissione muscolo-scheletrica (per fratture e malattie reumatiche)</li> <li>X Malattia terminale (AIDS, cardiopatia, nefropatia)</li> <li>X Cancro</li> <li>X Disordini psichiatrici/della salute mentale (per depressione grave, stato catatonico, fobie gravi)</li> </ul> <b>Trattamenti</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>X Intervento chirurgico</li> <li>X Ventilazione meccanica</li> <li>X Linee venose</li> <li>X Trazione/gesso/tutore ortopedico</li> <li>X Immobilità prescritta</li> </ul> <b>Situazionali (personali, ambientali)</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>X Depressione</li> <li>X Fatigue</li> <li>X Stato di debilitazione</li> <li>X Dolore</li> </ul> <b>Fasi di sviluppo</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>X Neonato/bambino/adolescente: sindrome Down, artrite giovanile, osteogenesi imperfetta, paralisi cerebrale, disabilità mentale/fisica, autismo, spina bifida</li> <li>X Persona anziana: ridotta agilità motoria, debolezza muscolare, demenza presenile</li> </ul>	

Incontinenza fecale	X
Fattori correlati <b>Fisiopatologici</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>X Compromissione dello sfintere rettale ( per chirurgia anale/rettale, lesioni ostetriche, neuropatia periferica)</li> <li>X Compromissione delle funzioni cognitive</li> <li>X Iperdistensione rettale per stipsi cronica</li> <li>X Mancato controllo dello sfintere volontario (per malattia neuromuscolare progressiva, compressione/lesione del midollo spinale, ictus cerebrale, sclerosi multipla)</li> <li>X Trattamenti</li> <li>X Compromessa capacità del di fungere da serbatoio fecale per colectomia, proctite da radiazioni.</li> </ul> <b>Situazionali (personali, ambientali)</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>X Incapacità di riconoscere, interpretare o rispondere ai segnali intestinali (per depressione, compromissione delle funzioni cognitive)</li> </ul>	

Incontinenza urinaria da sforzo	X
Fattori correlati <b>Fisiopatologici</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>X Anomalie congenite delle vie urinarie</li> <li>X Alterazioni degenerative della muscolatura pelvica e dei legamenti per deficienza estrogenica</li> </ul> <b>Situazionali (personali, ambientali)</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>X Elevata pressione intra-addominale e debolezza della muscolatura pelvica per obesità, attività sessuale, gravidanza, inadeguata igiene personale</li> <li>X Debolezza della muscolatura pelvica e dei legamenti per parto, recente rilevante calo ponderale</li> </ul> <b>Fasi di sviluppo</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>X Persona anziana: perdita di tono muscolare</li> </ul>	
Incontinenza urinaria da urgenza	X
Fattori correlati <b>Fisiopatologici</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>X Diminuzione della capacità vescicale per infezione, malattie demielinizzanti, ictus cerebrale, trauma, uretrite, neuropatia diabetica, neuropatia alcolica, disturbi/lesioni neurologiche/tumori/infezioni, parkinsonismo</li> </ul> <b>Trattamenti</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>X Diminuzione della capacità vescicale per intervento chirurgico addominale,</li> <li>X Periodo successivo a cateterismo vescicale a permanenza</li> </ul> <b>Situazionali (personali, ambientali)</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>X Irritazione dei recettori vescicali da stiramento per uso di alcol, caffeina, eccessiva assunzione di liquidi</li> <li>X Diminuzione della capacità vescicale secondaria a minzioni frequenti</li> </ul> <b>Fasi di sviluppo</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>X Bambino: limitata capacità vescicale</li> <li>X Persona anziana: diminuita capacità vescicale</li> </ul>	
Incontinenza urinaria funzionale	X
Fattori correlati <b>Fisiopatologici</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>X Diminuzione di stimoli vescicali/compromessa capacità di riconoscerli per trauma, infezione, tumore cerebrale, parkinsonismo, sclerosi multipla, neuropatia alcolica, malattie demielinizzanti, ictus cerebrale, demenza progressiva</li> </ul> <b>Trattamenti</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>X Riduzione del tono vescicale per uso di antistaminici, terapia immunosoppressiva, adrenalina, diuretici, anticolinergici, tranquillanti, sedativi, miorilassanti</li> </ul> <b>Situazionali (personali, ambientali)</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>X Compromissione della mobilità</li> <li>X Diminuita attenzione nei confronti degli stimoli vescicali per depressione, soppressione intenzionale, confusione mentale</li> <li>X Barriere ambientali per l'accesso al bagno (gabinetto distante, letto troppo alto, scarsa illuminazione, spondine laterali, ambiente non familiare)</li> </ul> <b>Fasi di sviluppo</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>X Persona anziana: perdite motorie/sensitive</li> </ul>	

Incontinenza urinaria totale (compromessa eliminazione urinaria)	X
<p>Fattori correlati</p> <p><b>Fisiopatologici</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>X Anomalie congenite delle vie urinarie</li> <li>X Diminuita capacità vescicale o irritazione vescicale per trauma, carcinoma, infezione uretrite, glicosuria</li> <li>X Diminuzione dei segnali vescicali o compromessa capacità di riconoscerli per infezione/tumore/lesione del midollo spinale, neuropatia diabetica/alcolica, malattie demielinizzanti, ictus cerebrale, parkinsonismo, lesione cerebrale, sclerosi multipla</li> </ul> <p><b>Trattamenti</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>X Effetti del trattamento chirurgico sullo sfintere vescicale per prostatectomia, dissezione pelvica estensiva</li> <li>X Strumentazione diagnostica</li> <li>X Riduzione del tono muscolare per per anestesia generale o spinale, terapia farmacologica e iatrogenesi (farmaci miorilassanti, anestetici, diuretici, antistaminici, anticolinergici, immunodepressori, adrenalina, ansiolitici)</li> </ul> <p><b>Situazionali (personali, ambientali)</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>X Compromissione della mobilità</li> <li>X Diminuita attenzione nei confronti degli stimoli vescicali per depressione, soppressione intenzionale, confusione mentale</li> <li>X Barriere ambientali per l'accesso al bagno (gabinetto distante, letto troppo alto, scarsa illuminazione, sponde laterali, ambiente non familiare)</li> </ul> <p><b>Fasi di sviluppo</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>X Persona anziana: perdite motorie/sensitive</li> </ul>	
Infezione, rischio di	X
<p>Fattori correlati</p> <p><b>Fisiopatologici</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>X Compromissione delle difese dell'ospite per cancro, malattie respiratorie, ematologiche, periodontali, malattie epatiche, artrite, diabete mellito, malattie ereditarie, AIDS, alcolismo, immunosoppressione (secondaria a- specificare)</li> <li>X Compromissione della circolazione per linfedema, obesità, malattia vascolare periferica</li> </ul> <p><b>Trattamenti</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>X Sede di possibile invasione di microorganismi per intervento chirurgico, intubazione, linee invasive, nutrizione parenterale totale, dialisi, nutrizione enterale</li> <li>X Compromissione delle difese dell'ospite per terapia radiante, trapianto d'organo, terapia farmacologica (specificare)</li> </ul> <p><b>Situazionali (personali, ambientali)</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>X Compromissione delle difese dell'ospite per malattie infettive, stress, malnutrizione, prolungata degenza in ospedale, fumo, prolungata immobilità</li> <li>X Possibile sede di invasione di microorganismi per trauma accidentale/intenzionale, periodo postpartum, morso di insetto/animale/umano, lesione termica, ambiente caldo/umido/buio (apparecchio gessato, pieghe cutanee)</li> <li>X Contatto con agenti contaminanti (infezioni nosocomiali o di comunità)</li> </ul> <p><b>Fasi di sviluppo</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>X Neonato: maggiore vulnerabilità del neonato per madre HIV positiva, carenza di anticorpi materni, flora normale insufficiente, ferite aperte (ombelicale, circoncisione), sistema immunitario immaturo</li> <li>X Bambino-adolescente: maggiore vulnerabilità per perdita dell'immunizzazione, molteplici partner sessuali</li> <li>X Persona anziana: maggiore vulnerabilità per diminuzione della risposta immunitaria, condizione debilitante, malattia cronica)</li> </ul>	

<b>Insonnia</b>	<b>X</b>
Fattori correlati <b>Fisiopatologici</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>X Compromissione del trasporto di ossigeno (per angina, disturbi circolatori/respiratori,arteriosclerosi periferica)</li> <li>X Compromissione dell'eliminazione fecale o urinaria (per diarrea, disuria, ritenzione, incontinenza, stipsi, pollacchiuria)</li> <li>X Compromissione del metabolismo (per ipertiroidismo, disturbi epatici, ulcera gastrica)</li> </ul> <b>Situazionali (personali, ambientali)</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>X Eccessiva iperattività (per disturbo bipolare/ da deficit dell'attenzione, panico, uso di droghe)</li> <li>X Eccessivo dormire di giorno</li> <li>X Depressione</li> <li>X Inadeguata attività fisica durante il giorno</li> <li>X Dolore cronico</li> <li>X Risposte ansiose</li> <li>X Modifiche ambientali (specificare)</li> <li>X Paura</li> <li>X Frequenti risvegli dei bambini</li> <li>X Donna adulta: variazioni ormonali (es. Perimenopausa)</li> </ul>	
<b>Integrità cutanea/tissutale:compromissione, rischio</b>	<b>X</b>
Fattori correlati <b>Fisiopatologici</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>X Infiammazioni delle giunzioni dermo-epidermiche (per lupus eritematoso, sclerodermia,.</li> </ul>	
<b>Integrità mucosa orale, compromissione</b>	<b>X</b>
Fattori correlati <ul style="list-style-type: none"> <li>X Inadeguata igiene orale</li> <li>X Incapacità di provvedere all'igiene orale</li> </ul>	
<b>Lesione, rischio di</b>	<b>X</b>
Fattori correlati <b>Fisiopatologici</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>X Alterazioni delle funzioni cerebrali per ipossia (vertigini,sincope)</li> <li>X Alterazioni della mobilità (ictus cerebrale, artrite, parkinsonismo, perdita di un arto, compromissione della vista/udito)</li> <li>X Fatigue</li> <li>X Ipotensione ortostatica</li> <li>X Insufficienza vertebro basilare</li> <li>X Disturbi vestibolari</li> <li>X Inadeguata consapevolezza dei rischi ambientali (confusione mentale)</li> <li>X Movimenti tonico-clonici (convulsioni)</li> </ul> <b>Trattamenti</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>X Lungo allettamento</li> <li>X Effetti sulla mobilità/sensorio (sedativi, miorilassanti...specificare)</li> <li>X Gesso, stampelle, deambulatore, bastone</li> </ul> <b>Situazionali (personali, ambientali)</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>X Diminuzione o perdita memoria a breve termine</li> </ul>	

- X Alterata capacità di giudizio ( per stress, droghe, alcol, disidratazione, depressione)
  - X Pericoli domestici (pavimenti sdruciolevoli, scale, illuminazione insufficiente, ingressi/corridoi non sicuri, bagno, giocattoli non sicuri, impianto elettrico difettoso, veleni conservati in modo improprio)
  - X Pericoli legati all'uso dell'automobile (cinture, sedile di sicurezza per bambini, meccanica del veicolo non sicura)
  - X Pericolo di incendio
  - X Ambiente non familiare (es. Ospedale)
  - X Scarpe inadatte,
  - X Disattenzione del caregiver
  - X Uso improprio degli ausili
  - X Storia di incidenti
  - X Andatura instabile
- Fasi di sviluppo**
- X Bambino: inadeguata consapevolezza dei pericoli
  - X Persona anziana: alterata capacità di giudizio (per deficit cognitivi), stile di vita sedentario, perdita di forza muscolare

**Mobilità, compromissione /rischio di**
**X**

Fattori correlati

**Fisiopatologici**

- X riduzione della forza e della resistenza per compromissione neuromuscolare ( malattie autoimmunitarie, del sistema nervoso, respiratorie, distrofia muscolare, paralisi parziale, tumore del SNC, tumore, trauma, ipertensione endocranica, deficit sensoriale)
- X riduzione della forza e della resistenza per compromissione muscoloscheletrica (fratture, malattie del tessuto connettivo, condizioni cardiache)
- X rigidità delle articolazioni o contratture (per malattia infiammatoria, interventi endoprotesi ortopedica articolare, malattia degenerativa delle articolazioni e del disco)
- X edemi
- X apparecchi esterni (gesso/splint, corsetto ortopedico, catetere venoso)
- X forza/resistenza insufficienti per la deambulazione (protesi, stampelle, deambulatore)

**Situazionali (personali, ambientali)**

- X fatigue
- X obesità
- X mancanza di motivazione
- X dispnea
- X dolore

**Fasi di sviluppo**

- X Bambino: alterazione dell'andatura per deficienze scheletriche congenite, displasia congenita dell'anca, osteomielite
- X Persona anziana: diminuzione dell'agilità e debolezza muscolare

**Mobilità nel letto, mobilità con la sedia a rotelle, compromissione /rischio  
 Vedere mobilità, compromissione, rischio**
**X**

<b>Nausea</b>	<b>X</b>
Fattori correlati <b>Fisiopatologici</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>X Trauma tissutale e spasmi muscolari riflessi (per gastroenterite acuta, ulcera gastrica, sindrome colon irritabile, pancreatite, infezioni, tossoinfezioni alimentari, intossicazioni da farmaci, calcolosi renale, crampi uterini, malessere da movimento, stress) (specificare)</li> </ul> <b>Trattamenti</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>X Effetti della chemioterapia e/o farmaci</li> <li>X Effetti dell'anestesia</li> </ul>	
<b>Respirazione, inefficace funzionalità, rischio</b>	<b>X</b>
Fattori correlati <b>Fisiopatologici</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>X Secrezioni eccessive o dense (per infezione, infiammazione, allergia, patologie cardiopolmonari, fumo)</li> <li>X Immobilità stasi delle secrezioni, tosse inefficace (per malattie del SN, depressione del SNC/trauma cranico, ictus cerebrale, tetraplegia)</li> </ul> <b>Trattamenti</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>X Immobilità (per effetto sedativo di farmaci, droghe o sostanze chimiche, anestesia)</li> <li>X Soppressione del riflesso della tosse</li> <li>X Effetti della tracheostomia (alterazione delle secrezioni)</li> </ul> <b>Situazionali (personali, ambientali)</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>X Immobilità (per intervento chirurgico/trauma, compromissione percettiva/cognitiva, fatigue, dolore, paura, ansia)</li> <li>X Livello di umidità estremamente alto/basso (posizione prona nel sonno, esposizione a freddo, pianto, riso, allergeni, fumo)</li> </ul>	
<b>Stipsi</b>	<b>X</b>
Fattori correlati <b>Fisiopatologici</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>X Innervazione difettosa, debolezza della muscolatura pelvica immobilità (per lesioni/traumi del midollo spinale, spina bifida, ictus cerebrale, malattia neurologica, demenza)</li> <li>X Riduzione del metabolismo (per ipotiroidismo, iperparatiroidismo, obesità, feocromocitoma, uremia, neuropatia diabetica, ipo pituitarismo)</li> <li>X Diminuita risposta al bisogno di defecare (disturbi dell'umore)</li> <li>X Dolore alla defecazione (per emorroidi, lesione dorsale)</li> <li>X Diminuita peristalsi secondaria a ipossia cardiaca/polmonare</li> <li>X Disturbi della mobilità secondari a sindrome da intestino irritabile</li> <li>X Incapacità di rilassare lo sfintere anale e elevata pressione a riposo nel canale anale (parti vaginali multipli, sforzo cronico)</li> </ul> <b>Trattamenti</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>X Effetti collaterali di farmaci (specificare)</li> <li>X Effetti sulla peristalsi dell'anaestesia e della manipolazione chirurgica</li> <li>X Uso abituale di lassativi</li> <li>X Mucosite secondaria a radiazioni</li> </ul> <b>Situazionali (personali, ambientali)</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>X Diminuzione della peristalsi (per immobilità, gravidanza, stress, mancanza di esercizio fisico)</li> <li>X Modello di evacuazione irregolare</li> <li>X Credenze culturali/sulla salute</li> <li>X Mancanza di riservatezza</li> </ul>	

- |  |
|--|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>X Dieta priva di scorie, assunzione di liquidi inadeguata</li> <li>X Paura di dolore rettale o cardiaco</li> <li>X Valutazioni errate</li> <li>X Incapacità di percepire i segnali intestinali</li> </ul> |
|--|

<b>Stress, sovraccarico psicofisico</b>	<b>X</b>
---	----------

Fattori correlati

**Fisiopatologici**

- X Necessità di far fronte a malattie acute, croniche, terminali, nuove diagnosi, condizioni deturpanti

**Situazionali (personali, ambientali)**

- X Perdita reale o prevista di una persona significativa (per morte, divorzio, trasloco, servizio militare)
- X Necessità di far fronte a morte, aggressione, guerra
- X Variazione reale o percepita dello stato socio- economico (per disoccupazione, promozione, nuovo lavoro, pensionamento, distruzione di proprietà personali, perdita/cambiamento della casa, malattia)
- X Necessità di far fronte a violenza in famiglia, abuso di sostanza, nuovo componente familiare, problemi relazionali
- X Perdite funzionali

## Allegato 4

### APPRENDIMENTO OFFERTO

**In relazione alle diagnosi infermieristiche / problemi collaborativi sopra indicati, descrivere le opportunità formative per lo studente che caratterizzano la sede di apprendimento. Esempio: interventi assistenziali infermieristici, modelli organizzativi e/o di presa in carico assistenziale, attività di ricerca e innovazione.**

La sede offre la possibilità di apprendere come pianificare in equipè l'assistenza infermieristica specialistica erogata in setting residenziale. Gli interventi assistenziali sono in linea con il Core Competencies dell'Infermiere in Cure Palliative elaborato dalla SICP e disponibile qui:  
<https://www.sicp.it/aggiornamento/core-curriculum/2018/10/il-core-competence-italiano-dellinfermiere-in-cure-palliative/>

Il modello organizzativo che si sta sperimentando è quello del primary nursing.

Attività di ricerca periodica orientata a migliorare le conoscenze nel contesto delle CP.