

OFFERTA FORMATIVA DELLA SEDE DI TIROCINIO

S.P.D.C OSPEDALE SAN GIOVANNI BOSCO

Contesto	
<p>Tutor clinico Contatti e riferimenti</p>	<p>Nome LAURA Cognome CASTELLI Telefono 011/2402203 e-mail: laura.castelli@ascittaditorino.it castellilaura@ymail.com</p>
<p>Struttura/servizio Nominativo, ubicazione, ecc</p> <p>N°locali, n° posti letto</p> <p>Orari apertura al pubblico</p> <p>Orari di lavoro</p> <p>Figure professionali</p> <p>Risorse strumentali Servizi agli studenti (mensa, biblioteca, accesso internet, ecc)</p>	<p>S.P.D.C. Ospedale San Giovanni Bosco Piazza del Donatore di sangue, 3, 10154 Torino.</p> <p><u>Numero stanze degenti:</u> 3 con 4 posti letto ed 1 stanza singola (13 posti letto).</p> <p><u>Orari visite</u> su appuntamento dalle ore 15- 17.30</p> <p><u>Orari lavoro OSS/INFERMIERI:</u> Mattino: 7-14.47 Pomeriggio : 14.30- 22.30 Notte: 22.15- 7.15</p> <p><u>Personale :</u> Direttore di Dipartimento Direttore di struttura complessa Responsabili di struttura semplice Coordinatore Infermieristico Infermieri OSS Psicologi Segretaria</p> <p><u>Servizi:</u> Sala infermieri con postazione pc, internet limitato Infermeria 2 Studi medici Cucina/sala mensa Sala mensa per i pazienti Area fumatori Magazzino Locale veranda</p>

<p>Contatti e riferimenti</p> <p>Come raggiungere il servizio Mappa percorso Mezzi pubblici</p>	<p>Locale per lavapadelle Servizi igienici adibiti al personale</p> <p><u>Risorse strumentali</u>: pc, elettrocardiografo, misuratore parametri, carrello urgenze, defibrillatore, aspiratore, presidi per mobilitazione</p> <p>Recapito telefonico: 011/2402203 <u>Fax:0112402865</u> <u>E-mail: spdc.osgb@aslcittaditorino.it</u></p> <p>Linee 2, 4, 50, 57, 75</p>
--	--

Allegato 1

**Problemi di salute / Problemi clinici / Percorso diagnostico terapeutici
prevalentemente trattati**

Selezionare (X) i problemi di salute prevalenti e indicare le patologie più frequenti

SALUTE MENTALE

PSICOSI, DISTURBI DI PERSONALITA', DISTURBI DELL'UMORE

Dipendenze patologiche

DIPENDENZA DA SOSTANZE

Allegato 2

Diagnosi Infermieristiche prevalentemente trattate

Selezionare (X) le caselle relative alle Diagnosi Infermieristiche e ai fattori correlati di interesse
(riferimenti bibliografici: L.J.Carpenito-Diagnosi infermieristiche – 6th. ed. C.E.A. Edizioni, 2015)

Ansia	X
<p>Fattori correlati</p> <p>Fisiopatologici</p> <ul style="list-style-type: none"> ✗ Qualsiasi fattore che interferisca con i bisogni relativi ad alimentazione, respirazione, comfort, sicurezza <p>Situazionali (personali, ambientali)</p> <ul style="list-style-type: none"> ✗ Minaccia reale o percepita al concetto di sé (fallimento, modificazione dello status, mancato riconoscimento da parte degli altri...) ✗ Perdita reale o percepita di persone significative ✗ Minaccia reale o percepita all'integrità biologica (per malattia, violenza, procedure invasive, stato terminale) ✗ Cambiamento ambientale reale o percepito (trasloco, ospedalizzazione, pensionamento, condizione di rifugiato, reclusione, calamità naturali, rischi per la sicurezza...) ✗ Cambiamento reale o percepito delle condizioni socioeconomiche (disoccupazione, cambiamento di lavoro, licenziamento, promozione) <p>Fasi di sviluppo</p> <ul style="list-style-type: none"> ✗ Adolescente: morte di (specificare), minaccia del concetto di sé correlato a sviluppo sessuale, variazione dei rapporti con coetanei ✗ Adulto: minaccia al concetto di sé per gravidanza, ruolo genitoriale, cambiamento di carriera, effetti dell'invecchiamento, complicanze di una precedente gravidanza, aborto, o morte del feto, insufficiente conoscenza dell'esperienza del travaglio ✗ Persona anziana: minaccia al concetto di sé secondaria a perdite sensoriali, motorie, problemi finanziari, cambiamenti legati al pensionamento 	

Aspirazione, rischio di	X
<p>Fattori correlati</p> <p>Fisiopatologici</p> <ul style="list-style-type: none"> ✗ Riduzione del livello di coscienza (per demenza pre-senile, trauma cranico, ictus cerebrale, M.di Parkinson, induzione da alcol/sostanze, coma, convulsioni, anestesia) ✗ Depressione del riflesso della tosse/faringeo ✗ Compromissione della deglutizione o diminuzione dei riflessi laringeo/glottico <p>Trattamenti</p> <ul style="list-style-type: none"> ✗ Depressione dei riflessi laringeo/glottico (per sedazione) <p>Fasi di sviluppo</p> <ul style="list-style-type: none"> ✗ Persona anziana: dentizione inadeguata 	

Attaccamento genitore-bambino, compromesso /rischio di	×
<p>Fattori correlati</p> <p>Fisiopatologici</p> <p>Interruzione del processo di attaccamento per</p> <ul style="list-style-type: none"> ✗Malattia del genitore/ del bambino <p>Situazionali (personali, ambientali)</p> <ul style="list-style-type: none"> ✗Fattori stressanti associati alla nascita del bambino e ad altre responsabilità (problemi di salute, difficoltà nelle relazioni, abuso di sostanze, difficoltà economiche, malattia mentale) ✗Scarsa conoscenza e/o disponibilità dei modelli di ruolo genitoriale 	
Attività, intolleranza all'attività	×
<p>Fattori correlati</p> <p>Situazionali (personali, ambientali)</p> <ul style="list-style-type: none"> ✗Inattività (secondaria a depressione, mancanza di motivazione, stile di vita sedentario, insufficiente conoscenza) ✗ inadeguata motivazione (secondaria ad utilizzo di ausili, paura di cadere, depressione, obesità, dolore, dispnea) <p>Fasi di sviluppo</p> <ul style="list-style-type: none"> ✗ Processo di invecchiamento con diminuzione della forza e del trofismo muscolare, comparsa di deficit sensoriali 	
Autolesionismo, automutilazione, rischio di	×
<p>Fattori correlati</p> <p>Fisiopatologici</p> <ul style="list-style-type: none"> ✗Squilibri biochimici / neurofisiologici (disturbo bipolare, autismo, compromissione mentale) <p>Personali</p> <ul style="list-style-type: none"> ✗Pregressi episodi di autolesionismo ✗Abusi fisici, psichici, o sessuali ✗Inefficaci capacità di coping ✗Incapacità di esprimere verbalmente i sentimenti 	
Autostima, Disturbo/Rischio di	×
<p>Fattori correlati</p> <p>Fisiopatologici</p> <ul style="list-style-type: none"> ✗Variazione dell'aspetto (per perdita di parti del corpo, di una o più funzioni organiche) ✗Squilibri biochimici, neurofisiologici <p>Situazionali (personali, ambientali)</p> <ul style="list-style-type: none"> ✗Bisogno di dipendenza non soddisfatto ✗Senso di abbandono (per morte di una persona significativa, rapimento/uccisione di un figlio, separazione da una persona significativa) ✗Senso di fallimento (per perdita del lavoro/incapacità di lavorare, problemi economici, liti coniugali, parenti acquisiti, aumento/diminuzione del peso, separazione, disoccupazione, problemi relazionali, patrigno/matrigna) ✗Aggressione subita personalmente o di altra persona della stessa età / comunità ✗Insuccesso scolastico ✗Relazione inefficace con i propri genitori ✗Relazioni abusive 	

- ×Aspettative irrealistiche verso di se o verso i propri genitori/figli
- ×Rifiuto da parte dei genitori, punizioni incoerenti, abbandono o insuccesso correlato a istituzionalizzazione
- ×Storia di numerosi insuccessi

Fasi di sviluppo

- ×Età scolare: insuccesso scolastico, perdita del gruppo dei coetanei, ripetuti feedback negativi)
- ×Adolescente: perdita di autonomia/indipendenza per (specificare), rottura di relazioni con coetanei/amici, problemi scolastici, perdita di altre persona significative
- ×Adulto: per modificazioni associate a invecchiamento
- ×Persona anziana: per perdita di persone, funzioni, economiche, pensionamento

Avvelenamento, rischio

Vedere lesione, rischio



Cadute, rischio

Vedere lesione, rischio



Caregiver, tensione nel ruolo di /Rischio di



Fattori correlati

Fisiopatologici

- ×Esigenza di assistenza continua/ complessa (per condizioni debilitanti acute/progressive, tossicodipendenza, malattia dal decorso imprevedibile, demenza progressiva, malattia mentale cronica, disabilità)

Situazionali (personali, ambientali)

- ×Aspettative non realistiche dell'assistito nei confronti del caregiver
- ×Modello di coping inefficace
- ×Salute fisica compromessa
- ×Relazioni inadeguate o disfunzioni familiari
- ×Durata dell'assistenza richiesta
- ×Isolamento
- ×Pause di riposo/svago insufficienti
- ×Risorse economiche insufficienti
- ×Assenza o non disponibilità di sostegno

Fasi di sviluppo

- ×Esigenza di assistenza continua secondaria a disabilità mentali grave o disabilità fisiche

Casa, compromessa gestione



Fattori correlati

Situazionali (personali, ambientali)

- ×Modificazioni delle capacità funzionali di un membro della famiglia (specificare) per lesione (es. frattura di un arto/lesione del midollo spinale),intervento chirurgico, alterazione dello stato mentale (vuoti di memoria,depressione, ansia-panico grave), abuso di sostanze.
- ×Mancata disponibilità di un sistema di sostegno
- ×Perdita di un familiare
- ×Deficit di conoscenze
- ×Insufficienza di risorse economiche

Comunicazione, compromissione e Comunicazione verbale, compromissione (incapacità a pronunciare le parole ma è in grado di comprendere)	×
<p>Fattori correlati</p> <p>Fisiopatologici</p> <ul style="list-style-type: none"> ×Pensieri disordinati e non realistici secondari a schizofrenia, delirio, psicosi, paranoia <p>Situazionali (personali, ambientali)</p> <ul style="list-style-type: none"> ×Diminuita attenzione (per affaticamento collera, ansia, o dolore) ×Barriere psicologiche (paura, timidezza) ×Barriera linguistica (non disponibilità di interprete) <p>Fasi di sviluppo</p> <ul style="list-style-type: none"> ×Compromissione cognitiva per (specificare patologia) 	
Concetto di se, disturbo del	×
<p>Fattori correlati</p> <p>Situazionali (personali, ambientali)</p> <ul style="list-style-type: none"> ×Senso di abbandono/fallimento secondario a perdita del lavoro/della capacità di lavorare, divorzio, separazione o perdita di persona significativa ×Rapporti insoddisfacenti parentali /coniugali ×Preferenze sessuali ×Esperienze di violenza da parte dei genitori 	
Confusione mentale acuta	×
<p>Fattori correlati</p> <p>Fattori di rischio</p> <p>Trattamenti</p> <ul style="list-style-type: none"> ×Disturbo del metabolismo cerebrale per intervento chirurgico, intossicazione da farmaci, anestesia generale, astinenza da alcol, sedativi/ipnotici, metalli pesanti, monossido di carbonio, effetti collaterali dei farmaci (neurolettici/narcotici, anestesia generale, effetti collaterali da farmaci come diuretici, digitale, propanololo, atropina, ipoglicemizzanti, barbiturici,litio, fenitoina, acyclovir, anticolinergici, ecc) <p>Situazionali (personali, ambientali)</p> <ul style="list-style-type: none"> ×Disturbo del metabolismo cerebrale per astinebza da alcool, sedativi, ipnotici, intossicazione da metalli pesanti o da monossido di carbonio. ×Depressione, situazioni non familiari ×Intossicazioni chimiche o da farmaci (cocaina, eroina, metanfetamine, metadone, altri stupefacenti...) 	
Coping inadeguato della famiglia	×
<p>Fattori correlati</p> <p>Biofisiopatologici</p> <ul style="list-style-type: none"> ×Compromissione della capacità di esercitare la responsabilità di ruolo per malattia acuta/cronica <p>Situazionali (personali, ambientali)</p> <ul style="list-style-type: none"> ×Compromissione della capacità di gestire in modo costruttivo gli agenti stressanti (per dipendenza da sostanze, scarsa autostima, alcolismo, storia di relazioni inefficaci con i propri genitori, modelli di ruolo negativi, storia di relazioni abusive) ×Aspettative non realistiche dei genitori nei confronti di se stessi/dei figli ×Aspettative non realistiche dei figli nei confronti di se stessi/dei genitori ×Bisogni psicosociali non soddisfatti dai genitori / dai figli 	

Coping inefficace	X
<p>Fattori correlati</p> <p>Fisiopatologici</p> <ul style="list-style-type: none"> ✗Cronicità della condizione, variazioni biochimiche dell'encefalo (disordine della personalità, disordine bipolare, schizofrenia, disordine da scarsa attenzione) ✗Alterazione dell'integrità corporea (perdita di una parte del corpo, deturpazione) ✗Alterazione dello stato d'animo (per reazioni organiche, tumore cerebrale, assunzione di sostanze, reazioni organiche, ritardo mentale) <p>Trattamenti</p> <ul style="list-style-type: none"> ✗Separazione dalla famiglia e dalla casa (ospedalizzazione, ricovero in struttura sanitaria residenziale, ecc) <p>Situazionali (personali, ambientali)</p> <ul style="list-style-type: none"> ✗Scarso controllo degli impulsi e bassa tolleranza alla frustrazione ✗Criticità delle relazioni con genitori/caregiver ✗Disorganizzazione del sistema familiare ✗Inefficace capacità di problem solving ✗Aumento del consumo di cibo per reazione allo stress ✗Modificazione dell'ambiente (per guerre, mancanza di alloggio, lavoro precario, , trasloco, povertà, disastro naturale) ✗Rottura legami affettivi (morte, separazione, diserzione, carcere, istituzionalizzazione, adozione/affidamento) ✗Sostegno insoddisfacente, sovraccarico sensoriale (ambiente di fabbrica, urbanizzazione, affollamento, inquinamento acustico, attività eccessiva) ✗Inadeguate risorse psicologiche (per scarsa autostima, considerazione di se negativa, senso di impotenza, mancanza di motivazione per reagire, modelli di ruolo negativi) <p>Fasi di sviluppo</p> <ul style="list-style-type: none"> ✗Bambino/adolescente: inadeguato controllo degli impulsi, panico, rifiuto da parte dei coetanei, abuso di sostanze da parte dei genitori, metodi disciplinari incoerenti, trauma infantile, rifiuto dei genitori, paura di insuccessi) ✗Adolescente: modificazioni fisiche ed emozionali, relazioni sessuali, consapevolezza sessuale, scelte di carriera, indipendenza dalla famiglia, impegni scolastici. ✗Adulto giovane età: scelte di carriera, condizione di genitore, matrimonio, abbandono della casa dei genitori, esigenze formative. ✗Adulto mezza età: segni fisici di invecchiamento, bisogni relativi alla condizione sociale, problemi con i familiari, della cura dei figli, pressioni legate alla carriera, genitori anziani. ✗Persona anziana: inadeguatezza delle risorse psicologiche per modificazioni fisiche, reazioni degli altri verso l'anziano, pensionamento, cambiamento di residenza, di condizioni economiche 	

Cura di sé, deficit (alimentazione)	X
<p>Incapacità di (specificare):</p> <ul style="list-style-type: none"> ✗tagliare gli alimenti e/o aprire le confezioni ✗portare il cibo alla bocca 	
<p>Fattori correlati</p> <p>Fisiopatologici</p> <ul style="list-style-type: none"> ✗Mancanza di coordinazione motoria per confusione mentale ✗Debolezza muscolare causata da polifarmacoterapia o sedazione ✗Regressioni a un precedente stadio di sviluppo ✗Comportamenti ritualistici ✗Deficit somatici <p>Situazionali (personali, ambientali)</p> <ul style="list-style-type: none"> ✗Deficit cognitivi 	

- ×Dolore
- ×Scarsa motivazione
- ×Affaticamento
- ×Confusione mentale
- ×Ansia che paralizza

Cura di sé, deficit (bagno/igiene personale)

Ridotta e/o incapacità di (specificare):

- ×lavare il proprio corpo o parti
- ×regolare la temperatura o il flusso dell'acqua
- ×percepire il bisogno di cure igieniche

×

Fattori correlati

Fisiopatologici

- ×Mancanza di coordinazione motoria per confusione mentale
- ×Debolezza muscolare per sedazione da psicofarmaci
- ×Regressioni a un precedente stadio di sviluppo
- ×Comportamenti ritualistici
- ×Deficit somatici

Situazionali (personali, ambientali)

- ×Deficit cognitivi
- ×Dolore
- ×Scarsa motivazione
- ×Affaticamento
- ×Confusione mentale
- ×Ansia che paralizza

Cura di sé, deficit (bagno/igiene personale)

Ridotta e/o incapacità di (specificare):

- ×mettersi o togliersi vestiti, allacciare i vestiti
- × curare il proprio aspetto
- ×acquistare o cambiare capi di vestiario
- ×regolare la temperatura o il flusso dell'acqua
- ×percepire il bisogno di cure igieniche

×

Fattori correlati

Fisiopatologici

- ×Mancanza di coordinazione motoria per (confusione mentale)
- ×Debolezza muscolare per sedazione farmacologica
- ×Regressioni a un precedente stadio di sviluppo
- ×Comportamenti ritualistici
- ×Deficit somatici

Situazionali (personali, ambientali)

- ×Deficit cognitivi
- ×Scarsa motivazione
- ×Affaticamento
- ×Confusione mentale
- ×Ansia che paralizza

<p>Cura di sé, deficit (eliminazione urinaria e fecale) Incapacità o mancanza di volontà per (specificare):</p> <ul style="list-style-type: none"> ×servirsi del gabinetto/comoda ×trasferirsi sul gabinetto/comoda ×eseguire pratiche igieniche adeguate ×pulire il gabinetto o la comoda ×sistemare gli indumenti per servirsi del gabinetto 	×
<p>Fattori correlati</p> <p>Fisiopatologici</p> <ul style="list-style-type: none"> ×Mancanza di coordinazione motoria per confusione mentale ×Debolezza muscolare per sedazione farmacologica ×Regressioni a un precedente stadio di sviluppo ×Comportamenti ritualistici ×Deficit somatici <p>Situazionali (personali, ambientali)</p> <ul style="list-style-type: none"> ×Deficit cognitivi ×Dolore ×Scarsa motivazione ×Affaticamento ×Confusione mentale ×Ansia che paralizza 	

<p>Cura di sé, deficit (strumentale) Difficoltà a (specificare)</p> <ul style="list-style-type: none"> ×usare il telefono ×accedere ai mezzi di trasporto ×lavare e stirare ×preparare i pasti ×fare la spesa ×gestire il denaro ×assumere i farmaci 	×
<p>Fattori correlati</p> <p>Fisiopatologici</p> <ul style="list-style-type: none"> ×Mancanza di coordinazione motoria per confusione mentale ×Debolezza muscolare per sedazione farmacologica ×Regressioni a un precedente stadio di sviluppo ×Comportamenti ritualistici ×Deficit somatoformi <p>Situazionali (personali, ambientali)</p> <ul style="list-style-type: none"> ×Deficit cognitivi ×Dolore ×Scarsa motivazione ×Affaticamento ×Confusione mentale ×Ansia che paralizza 	

Deambulazione, compromissione, rischio Vedere mobilità, compromissione, rischio	×
Deglutizione, compromissione	×
<p>Fattori correlati</p> <p>Situazionali (personali, ambientali)</p> <ul style="list-style-type: none"> ✗Alterazione del livello di coscienza 	
Dolore acuto (Grave fastidio o disagio che dura da 0 a 6 mesi)	×
<p>Fattori correlati</p> <p>Fisiopatologici</p> <p>Trauma tissutale e spasmi muscolari riflessi secondari a</p> <ul style="list-style-type: none"> ✗Disordini muscolo scheletrici (fratture, artrite, contrattura muscolare, spasmi) <p>Situazionali (personali, ambientali)</p> <ul style="list-style-type: none"> ✗Febbre ✗Bisogno di dipendenza non soddisfatto ✗Ansia grave e repressa 	
Dolore cronico (Continuo/ intermittente che dura da più di 6 mesi)	×
<p>Fattori correlati</p> <p>Fisiopatologici</p> <p>Trauma tissutale e spasmi muscolari riflessi secondari a</p> <ul style="list-style-type: none"> ✗Disordini muscolo scheletrici (fratture, artrite, contrattura muscolare, spasmi) <p>Situazionali (personali, ambientali)</p> <ul style="list-style-type: none"> ✗Febbre ✗Immobilità/posizionamento inappropriato ✗Iperattività ✗Bisogno di dipendenza non soddisfatto ✗Ansia grave e repressa 	
Eliminazione urinaria compromessa Per Incontinenza urinaria (specificare):	×
<ul style="list-style-type: none"> ✗Da sforzo (perdita involontaria di urine per aumento della pressione addominale) ✗Da urgenza (perdita involontaria di urine per urgenza minzionale) ✗Funzionale (per incapacità di raggiungere in tempo il gabinetto) 	
<p>Fattori correlati</p> <p>Fisiopatologici</p> <ul style="list-style-type: none"> ✗Anomalie congenite delle vie urinarie ✗Diminuita capacità vescicale/irritazione vescicale (per infezione, glicosuria, carcinoma, uretrite, trauma) ✗Diminuzione dei segnali vescicali o del loro riconoscimento (per infezioni/tumori/lesioni midollo spinale, neuropatia alcolica e/o diabetica, ictus cerebrale, parkinsonismo, farmaci alfa adrenergici) 	



Fatigue	×
<p>Fattori correlati</p> <p>Situazionali (personali, ambientali)</p> <ul style="list-style-type: none"> ×Diminuzione prolungata dell'attività (per ansia, febbre, diarrea, dolore, isolamento sociale, nausea/vomito, depressione, obesità) ×Eccessive richieste di ruolo ×Richieste emozionali soverchianti ×Stress emotivo ×Disturbi del sonno 	
Immagine corporea, Disturbo/Rischio di	×
<p>Fattori correlati</p> <p>Fisiopatologici</p> <ul style="list-style-type: none"> ×Variazioni dell'aspetto per malattia cronica, trauma grave, perdita di una parte del corpo, perdita di una funzione organica, invecchiamento <p>Trattamenti</p> <ul style="list-style-type: none"> ×variazione dell'aspetto <p>Situazionali (personali, ambientali)</p> <ul style="list-style-type: none"> ×Trauma fisico secondario a abuso sessuale, stupro, aggressione (lesioni contusive da armi bianche) 	
Incontinenza fecale	×
<p>Fattori correlati</p> <p>Fisiopatologici</p> <ul style="list-style-type: none"> ×Compromissione delle funzioni cognitive <p>Situazionali (personali, ambientali)</p> <ul style="list-style-type: none"> ×Incapacità di riconoscere, interpretare o rispondere ai segnali intestinali (per depressione, compromissione delle funzioni cognitive) 	
Incontinenza urinaria da sforzo	×
<p>Fattori correlati</p> <p>Fasi di sviluppo</p> <ul style="list-style-type: none"> ×Persona anziana: perdita di tono muscolare 	
Incontinenza urinaria da urgenza	×
<p>Fattori correlati</p> <p>Situazionali (personali, ambientali)</p> <ul style="list-style-type: none"> ×Irritazione dei recettori vescicali da stiramento per uso di alcol, caffeina, eccessiva assunzione di liquidi <p>Fasi di sviluppo</p> <ul style="list-style-type: none"> ×Persona anziana:diminuita capacità vescicale 	

Incontinenza urinaria funzionale	×
<p>Fattori correlati</p> <p>Trattamenti</p> <ul style="list-style-type: none"> × Riduzione del tono vescicale per terapia farmacologica (farmaci ansiolitici) <p>Situazionali (personali, ambientali)</p> <ul style="list-style-type: none"> × Compromissione della mobilità × Diminuita attenzione nei confronti degli stimoli vescicali per depressione, soppressione intenzionale, confusione mentale <p>Fasi di sviluppo</p> <ul style="list-style-type: none"> × Persona anziana: perdite motorie/sensitive 	
Incontinenza urinaria totale (compromessa eliminazione urinaria)	×
<p>Fattori correlati</p> <p>Trattamenti</p> <ul style="list-style-type: none"> × Riduzione del tono muscolare per per terapia farmacologica <p>Situazionali (personali, ambientali)</p> <ul style="list-style-type: none"> × Compromissione della mobilità × Diminuita attenzione nei confronti degli stimoli vescicali per depressione, soppressione intenzionale, confusione mentale <p>Fasi di sviluppo</p> <ul style="list-style-type: none"> × Persona anziana: perdite motorie/sensitive 	
Infezione, rischio di	×
<p>Fattori correlati</p> <p>Fisiopatologici</p> <ul style="list-style-type: none"> × Compromissione delle difese dell'ospite per AIDS, alcolismo, immunosoppressione <p>Situazionali (personali, ambientali)</p> <ul style="list-style-type: none"> × Compromissione delle difese dell'ospite per malattie infettive, stress, malnutrizione, prolungata degenza in ospedale, fumo, prolungata immobilità × Contatto con agenti contaminanti (infezioni nosocomiali o di comunità) <p>Fasi di sviluppo</p> <ul style="list-style-type: none"> × Adolescente: maggiore vulnerabilità per perdita dell'immunizzazione, molteplici partner sessuali × Persona anziana: maggiore vulnerabilità per diminuzione della risposta immunitaria, condizione debilitante, malattia cronica) 	
Insonnia	×
<p>Fattori correlati</p> <p>Situazionali (personali, ambientali)</p> <ul style="list-style-type: none"> × Eccessiva iperattività (per disturbo bipolare/ da deficit dell'attenzione, panico, uso di droghe) × Eccessivo dormire di giorno × Depressione × Inadeguata attività fisica durante il giorno × Risposte ansiose × Modifiche ambientali (luci, rumore, temperatura, materasso...) × Paura 	

Integrità mucosa orale, compromissione	×
<p>Fattori correlati</p> <ul style="list-style-type: none"> ×Inadeguata igiene orale ×Incapacità di provvedere all'igiene orale 	
Lesione, rischio di	×
<p>Fattori correlati</p> <p>Fisiopatologici</p> <ul style="list-style-type: none"> ×Inadeguata consapevolezza dei rischi ambientali (confusione mentale) <p>Situazionali (personali, ambientali)</p> <ul style="list-style-type: none"> ×Diminuzione o perdita memoria a breve termine ×Alterata capacità di giudizio (per stress, droghe, alcol, disidratazione, depressione) ×Intossicazione farmaci/sostanze ×Pericolo di incendio ×Ambiente non familiare (es. Ospedale) ×Scarpe inadatte ×Andatura instabile <p>Fasi di sviluppo</p> <ul style="list-style-type: none"> ×Persona anziana: alterata capacità di giudizio (per deficit cognitivi), stile di vita sedentario, perdita di forza muscolare 	
Liquidi, insufficiente volume di	×
<p>Fattori correlati</p> <p>Situazionali (personali, ambientali)</p> <ul style="list-style-type: none"> ×Vomito/nausea ×Diminuita motivazione a bere (depressione, fatigue) ×Dieta scorretta/digiuno ×Uso eccessivo di lassativi o clisteri, diuretici, alcol, caffeina <p>Fasi di sviluppo</p> <ul style="list-style-type: none"> ×Persona anziana: aumentata vulnerabilità a ridotta riserva idrica, ridotta sensazione di sete 	
Memoria, compromissione	×
<p>Fattori correlati</p> <p>Fisiopatologici</p> <ul style="list-style-type: none"> ×Riduzione della quantità/qualità delle informazioni elaborate (per deficit visivi/uditivi, livello di istruzione, ridotte capacità intellettive, abitudini di apprendimento, benessere fisico insufficiente, affaticamento) <p>Trattamenti</p> <ul style="list-style-type: none"> ×Effetti dei farmaci sulla memorizzazione delle informazioni <p>Situazionali (personali, ambientali)</p> <ul style="list-style-type: none"> ×Eccessiva attenzione/preoccupazione per se stessi (per lutto, ansia, depressione) ×Consumo di alcol ×Mancanza di motivazione ×Inadeguata stimolazione ×Difficoltà di concentrazione (per stress, disturbi del sonno, dolore, inadeguata stimolazione intellettuale, distrazioni) 	

Mobilità, compromissione /rischio di	×
<p>Fattori correlati</p> <p>Situazionali (personali, ambientali)</p> <ul style="list-style-type: none"> ✗fatigue ✗mancanza di motivazione <p>Fasi di sviluppo</p> <ul style="list-style-type: none"> ✗Persona anziana: diminuzione dell'agilità e debolezza muscolare 	
Mobilità nel letto, mobilità con la sedia a rotelle, compromissione /rischio	×
<p>Vedere mobilità, compromissione, rischio</p>	
Nausea	×
<p>Fattori correlati</p> <p>Fisiopatologici</p> <ul style="list-style-type: none"> ✗Trauma tissutale e spasmi muscolari riflessi (per intossicazioni da farmaci, stress) 	
Non adesione (a indicazioni terapeutiche)	×
<p>Fattori correlati</p> <p>Fisiopatologici</p> <ul style="list-style-type: none"> ✗Compromessa capacità di prestazione a causa di una disabilità (scarsa memoria, deficit motori/sensitivi) ✗Aumento dei sintomi correlati alla malattia nonostante la precedente adesione al regime terapeutico consigliato <p>Trattamenti</p> <ul style="list-style-type: none"> ✗Effetti collaterali della terapia ✗Ambiente non terapeutico ✗Terapia complessa non controllata/prolungata ✗Pregresse esperienze di regime terapeutico consigliato inefficace <p>Situazionali (personali, ambientali)</p> <ul style="list-style-type: none"> ✗Malattia concomitante di un membro della famiglia (mancato sostegno da parte della famiglia/amici/comunità) ✗Barriere all'assistenza secondarie a mancanza di alloggio ✗Modificazione dello stato lavorativo ✗Modificazione della copertura assicurativa per le spese sanitarie ✗Barriere alla comprensione (per deficit cognitivi/visivi/uditivi, difficoltà di memoria, ansia, fatigue, ridotta attenzione, problemi motivazionali) 	
Nutrizione inferiore al fabbisogno, rischio di	×
<p>Fattori correlati</p> <p>Fisiopatologici</p> <ul style="list-style-type: none"> ✗Diminuzione dell'appetito (per alterazioni dello stato di coscienza) ✗Vomito autoindotto, esercizio fisico eccessivo in rapporto alle calorie assunte, anoressia ✗Rifiuto ad alimentarsi (timore di essere avvelenato/ comportamento paranoico) ✗Inappetenza/agitazione fisica (per disturbo bipolare) <p>Situazionali (personali, ambientali)</p> <ul style="list-style-type: none"> ✗Diminuzione dell'appetito (per nausea, vomito, isolamento sociale, stress, depressione, allergie) 	

Nutrizione superiore al fabbisogno	×
<p>Fattori correlati</p> <p>Fisiopatologici</p> <ul style="list-style-type: none"> ✗Alterato modello di sazietà <p>Trattamenti</p> <ul style="list-style-type: none"> ✗Alterazione del senso di sazietà (per farmaci, radiazioni) <p>Fasi di sviluppo</p> <ul style="list-style-type: none"> ✗Adulto/persona anziana: diminuzione del modello di attività /di fabbisogno metabolico 	
Respirazione, inefficace funzionalità, rischio	×
<p>Fattori correlati</p> <p>Fisiopatologici</p> <ul style="list-style-type: none"> ✗Secrezioni eccessive o dense (per infezione, fumo) <p>Trattamenti</p> <ul style="list-style-type: none"> ✗Immobilità (per effetto sedativo di farmaci, droghe o sostanze chimiche) <p>Situazionali (personali, ambientali)</p> <ul style="list-style-type: none"> ✗Immobilità (per compromissione percettiva/cognitiva, fatigue, dolore, paura, ansia) 	
Soffocamento, rischio	×
Vedere rischio di lesione	
Stipsi	×
<p>Fattori correlati</p> <p>Fisiopatologici</p> <ul style="list-style-type: none"> ✗Diminuita risposta al bisogno di defecare (disturbi dell'umore) <p>Trattamenti</p> <ul style="list-style-type: none"> ✗Effetti collaterali di farmaci (ansiolitici, antipsicotici) ✗Uso abituale di lassativi <p>Situazionali (personali, ambientali)</p> <ul style="list-style-type: none"> ✗Diminuzione della peristalsi (per immobilità, stress, mancanza di esercizio fisico) ✗Credenze culturali/sulla salute ✗Mancanza di riservatezza ✗Dieta priva di scorie, assunzione di liquidi inadeguata ✗Valutazioni errate ✗Incapacità di percepire i segnali intestinali 	

Stress, sovraccarico psicofisico	✘
<p>Fattori correlati</p> <p>Fisiopatologici</p> <ul style="list-style-type: none"> ✘Necessità di far fronte a malattie acute, croniche, terminali, nuove diagnosi, condizioni deturpanti <p>Situazionali (personali, ambientali)</p> <ul style="list-style-type: none"> ✘Perdita reale o prevista di una persona significativa (per morte, divorzio, trasloco, servizio militare) ✘Necessità di far fronte a morte, aggressione, guerra ✘Variazione reale o percepita dello stato socio- economico (per disoccupazione, promozione, nuovo lavoro, pensionamento, distruzione di proprietà personali, perdita/cambiamento della casa, malattia) ✘Necessità di far fronte a violenza in famiglia, abuso di sostanza, nuovo componente familiare, problemi relazionali ✘Perdite funzionali 	
Trasloco, stress da	✘
<p>Fattori correlati</p> <p>Fisiopatologici</p> <ul style="list-style-type: none"> ✘Compromissione della capacità di adattamento a nuovi ambienti per peggioramento dello stato di salute fisico (difficoltà fisiche), psico- sociale (stress prima del trasloco, depressione, diminuzione dell'autostima) <p>Situazionali (personali, ambientali)</p> <ul style="list-style-type: none"> ✘Risorse economiche insufficienti ✘Elevati livelli di cambiamenti (per ammissione in strutture residenziali/di assistenza) ✘Perdita di legami sociali/familiari ✘Abbandono ✘Modifica delle relazioni familiari ✘Scarsa/nessuna preparazione per l'imminente spostamento <p>Fasi di sviluppo</p> <ul style="list-style-type: none"> ✘Persona anziana: necessità della vicinanza dei familiari per l'assistenza, ammissione in struttura di assistenza 	
Trasferimento, compromissione, rischio Vedere mobilità, compromissione, rischio	✘
Trauma, rischio Vedere rischio di lesione	✘

Allegato 3
PROBLEMI COLLABORATIVI PRELEVALEMENTE TRATTATI

 Selezionare (X) le caselle relative ai problemi collaborativi di interesse
 (riferimenti bibliografici: L.J.Carpenito-Diagnosi infermieristiche - 5th. ed. C.E.A. Edizioni, 2015)

Rischio di complicanze (RC) per disfunzione cardiaca/ vascolare	
RC per aritmie	X
Rischio di complicanze (RC) per disfunzione metabolica/immunitaria/ematopoietica	
RC per ipo/iperglicemia	X
RC per squilibri elettrolitici	X
RC per reazione allergica	X
RC per infezioni opportunistiche	X
Rischio di complicanze (RC) per disfunzione neurologica / sensoriale	
RC per sindrome neurolettica maligna	X
RC per astinenza da alcol	X
Rischio di complicanze (RC) per effetti avversi (EA) della terapia farmacologica	
RC per effetti avversi della terapia con farmaci ansiolitici	X
RC per effetti avversi della terapia con farmaci antidepressivi	X
RC per effetti avversi della terapia con farmaci antipsicotici	X

Allegato 4

APPRENDIMENTO OFFERTO

In relazione alle diagnosi infermieristiche / problemi collaborativi sopra indicati, descrivere le opportunità formative per lo studente che caratterizzano la sede di apprendimento. Esempio: interventi assistenziali infermieristici, modelli organizzativi e/o di presa in carico assistenziale, attività di ricerca e innovazione.

- Sperimentare la relazione d'aiuto con il paziente psichiatrico
- Acquisire tecniche relazionali
- Gestire l'aggressività e acquisire tecniche relazionali volte a ridurla (de-escalation, contenimento emotivo)
- Preparazione e somministrazione di psicofarmaci
- Approfondimento TSO
- Lavoro in equipe multidisciplinare