

OFFERTA FORMATIVA DELLA SEDE DI TIROCINIO

Contesto	
<p>Tutor clinico Contatti e riferimenti</p>	<p>Nome ALESSANDRA Cognome CENTOLA Telefono 011 4393493/3495 e-mail alessandra.centola@unito.it</p>
<p>Struttura/servizio Nominativo, ubicazione N°locali, n° posti letto Orari apertura al pubblico Orari di lavoro Figure professionali Risorse strumentali Servizi agli studenti (mensa, biblioteca, accesso internet, ecc)</p>	<p>SC Urologia 1 – SSCC Ortogeriatría p.o. Maria Vittoria Padiglione E, Terzo Piano Urologia : 14 posti letto Ortogeriatría : 8 posti letto 1 locale medicheria; 2 locali sala medici; tisaneria; 2 locali adibiti a magazzino; 1 bagno per il personale; 2 bagni per i pazienti; 2 locali vuotavasi; sala di attesa per visitatori e pazienti in fase di prericovero</p> <p>Orari apertura al pubblico: 09:00 – 20:30 Turno mattino 07:00 - 14:47 Turno pomeriggio 14:30 - 22:30 Turno notte 22:15 - 07:15</p> <p>Figure professionali: CPSE, CPSI, OSS, personale medico di reparto (UROLOGI, ORTOPEDICI, INTERDIVISIONALI) e in consulenza (FISIOTERAPISTI, FISIATRI, DIETISTA ...), personale amministrativo</p> <p>Presidi di mobilitazione attiva e passiva (deambulatori, carrozzine, barelle, sollevatore)</p> <p>Locale spogliatoio, con annesso locale per consumazione pasti e servizi, ubicato presso il Padiglione C; Biblioteca presso ufficio infermieristico; Accesso ad internet nel reparto (utilizzabile dai PC aziendali)</p>
<p>Contatti e riferimenti</p>	<p>Indirizzo: Via Cibrario, 72 - Torino Telefono: 011 4393493/3495 Fax: 011 4393496 Coordinatore Infermieristico: Dott.ssa Scarafiotti Silvia</p>
<p>Come raggiungere il servizio Mappa percorso Mezzi pubblici</p>	<p>Linee GTT 2, 9, 13, 71 Metro fermata "Bernini"</p>

Allegato 1
Problemi di salute / Problemi clinici / Percorso diagnostico terapeutici prevalentemente trattati

Selezionare (X) i problemi di salute prevalenti e indicare le patologie più frequenti

Malattie Nefrologiche, genito/urinarie	X
Calcolosi urinarie (calcoli vescicali, ureterali, uretrali); Stenosi (ureterali, uretrali); Fimosi serrata; Varicocele; Idronefrosi; IPB (Iperplasia Prostatica Benigna)	
Malattie Oncologiche	X
Neoplasia vescicale; Neoplasia prostatica; Neoplasia renale; Tumori del testicolo	
Malattie Traumatologiche / incidenti	X
Traumi da caduta accidentale; fratture di arti e bacino	
Disabilità; Malattie ad alto grado di tutela	X
Malattia di Parkinson; Malattia di Alzheimer; Demenza senile	
Malattie Endocrinologiche, metaboliche	X
Diabete mellito (Tipo I, Tipo II); Ipotiroidismo	
Malattie Cardiovascolari	X
Aritmie (FA); Iperensione arteriosa; Scompenso cardiaco; Insufficienza valvolare; Cardiopatia ischemica	
Malattie Cerebrovascolari	X
VCC; Ictus; TIA	
Malattie Osteoarticolari	X
Coxartrosi; Gonartrosi; Artrite reumatoide; Artrite settica; Cedimenti vertebrali	
Malattie Respiratorie	X
Insufficienza respiratoria acuta e cronica; BPCO (BroncoPneumopatia Cronica Ostruttiva); Embolia polmonare acuta; Polmoniti	
Altro (specificare)	X
Malattie intestinali/digestive; Malattie infettive (HIV, HCV, HBV, KPC, VRE, CD); Malattia da dipendenza patologica (potus; TD)	

Allegato 2

Diagnosi Infermieristiche prevalentemente trattate

Selezionare (X) le caselle relative alle Diagnosi Infermieristiche e ai fattori correlati di interesse (riferimenti bibliografici: L.J. Carpenito-Diagnosi infermieristiche – 5th. ed. C.E.A. Edizioni, 2010)

Ansia	X
<p>Fattori correlati</p> <p>Fisiopatologici</p> <p>X Qualsiasi fattore che interferisca con i bisogni relativi ad alimentazione, respirazione, comfort, sicurezza</p> <p>Situazionali (personali, ambientali)</p> <p>X Minaccia reale o percepita al concetto di sé (fallimento, modificazione dello status, mancato riconoscimento da parte degli altri...)</p> <p>X Minaccia reale o percepita all'integrità biologica (per malattia, violenza, procedure invasive, stato terminale)</p> <p>X Cambiamento ambientale reale o percepito (trasloco, ospedalizzazione, pensionamento, condizione di rifugiato e/o senza fissa dimora, reclusione, calamità naturali, rischi per la sicurezza ...)</p> <p>Fasi di sviluppo</p> <p>X Persona anziana: minaccia al concetto di sé secondaria a perdite sensoriali, motorie, problemi finanziari, cambiamenti legati al pensionamento</p>	
Aspirazione, rischio di	X
<p>Fattori correlati</p> <p>Fisiopatologici</p> <p>X Riduzione del livello di coscienza (per demenza pre-senile, trauma cranico, ictus cerebrale, M.di Parkinson, induzione da alcol/sostanze, coma, convulsioni, anestesia)</p> <p>X Depressione dei riflessi della tosse/faringeo</p> <p>X Ritardato svuotamento gastrico (per ostruzione intestinale, sindrome da reflusso, ileo)</p> <p>X Aumento della pressione gastrica (per posizione ginecologica, ascite, obesità, dilatazione uterina)</p> <p>X Compromissione della deglutizione o diminuzione dei riflessi laringeo/glottico (per acalasia, condizioni debilitanti, miastenia grave, catatonìa, M di Parkinson, stenosi esofagea, ictus cerebrale, sclerosi multipla, sclerodermia, distrofia muscolare, sindrome di Guillain Barrè)</p> <p>X Compromissione dei riflessi protettivi (chirurgia o trauma facciale/orale/del collo, paraplegia/emiplegia)</p>	
Attività, intolleranza all'attività	X
<p>Fattori correlati</p> <p>Fisiopatologici</p> <p>Compromissione del sistema di apporto di ossigeno per</p> <p>X Sistema circolatorio (anemia, ipovolemia)</p> <p>Aumento del fabbisogno metabolico per</p> <p>X Infezioni acute o croniche (virali, epatite, mononucleosi, disordini endocrini/ metabolici)</p> <p>X Malattie croniche (muscolo scheletriche)</p> <p>X Inadeguatezza delle fonti energetiche (per obesità, dieta inadeguata, malnutrizione)</p> <p>Trattamenti</p> <p>X Compromissione del trasporto dell'ossigeno (per ipovolemia, prolungato riposo a letto)</p>	

Situazionali (personali, ambientali)

- X Inattività (secondaria a depressione, mancanza di motivazione, stile di vita sedentario, insufficiente conoscenza)
- X Aumento del fabbisogno metabolico (per utilizzo di ausili come deambulatore /stampelle tutori, stress, dolore, barriere ambientali come ad es. scale, estremi climatici, inquinamento dell'aria)
- X Inadeguata motivazione (secondaria ad utilizzo di ausili, paura di cadere, depressione, obesità, dolore, dispnea)

Fasi di sviluppo

- X Processo di invecchiamento con diminuzione della forza e del trofismo muscolare, comparsa di deficit sensoriali

Autostima, Disturbo/Rischio di

X

Fattori correlati

Fisiopatologici

- X Variazione dell'aspetto (per perdita di parti del corpo, di una o più funzioni organiche)
- X Deturpazione

Cadute, Rischio

Vedere lesione, rischio

X

Caregiver, tensione nel ruolo di / Rischio di

X

Fattori correlati

Fisiopatologici

X Esigenza di assistenza continua/ complessa (per condizioni debilitanti acute/progressive, tossicodipendenza, malattia dal decorso imprevedibile, demenza progressiva, malattia mentale cronica, disabilità)

Situazionali (personali, ambientali)

- X Aspettative non realistiche dell'assistito nei confronti del caregiver
- X Salute fisica compromessa
- X Relazioni inadeguate o disfunzioni familiari
- X Durata dell'assistenza richiesta
- X Assenza o non disponibilità di sostegno

**Comunicazione, compromissione e
Comunicazione verbale, compromissione**

X

(incapacità di pronunciare le parole ma è in grado di comprendere)

Fattori correlati

Fisiopatologici

X Patologia del sistema nervoso (es miastenia grave, distrofia muscolare, malattia di Alzheimer)

Trattamenti

X Compromissione della capacità di produrre il linguaggio (per intubazione endotracheale, tracheotomia, tracheostomia, laringectomia, intervento chirurgico cranico, al viso, al collo, alla bocca, dolore alla bocca o faringeo, depressione cognitiva da farmaci deprimenti il SNC/anestetici)

Situazionali (personali, ambientali)

- X Diminuita attenzione (per affaticamento, collera, ansia, o dolore)
- X Barriera linguistica (non disponibilità di interprete)

Concetto di se, disturbo del	X
<p>Fattori correlati</p> <p>Fisiopatologici</p> <p>X Variazioni dell'aspetto, dello stile di vita, di un ruolo o delle risposte altrui (per malattia cronica, dolore, trauma grave, perdita parti del corpo / funzioni organiche)</p> <p>Situazionali (personali, ambientali)</p> <p>X Immobilità o perdita di funzioni</p> <p>Fasi di sviluppo</p> <p>X Persona anziana (perdita di ruoli/responsabilità)</p>	
Confusione mentale acuta	X
<p>Fattori correlati</p> <p>Fattori di rischio</p> <p>Improvvisa insorgenza di ipossia cerebrale o disturbi del metabolismo cerebrale per:</p> <p>X Squilibri idroelettrolitici (disidratazione, ipovolemia, acidosi/alcalosi, iper/ipo calcemia, ipopotassiemia, ipo/iper natremia, ipo/iper glicemia)</p> <p>X Deficit nutrizionali (folati, vitamina B12, anemia, deficit niacina, deficit magnesio)</p> <p>X Disturbi cardiovascolari (infarto miocardio, insufficienza cardiaca congestizia, aritmie, blocco cardiaco, arterite temporale) ematoma subdurale)</p> <p>X Disordini respiratori (BPCO, embolia polmonare, TBC, polmonite)</p> <p>X Infezioni (sepsi, meningite, encefalite, infezione delle vie urinarie nell'anziano)</p> <p>X Disordini metabolici ed endocrini (iper/ipo tiroidismo, disfunzione ipofisaria, disturbi paratiroidi, del corticosurrene, ipotensione posturale, insufficienza epatica o renale)</p> <p>X Disordini del SNC (ictus cerebrale, idrocefalo normoteso, infarti multipli cerebrale, tumore, trauma cranico, crisi convulsive e stati post convulsivi)</p> <p>Trattamenti</p> <p>X Disturbo del metabolismo cerebrale per intervento chirurgico, intossicazione da farmaci, anestesia generale, astinenza da alcol, sedativi/ipnotici, metalli pesanti, monossido di carbonio, effetti collaterali dei farmaci (neurolettici/narcotici, anestesia generale, effetti collaterali da farmaci come diuretici, digitale, propanololo, atropina, ipoglicemizzanti, barbiturici, litio, fenitoina, acyclovir, anticolinergici, ecc)</p> <p>Situazionali (personali, ambientali)</p> <p>X Disturbo del metabolismo cerebrale per astinebza da alcool, sedativi, ipnotici, intossicazione da metalli pesanti o da monossido di carbonio.</p> <p>X Dolore, fecaloma, immobilità,</p> <p>X Depressione, situazioni non familiari</p> <p>X Intossicazioni chimiche o da farmaci (cocaina, eroina, metanfetamine, metadone, altri stupefacenti...)</p>	
Contaminazione, rischio di (della persona, della comunità della famiglia)	X
<p>Fattori correlati</p> <p>Fisiopatologici</p> <p>X Presenza di batteri, virus, tossine</p> <p>X Fattori nutrizionali (obesità, deficienze di vitamine e sali minerali)</p> <p>X Stati patologici pre-esistenti</p>	

Coping inefficace	X
<p>Fattori correlati</p> <p>Fisiopatologici</p> <p>X Cronicità della condizione, variazioni biochimiche dell'encefalo (disordine della personalità, disordine bipolare, schizofrenia, disordine da scarsa attenzione)</p> <p>X Complessità del regime di autocura, variazioni neurologiche nell'encefalo (Morbo di Alzheimer, infarto cerebrale, sclerosi multipla, malattie in stadio terminale)</p> <p>X Alterazione dell'integrità corporea (perdita di una parte del corpo, deturpazione)</p> <p>X Alterazione dello stato d'animo (per reazioni organiche, tumore cerebrale, assunzione di sostanze, reazioni organiche, ritardo mentale)</p> <p>Trattamenti</p> <p>X Separazione dalla famiglia e dalla casa (ospedalizzazione, ricovero in struttura sanitaria residenziale, ecc)</p> <p>Situazionali (personali, ambientali)</p> <p>X Scarso controllo degli impulsi e bassa tolleranza alla frustrazione</p> <p>X Criticità delle relazioni con genitori/caregiver</p> <p>X Disorganizzazione del sistema familiare</p> <p>X Inefficace capacità di problem solving</p>	
Cura di sé, deficit (alimentazione)	X
<p>Incapacità di (specificare):</p> <p>X tagliare gli alimenti e/o aprire le confezioni</p> <p>X portare il cibo alla bocca</p> <p>Fattori correlati</p> <p>Fisiopatologici</p> <p>X Arti non funzionanti o mancanti</p> <p>X Regressione a un precedente stadio di sviluppo</p> <p>Trattamenti</p> <p>X Uso di dispositivi esterni (apparecchio gessato, tutori ortopedici, infusione endovenosa...)</p> <p>X Affaticamento e dolore post operatori</p> <p>Situazionali (personali, ambientali)</p> <p>X Dolore</p> <p>X Deficit cognitivi</p> <p>X Confusione mentale</p> <p>X Scarsa motivazione</p> <p>X Affaticamento</p> <p>X Ansia che paralizza</p>	
Cura di sé, deficit (bagno/igiene personale)	X
<p>Ridotta e/o incapacità di (specificare):</p> <p>X lavare il proprio corpo o parti</p> <p>X procurarsi l'acqua</p> <p>X regolare la temperatura o il flusso dell'acqua</p> <p>X percepire il bisogno di cure igieniche</p> <p>Fattori correlati</p> <p>Fisiopatologici</p> <p>X Debolezza muscolare per (specificare)</p> <p>X Arti non funzionanti o mancanti</p> <p>X Atrofia per (specificare)</p> <p>X Stato comatoso</p> <p>X Regressione a un precedente stadio di sviluppo</p> <p>Trattamenti</p> <p>X Uso di dispositivi esterni (apparecchio gessato, tutori ortopedici, infusione endovenosa...)</p>	

<p>X Affaticamento e dolore post operatori</p> <p>Situazionali (personali, ambientali)</p> <p>X Dolore</p> <p>X Deficit cognitivi</p> <p>X Confusione mentale</p> <p>X Scarsa motivazione</p> <p>X Affaticamento</p> <p>X Ansia che paralizza</p>
--

<p>Cura di sé, deficit (bagno/igiene personale)</p> <p>Ridotta e/o incapacità di (specificare):</p> <p>X mettersi o togliersi vestiti, allacciare i vestiti</p> <p>X curare il proprio aspetto</p> <p>X acquistare o cambiare capi di vestiario</p> <p>X o il flusso dell'acqua</p> <p>X percepire il bisogno di cure igieniche</p>	X
<p>Fattori correlati</p> <p>Fisiopatologici</p> <p>X Debolezza muscolare per (specificare)</p> <p>X Arti non funzionanti o mancanti</p> <p>X Regressione a un precedente stadio di sviluppo</p> <p>Trattamenti</p> <p>X Uso di dispositivi esterni (apparecchio gessato, tutori ortopedici, infusione endovenosa...)</p> <p>X Affaticamento e dolore post operatori</p> <p>Situazionali (personali, ambientali)</p> <p>X Dolore</p> <p>X Deficit cognitivi</p> <p>X Confusione mentale</p> <p>X Scarsa motivazione</p> <p>X Affaticamento</p> <p>X Ansia che paralizza</p>	

<p>Cura di sé, deficit (eliminazione urinaria e fecale)</p> <p>Incapacità o mancanza di volontà per (specificare):</p> <p>X servirsi del gabinetto/comoda</p> <p>X trasferirsi sul gabinetto/comoda</p> <p>X eseguire pratiche igieniche adeguate</p> <p>X pulire il gabinetto o la comoda</p> <p>X sistemare gli indumenti per servirsi del gabinetto</p>	X
<p>Fattori correlati</p> <p>Fisiopatologici</p> <p>X Debolezza muscolare per (specificare)</p> <p>X Arti non funzionanti o mancanti</p> <p>X Regressione a un precedente stadio di sviluppo</p> <p>Trattamenti</p> <p>X Uso di dispositivi esterni (apparecchio gessato, tutori ortopedici, infusione endovenosa...)</p> <p>X Affaticamento e dolore post operatori</p> <p>Situazionali (personali, ambientali)</p> <p>X Dolore</p> <p>X Deficit cognitivi</p> <p>X Confusione mentale</p> <p>X Scarsa motivazione</p> <p>X Affaticamento</p> <p>X Ansia che paralizza</p>	

Deambulazione, compromissione, rischio Vedere mobilità, compromissione, rischio	X
Deglutizione, compromissione	X
Fattori correlati Fisiopatologici X Irritazione della cavità orofaringea Trattamenti X Riduzione della coscienza per anestesia Situazionali (personali, ambientali) X Alterazione del livello di coscienza X Fatigue	
Dolore acuto (Grave fastidio o disagio che dura da 0 a 6 mesi)	X
Fattori correlati Fisiopatologici Trauma tissutale e spasmi muscolari riflessi secondari a X Disordini muscolo scheletrici (fratture, artrite, contrattura muscolare, spasmi, patologia a carico del midollo spinale) X Disordini viscerali (cardiaci, renali, epatici, intestinali, polmonari) X Cancro X Disordini vascolari (vasospasmo, occlusione, flebite, vasodilatazione/cefalea) X Infiammazione di nervi, tendini, capsula articolare, articolazioni, muscoli, strutture articolari. X Infiammazione e spasmi della muscolatura liscia per calcoli renali, infezioni gastrointestinali Trattamenti X Trauma tissutale e spasmi muscolari riflessi (per intervento chirurgico, ustione, indagini diagnostiche/venipuntura/biopsia, scansiomertria invasiva) Situazionali (personali, ambientali) X Febbre X Immobilità/posizionamento inappropriato X Punti di pressione (es. ingessatura o bendaggio stretti) X Bisogno di dipendenza non soddisfatto X Ansia grave e repressa	
Dolore cronico (Continuo/intermittente che dura da più di 6 mesi)	X
Fattori correlati Fisiopatologici Trauma tissutale e spasmi muscolari riflessi secondari a X Disordini muscolo scheletrici (fratture, artrite, contrattura muscolare, spasmi, patologia a carico del midollo spinale) X Disordini viscerali (cardiaci, renali, epatici, intestinali, polmonari) X Cancro X Disordini vascolari (vasospasmo, occlusione, flebite, vasodilatazione/cefalea) X Infiammazione di nervi, tendini, capsula articolare, articolazioni, muscoli, strutture articolari. X Fatigue, malessere o prurito secondari a malattie infettive (rosolia, pancreatite, epatite, mononucleosi, varicella) X Effetti di un tumore su (specificare) X Dolori addominali, diarrea, vomito secondari a gastroenterite, ulcera gastrica, influenza. X Infiammazione e spasmi della muscolatura liscia per calcoli renali, infezioni gastrointestinali Trattamenti X Trauma tissutale e spasmi muscolari riflessi (per intervento chirurgico, ustione, indagini diagnostiche/venipuntura/biopsia, scansiomertria invasiva)	

X Per nausea e vomito secondari a chemioterapia, anestesia, effetti collaterali (specificare)

Situazionali (personali, ambientali)

- X Febbre
- X Punti di pressione (es. ingessatura o bendaggio stretti)
- X Ansia grave e repressa

Eliminazione urinaria compromessa

X

Per Incontinenza urinaria (specificare):

- X Da sforzo (perdita involontaria di urine per aumento della pressione addominale)
- X Da urgenza (perdita involontaria di urine per urgenza minzionale)
- X Riflessa (senza sensazione di pienezza vescicale o urgenza minzionale)

Fattori correlati

Fisiopatologici

- X Diminuita capacità vescicale/irritazione vescicale (per infezione, glicosuria, carcinoma, uretrite, trauma)
- X Diminuzione dei segnali vescicali o del loro riconoscimento (per infezioni/tumori/lesioni midollo spinale, neuropatia alcolica e/o diabetica, malattie demielinizzanti, ictus cerebrale, parkinsonismo, sclerosi multipla, farmaci alfa adrenergici)

Trattamenti

- X Effetti di intervento chirurgico sullo sfintere vescicale (prostatectomia, dissezione pelvica estensiva)

Fatigue

X

Fattori correlati

Fisiopatologici

- X Stato ipermetabolico (per malattie virali, febbre, gravidanza)
- X Inadeguata ossigenazione tissutale (per BPCO, insufficienza cardiaca, anemia, malattia vascolare periferica)
- X Alterazioni biochimiche (per malattie endocrine e metaboliche come diabete mellito, ipotiroidismo, malattie ipofisarie, AIDS, M Addison, cirrosi epatica, insufficienza renale)
- X Debolezza muscolare (per miastenia gravis, sclerosi multipla,, SLA, M. Parkinson, AIDS)
- X Stato ipermetabolico, competizione tra organismo e neoplasia per i nutrienti, anemia fattori di stress associati a tumore
- X Deficit nutrizionali o alterazioni del metabolismo dei nutrienti (per nausea, vomito, diarrea, effetti collaterali dei farmaci, intervento chirurgico allo stomaco, diabete mellito)
- X Processo infiammatorio cronico (per AIDS, artrite, Lupus eritematoso, epatite, Cirrosi Epatica, malattia infiammatoria intestinale, insufficienza renale)

Trattamenti

- X Modificazioni biochimiche secondarie a chemioterapia, radioterapia, effetti collaterali di (specificare) danni tissutali da intervento chirurgico e anestesia,
- X Aumento del consumo energetico (per amputazione, alterazione dell'andatura, uso di deambulatore o stampelle)

Situazionali (personali, ambientali)

- X Diminuzione prolungata dell'attività (per ansia, febbre, diarrea, dolore, isolamento sociale, nausea/vomito, depressione, obesità)
- X Eccessive richieste di ruolo
- X Richieste emozionali soverchianti
- X Stress emotivo
- X Disturbi del sonno

Immagine corporea, Disturbo/Rischio di	X
<p>Fattori correlati</p> <p>Fisiopatologici</p> <p>X Variazioni dell'aspetto per malattia cronica, trauma grave, perdita di una parte del corpo, perdita di una funzione organica, invecchiamento</p> <p>Trattamenti</p> <p>X Variazione dell'aspetto (per ricovero ospedaliero, radioterapia, chemioterapia, intervento chirurgico)</p>	
Immobilizzazione, sindrome da	X
<p>Fattori correlati</p> <p>Fisiopatologici</p> <p>X Stato di incoscienza</p> <p>X Compromissione muscolo-scheletrica (per fratture e malattie reumatiche)</p> <p>X Malattia terminale (AIDS, cardiopatia, nefropatia)</p> <p>X Cancro</p> <p>X Disordini psichiatrici/della salute mentale (per depressione grave, stato catatonico, fobie gravi)</p> <p>Trattamenti</p> <p>X Intervento chirurgico</p> <p>X Linee venose</p> <p>Situazionali (personali, ambientali)</p> <p>X Depressione</p> <p>X Fatigue</p> <p>X Stato di debilitazione</p> <p>X Dolore</p> <p>Fasi di sviluppo</p> <p>X Persona anziana: ridotta agilità motoria, debolezza muscolare, demenza presenile</p>	
Incontinenza fecale	X
<p>Fattori correlati</p> <p>Fisiopatologici</p> <p>X Compromissione dello sfintere rettale (per chirurgia anale/rettale, lesioni ostetriche, neuropatia periferica)</p> <p>X Compromissione delle funzioni cognitive</p> <p>X Iperdistensione rettale per stipsi cronica</p> <p>Trattamenti</p> <p>X Compromessa capacità del di fungere da serbatoio fecale per colectomia, proctite da radiazioni.</p> <p>Situazionali (personali, ambientali)</p> <p>X Incapacità di riconoscere, interpretare o rispondere ai segnali intestinali (per depressione, compromissione delle funzioni cognitive)</p>	
Incontinenza urinaria da sforzo	X
<p>Fattori correlati</p> <p>Fasi di sviluppo</p> <p>X Persona anziana: perdita di tono muscolare</p>	

Incontinenza urinaria da urgenza	X
<p>Fattori correlati</p> <p>Fisiopatologici</p> <p>X Diminuzione della capacità vescicale per infezione, malattie demielinizzanti, ictus cerebrale, trauma, uretrite, neuropatia diabetica, neuropatia alcolica, disturbi/lesioni neurologiche/tumori/infezioni, parkinsonismo</p> <p>Trattamenti</p> <p>X Diminuzione della capacità vescicale per intervento chirurgico addominale</p> <p>X Periodo successivo a cateterismo vescicale a permanenza</p> <p>Fasi di sviluppo</p> <p>X Persona anziana:diminuita capacità vescicale</p>	
Incontinenza urinaria funzionale	X
<p>Fattori correlati</p> <p>Fisiopatologici</p> <p>X Diminuzione di stimoli vescicali/compromessa capacità di riconoscerli per trauma, infezione, tumore cerebrale, parkinsonismo, sclerosi multipla, neuropatia alcolica, malattie demielinizzanti, ictus cerebrale, demenza progressiva</p> <p>Trattamenti</p> <p>X Riduzione del tono vescicale per uso di antistaminici, terapia immunosoppressiva, adrenalina, diuretici, anticolinergici, tranquillanti, sedativi, miorilassanti</p> <p>Situazionali (personali, ambientali)</p> <p>X Compromissione della mobilità</p> <p>X Diminuita attenzione nei confronti degli stimoli vescicali per depressione, soppressione intenzionale, confusione mentale</p> <p>X Barriere ambientali per l'accesso al bagno (gabinetto distante,letto troppo alto, scarsa illuminazione, spondine laterali, ambiente non familiare)</p> <p>Fasi di sviluppo</p> <p>X Persona anziana: perdite motorie/sensitive</p>	
Incontinenza urinaria totale (compromessa eliminazione urinaria)	X
<p>Fattori correlati</p> <p>Fisiopatologici</p> <p>X Diminuita capacità vescicale o irritazione vescicale per trauma, carcinoma, infezione uretrite, glicosuria</p> <p>X Diminuzione di stimoli vescicali/compromessa capacità di riconoscerli per trauma, infezione, tumore cerebrale, parkinsonismo, sclerosi multipla, neuropatia alcolica, malattie demielinizzanti, ictus cerebrale, demenza progressiva</p> <p>Trattamenti</p> <p>X Riduzione del tono vescicale per uso di antistaminici, terapia immunosoppressiva, adrenalina, diuretici, anticolinergici, tranquillanti, sedativi, miorilassanti</p> <p>Situazionali (personali, ambientali)</p> <p>X Compromissione della mobilità</p> <p>X Diminuita attenzione nei confronti degli stimoli vescicali per depressione, soppressione intenzionale, confusione mentale</p> <p>X Barriere ambientali per l'accesso al bagno (gabinetto distante,letto troppo alto, scarsa illuminazione, spondine laterali, ambiente non familiare)</p> <p>Fasi di sviluppo</p> <p>X Persona anziana: perdite motorie/sensitive</p>	

Infezione, rischio di	X
<p>Fattori correlati</p> <p>Fisiopatologici</p> <ul style="list-style-type: none"> X Compromissione delle difese dell'ospite per cancro, malattie respiratorie, ematologiche, periodontali, malattie epatiche, artrite, diabete mellito, malattie ereditarie, AIDS, alcolismo, immunosoppressione (secondaria a- specificare) X Compromissione della circolazione per linfedema, obesità, malattia vascolare periferica <p>Trattamenti</p> <ul style="list-style-type: none"> X Sede di possibile invasione di microorganismi per intervento chirurgico, intubazione, linee invasive, nutrizione parenterale totale, dialisi, nutrizione enterale <p>Situazionali (personali, ambientali)</p> <ul style="list-style-type: none"> X Compromissione delle difese dell'ospite per malattie infettive, stress, malnutrizione, prolungata degenza in ospedale, fumo, prolungata immobilità X Possibile sede di invasione di microorganismi per trauma accidentale/intenzionale, periodo postpartum, morso di insetto/animale/umano, lesione termica, ambiente caldo/umido/buio (apparecchio gessato, pieghe cutanee) X Contatto con agenti contaminanti (infezioni nosocomiali o di comunità) <p>Fasi di sviluppo</p> <ul style="list-style-type: none"> X Persona anziana: maggiore vulnerabilità per diminuzione della risposta immunitaria, condizione debilitante, malattia cronica) 	
Insonnia	X
<p>Fattori correlati</p> <p>Fisiopatologici</p> <ul style="list-style-type: none"> X Compromissione del trasporto di ossigeno (per angina, disturbi circolatori/respiratori, arteriosclerosi periferica) X Compromissione dell'eliminazione fecale o urinaria (per diarrea, disuria, ritenzione, incontinenza, stipsi, pollachiuria) X Compromissione del metabolismo (per ipertiroidismo, disturbi epatici, ulcera gastrica) <p>Situazionali (personali, ambientali)</p> <ul style="list-style-type: none"> X Eccessiva iperattività (per disturbo bipolare/ da deficit dell'attenzione, panico, uso di droghe) X Eccessivo dormire di giorno X Depressione X Inadeguata attività fisica durante il giorno X Dolore cronico X Risposte ansiose X Modifiche ambientali (specificare) X Paura 	
Integrità cutanea/tissutale: compromissione, rischio	X
<p>Fattori correlati</p> <p>Fisiopatologici</p> <ul style="list-style-type: none"> X Infiammazioni delle giunzioni dermo-epidermiche (per lupus eritematoso, sclerodermia, etc) 	
Integrità mucosa orale : compromissione	X
<p>Fattori correlati</p> <p>Fisiopatologici</p> <ul style="list-style-type: none"> X Diabete, infezione, malattia parodontale X Inadeguata igiene orale X incapacità di provvedere all'igiene orale <p>Trattamenti</p>	

- X Digiuno da più di 24 ore
- X Ossigenoterapia, uso prolungato di farmaci (sedativi, diuretici, ...)
- X Irritazione meccanica da sondino naso gastrico, cannula endotracheale
- Situazionali (personali, ambientali)**
- X Trauma meccanico (denti rotti, scheggiati, protesi dentarie inadatte, tutori...)

Ipotermia

X

Fattori correlati

Situazionali

- X Assenza di condizionamento dell'aria
- X Diminuzione della circolazione (per persona sovrappeso/sottopeso, disidratazione, consumo di alcol, inattività)

Fasi di sviluppo

- X Inefficacia della termoregolazione secondaria all'età (es. neonato, anziano)

Lesione, rischio di

X

Fattori correlati

Fisiopatologici

- X Alterazioni delle funzioni cerebrali per ipossia (vertigini, sincope)
- X Alterazioni della mobilità (ictus cerebrale, artrite, parkinsonismo, perdita di un arto, compromissione della vista/udito)
- X Fatigue
- X Ipotensione ortostatica
- X Inadeguata consapevolezza dei rischi ambientali (confusione mentale)
- X Movimenti tonico-clonici (convulsioni)

Trattamenti

- X Lungo allettamento
- X Effetti sulla mobilità/sensorio (sedativi, miorilassanti...specificare)
- X Gesso, stampelle, deambulatore, bastone

Situazionali (personali, ambientali)

- X Diminuzione o perdita memoria a breve termine
- X Alterata capacità di giudizio (per stress, droghe, alcol, disidratazione, depressione)
- X Ambiente non familiare (es. Ospedale)
- X Scarpe inadatte,
- X Disattenzione del caregiver
- X Uso improprio degli ausili
- X Andatura instabile

Fasi di sviluppo

- X Persona anziana: alterata capacità di giudizio (per deficit cognitivi), stile di vita sedentario, perdita di forza muscolare

Lesione da posizionamento perioperatorio, rischio

X

Fattori correlati

Fisiopatologici

- X Aumentata vulnerabilità (per malattia cronica, cancro, corporatura esile, terapia radiante, osteoporosi, compromissione del sistema immunitario, disfunzione renale/epatica, infezione)
- X Compromissione della perfusione tissutale (per diabete mellito, anemia, ascite, malattia cardiovascolare, ipotermia, disidratazione, vasculopatia periferica, trombosi, edemi)
- X Vulnerabilità della stomia durante il posizionamento
- X Contratture preesistenti/alterazioni fisiche (artrite reumatoide, poliomielite)

Trattamenti

X Necessità di posizionamento e perdita delle abituali risposte sensoriali/protettive per anestesia
 X Procedure chirurgiche della durata di 2 o più ore
Situazionali (personali, ambientali)
 X Compromissione circolatoria (obesità, consumo di tabacco, gravidanza, neonato, temperatura bassa in sala operatoria, anziano)
Fasi di sviluppo
 X Aumentata vulnerabilità alle lesioni tissutali (condizione infantile, età avanzata)

Liquidi, eccessivo volume di

X

Fattori correlati
Fisiopatologici
 X Compromissione dei meccanismi regolatori (per insufficienza renale acuta/cronica, disfunzioni endocrine, anomalie sistemiche metaboliche, lipoedema)
 X Ipertensione portale, diminuzione della pressione colloidale-osmotica e ritenzione di sodio (per epatopatia, cancro, cirrosi, ascite)
 X Anomalie venose e arteriose (vene varicose, vasculopatia periferica, Trombosi, flebite, immobilità, linfoedema, infezioni, trauma, neoplasie)
Trattamenti
 X Ritenzione di sodio e acqua (terapia corticosteroidica)
 X Inadeguato drenaggio linfatico (mastectomia)
Situazionali (personali, ambientali)
 X Inadeguato apporto proteico (dieta squilibrata, malnutrizione)
 X Ristagno venoso declive/venostasi (per immobilità, prolungata stazione eretta/posizione seduta, gesso/fasciatura stretta)

Liquidi, insufficiente volume di

X

Fattori correlati
Fisiopatologici
 X Eccessiva emissione di urine (per diabete mellito insipido, diabete mellito scompensato)
 X Perdite (febbre, aumento del metabolismo, drenaggio accentuato, ferite, peritonite, diarrea, menorragia)
Situazionali (personali, ambientali)
 X Vomito/nausea
 X Diminuita motivazione a bere (depressione, fatigue)
 X Perdita eccessiva (cateteri a permanenza, drenaggi)
Fasi di sviluppo
 X Persona anziana: aumentata vulnerabilità a ridotta riserva idrica, ridotta sensazione di sete

Memoria, compromissione

X

Fattori correlati
Fisiopatologici
 X Alterazioni del SNC (per malattia cerebrale degenerativa, ictus cerebrale, lesione/trauma cranico)
 X Riduzione della quantità/qualità delle informazioni elaborate (per deficit visivi/uditivi, livello di istruzione, ridotte capacità intellettive, abitudini di apprendimento, benessere fisico insufficiente, affaticamento)
 X Deficienze nutrizionali
Trattamenti
 X Effetti dei farmaci sulla memorizzazione delle informazioni
Situazionali (personali, ambientali)
 X Eccessiva attenzione/preoccupazione per se stessi (per lutto, ansia, depressione)

X Consumo di alcol
X Mancanza di motivazione
X Inadeguata stimolazione
X Difficoltà di concentrazione (per stress, disturbi del sonno, dolore, inadeguata stimolazione intellettuale, distrazioni)

Mobilità, compromissione /rischio di

X

Fattori correlati

Fisiopatologici

X Riduzione della forza e della resistenza per compromissione muscoloscheletrica (fratture, malattie del tessuto connettivo, condizioni cardiache)

X Edemi

X Apparecchi esterni (gesso/splint, corsetto ortopedico, catetere venoso)

X Forza/resistenza insufficienti per la deambulazione (protesi, stampelle, deambulatore)

Situazionali (personali, ambientali)

X Fatigue

X Obesità

X Mancanza Di Motivazione

X Dispnea

X Dolore

Fasi di sviluppo

X Persona anziana: diminuzione dell'agilità e debolezza muscolare

**Mobilità nel letto, mobilità con la sedia a rotelle, compromissione /rischio
Vedere mobilità, compromissione, rischio**

X

Nausea

X

Fattori correlati

Fisiopatologici

X Trauma tissutale e spasmi muscolari riflessi (per gastroenterite acuta, ulcera gastrica, sindrome colon irritabile, pancreatite, infezioni, tossoinfezioni alimentari, intossicazioni da farmaci, calcolosi renale, crampi uterini, malessere da movimento, stress) (specificare)

Trattamenti

X Effetti della chemioterapia e/o farmaci

X Effetti dell'anestesia

Non adesione (a indicazioni terapeutiche)

X

Fattori correlati

Fisiopatologici

X Compromessa capacità di prestazione a causa di una disabilità (scarsa memoria, deficit motori/sensitivi)

X Aumento dei sintomi correlati alla malattia nonostante la precedente adesione al regime terapeutico consigliato

Trattamenti

X Effetti collaterali della terapia

X Pregresse esperienze di regime terapeutico consigliato inefficace

Situazionali (personali, ambientali)

X Barriere alla comprensione (per deficit cognitivi/visivi/uditivi, difficoltà di memoria, ansia, fatigue, ridotta attenzione, problemi motivazionali)

Nutrizione inferiore al fabbisogno, rischio di	X
<p>Fattori correlati</p> <p>Fisiopatologici</p> <p>X Aumentato fabbisogno calorico e difficoltà ad assumere sufficienti calorie (per ustione, trauma, complicanze/deformazioni gastrointestinali, cancro, alcolismo, uso di sostanze stupefacenti, infezione, AIDS)</p> <p>X Disfagia (per ictus cerebrale, M.di Parkinson, palatoschisi, distrofia muscolare, paralisi cerebrale, paralisi facciale, SLA, disturbi neuromuscolari)</p> <p>X Diminuito assorbimento di nutrienti (per M.di Crohn, enterocolite necrotizzante, intolleranza al lattosio, fibrosi cistica)</p> <p>X Diminuzione dell'appetito (per alterazioni dello stato di coscienza)</p> <p>X Rifiuto ad alimentarsi (timore di essere avvelenato/ comportamento paranoico)</p> <p>X Inappetenza/agitazione fisica (per disturbo bipolare)</p> <p>X Inappetenza e diarrea (per infezione da protozoi)</p> <p>X Vomito, inappetenza e alterazioni della digestione (per pancreatite)</p> <p>X Inappetenza e compromissione del metabolismo proteico/lipidico, ipovitaminosi (per cirrosi epatica)</p> <p>X Inappetenza, vomito e alterazione della digestione (per malformazioni del tratto gastrointestinale /enterocolite necrotizzante)</p> <p>X Inappetenza per reflusso gastroesofageo</p>	
Respirazione, inefficace funzionalità, rischio	X
<p>Fattori correlati</p> <p>Fisiopatologici</p> <p>X Secrezioni eccessive o dense (per infezione, infiammazione, allergia, patologie cardiopolmonari, fumo)</p> <p>X Immobilità stasi delle secrezioni, tosse inefficace (per malattie del SN, depressione del SNC/trauma cranico, ictus cerebrale, tetraplegia)</p> <p>Trattamenti</p> <p>X Immobilità (per effetto sedativo di farmaci, droghe o sostanze chimiche, anestesia)</p> <p>X Soppressione del riflesso della tosse</p> <p>X Effetti della tracheostomia (alterazione delle secrezioni)</p> <p>Situazionali (personali, ambientali)</p> <p>X Immobilità (per intervento chirurgico/trauma, compromissione percettiva/cognitiva, fatigue, dolore, paura, ansia)</p> <p>X Livello di umidità estremamente alto/basso (posizione prona nel sonno, esposizione a freddo, pianto, riso, allergeni, fumo)</p>	
Stipsi	X
<p>Fattori correlati</p> <p>Fisiopatologici</p> <p>X Riduzione del metabolismo (per ipotiroidismo, iper paratiroidismo, obesità, feocromocitoma, uremia, neuropatia diabetica)</p> <p>X Diminuita risposta al bisogno di defecare (disturbi dell'umore)</p> <p>X Dolore alla defecazione (per emorroidi, lesione dorsale)</p> <p>X Diminuita peristalsi secondaria a ipossia cardiaca/polmonare</p> <p>X Disturbi della mobilità secondari a sindrome da intestino irritabile</p> <p>X Incapacità di rilassare lo sfintere anale e elevata pressione a riposo nel canale anale (parti vaginali multipli, sforzo cronico)</p> <p>Trattamenti</p> <p>X Effetti collaterali di farmaci</p> <p>X Effetti sulla peristalsi dell'anestesia e della manipolazione chirurgica</p>	



Situazionali (personali, ambientali)

- X Diminuzione della peristalsi (per immobilità, gravidanza, stress, mancanza di esercizio fisico)
- X Modello di evacuazione irregolare
- X Mancanza di riservatezza
- X Dieta priva di scorie, assunzione di liquidi inadeguata
- X Paura di dolore rettale o cardiaco
- X Valutazioni errate
- X Incapacità di percepire i segnali intestinali

Stress, sovraccarico psicofisico

X

Fattori correlati

Fisiopatologici

- X Necessità di far fronte a malattie acute, croniche, terminali, nuove diagnosi, condizioni deturpanti

Allegato 3

PROBLEMI COLLABORATIVI PRELEVALEMENTE TRATTATI
Selezionare (X) le caselle relative ai problemi collaborativi di interesse
(riferimenti bibliografici: L.J.Carpenito-Diagnosi infermieristiche - 5th. ed. C.E.A. Edizioni, 2010)

Rischio di complicanze (RC) per disfunzione cardiaca/ vascolare	
RC per emorragia	X
RC per riduzione della gittata cardiaca	X
RC per aritmie	X
RC per edema polmonare	X
RC per trombosi venosa profonda	X
RC per ipovolemia	X
RC per sindrome compartimentale	X
RC per embolia polmonare	X
Rischio di complicanze (RC) per disfunzione respiratoria	
RC per ipossiemia	X
RC per atelectasia/polmonite	X
RC per pneumotorace	X
Rischio di complicanze (RC) per disfunzione metabolica/immunitaria/ematopoietica	
RC per ipo/iperglicemia	X
RC per squilibri elettrolitici	X
RC per sepsi	X
RC per acidosi (metabolica, respiratoria)	X
RC per alcalosi (metabolica, respiratoria)	X
RC per reazione allergica	X
RC per infezioni opportunistiche	X
Rischio di complicanze (RC) per disfunzione renale / urinaria	
RC per ritenzione urinaria acuta	X
RC per insufficienza renale	X
RC per calcoli renali	X
Rischio di complicanze (RC) per disfunzione neurologica/sensoriale	
RC per crisi convulsiva	X
RC per astinenza da alcol/droghe	X
Rischio di complicanze (RC) per disfunzione gastrointestinale / epatica / biliare	
RC per ileo paralitico	X
RC per iperbilirubinemia	X
Rischio di complicanze (RC) per disfunzione muscoloscheletrica	
RC per fratture patologiche	X
RC per lussazione	X
Rischio di complicanze (RC) per effetti avversi (EA) della terapia farmacologica	
RC per effetti avversi della terapia con farmaci anticoagulanti	X
RC per effetti avversi della terapia con farmaci antipertensivi	X

RC per effetti avversi della terapia con farmaci betabloccanti	X
RC per effetti avversi della terapia con farmaci calcioantagonisti	X
RC per effetti avversi della terapia con farmaci ansiolitici	X
RC per effetti avversi della terapia con farmaci adrenocorticosteroidi	X
RC per effetti avversi della terapia con farmaci anticonvulsivanti	X
RC per effetti avversi della terapia con farmaci antipsicotici	X
RC per effetti avversi della terapia con farmaci antiaritmici	X
RC per effetti avversi della terapia con farmaci inibitori dell'enzima di conversione dell'angiotensina	X
RC per effetti avversi della terapia con farmaci inibitori dei recettori dell'angiotensina	X
RC per effetti avversi della terapia con farmaci diuretici	X
RC per effetti avversi della terapia con farmaci antidepressivi	X

Allegato 4

APPRENDIMENTO OFFERTO

In relazione alle diagnosi infermieristiche / problemi collaborativi sopra indicati, descrivere le opportunità formative per lo studente che caratterizzano la sede di apprendimento.

Esempio: interventi assistenziali infermieristici, modelli organizzativi e/o di presa in carico assistenziale, attività di ricerca e innovazione.

Durante lo svolgimento del tirocinio presso il Nostro reparto, lo studente potrà:

- Prendere in carico il paziente, occuparsi della raccolta dati e della compilazione delle scale di valutazione;
- Seguire il paziente nel pre e nel post operatorio (sia per gli interventi in elezione che per quelli in urgenza), partecipando alla preparazione, individuandone le relative criticità assistenziali e seguendo i protocolli nonché le indicazioni post operatorie in base agli interventi effettuati;
- Sperimentare il corretto monitoraggio dei parametri vitali (PA, FC, FR, TC, HGT, SpO2, etc...);
- Identificare segni e sintomi derivati da situazioni acute e/o critiche;
- Osservare/eseguire le principali tecniche CORE quali: prelievi venosi ed arteriosi, posizionamento/rimozione CV, posizionamento CVP, medicazioni di ferite chirurgiche, medicazioni CVC, posizionamento/cambio di presidi stomali, etc...;
- Osservare/eseguire la corretta gestione dei pazienti nel post-operatorio, soprattutto se sottoposti ad interventi ad alta complessità assistenziale;
- Imparare a riconoscere e a gestire i sanguinamenti con conseguenti tamponamenti vescicali;
- Imparare a gestire i drenaggi (sia a caduta che in aspirazione), i cateteri vescicali a due e a tre vie, le cistoclisi, etc...;
- Imparare l'acquisizione dei principali interventi educativi, dalla gestione delle varie derivazioni urinarie (pielostomie, urostomie, neovescica ortotopica ...) al corretto mantenimento dei presidi a permanenza coinvolgendo i familiari più vicini al paziente/caregivers;
- Individuare le priorità del percorso assistenziale del paziente, sia urologico che ortogeriatrico;
- Partecipare al processo di mobilitazione post operatoria utilizzando ausili specifici, in collaborazione con l'infermiere nonché il personale medico e di supporto;
- Imparare a comunicare in modo adatto sia con la persona assistita che con i suoi familiari, in relazione alle loro condizioni clinico emotive;
- Imparare ad utilizzare i protocolli e le linee guida presenti in reparto;
- Imparare una corretta stesura nonché esposizione verbale della consegna infermieristica, da effettuare ad ogni cambio turno per il consueto passaggio delle informazioni relative a ciascun paziente;
- Effettuare, soprattutto in relazione ai pazienti non autosufficienti, le tecniche di assistenza di base quali cure igieniche a letto, rifacimento dell'unità, mobilitazione, aiuto nell'assunzione del pasto, etc ...