



OFFERTA FORMATIVA DELLA SEDE DI TIROCINIO

Contesto	
Tutor clinico Contatti e riferimenti	Nome BARBARA MICHELA Cognome GIANQUITTO Telefono 011/4393391 e-mail barbaramichela.gianquitto@unito.it
Struttura/servizio Nominativo, ubicazione, ecc N°locali, n° posti letto,	S.C. Cardiologia 1 presso Ospedale Maria Vittoria padiglione D 1° piano. 1 infermeria 2 studi medici 1 studio del primario 1 vuotavasi 1 cucina 2 depositi 10 camere di degenza con bagno (20 posti letto di cui due dedicati esclusivamente al day hospital)
Orari apertura al pubblico,	Visite parenti: 12.30 - 16.00; 18.30 - 21.30
Orari di lavoro,	Il personale ruota su tre turni: - mattino dalle 7.00 alle 14.42. - pomeriggio dalle 14.32 alle 22.35. - notte dalle 22.25 alle 7.10.
Figure professionali	Medico – Infermiere – Operatore Socio Sanitario
Risorse strumentali	All'interno dell'unità operativa, gli studenti hanno la possibilità di utilizzare diversi presidi biomedicali, quali: elettrocardiografo, sistema telemetrico per il monitoraggio elettrocardiografico, ecocardiografo portatile per l'incannulamento venoso periferico e monitor-defibrillatore. Inoltre nel periodo di tirocinio saranno individuate con lo studente due giornate osservative per approfondire l'opportunità di apprendimento: una in ambulatorio



<p>Servizi agli studenti (mensa, biblioteca, accesso internet, ecc)</p> <p>Contatti e riferimenti</p> <p>Come raggiungere il servizio Mappa percorso Mezzi pubblici</p>	<p>(ecocardiografia trans toracica e trans esofagea, eco stress, monitoraggio holter 24h, test ergometrico, approfondimento dell'elettrocardiogramma) e una in emodinamica/elettrofisiologia (coronarografia ed eventuale angioplastica, cateterismo cardiaco, impianto di pace-maker e/o defibrillatore). Uso di programmi informatici per compilazione cartella clinica (Galileo) e terapia (Prisma)</p> <p>Si può usufruire per la pausa psicofisica del locale antistante lo spogliatoio della palazzina C, attrezzato con tavoli e sedie; oppure accedere ai locali mensa attraverso due modalità:</p> <ul style="list-style-type: none">- Pagare i buoni pasto presso la Tesoreria della Banca San Paolo sita presso il Maria Vittoria e ritirare i buoni presso gli uffici dell'economato di via Medail. Il buono pasto dovrà essere consegnato presso il locale mensa il giorno precedente.- Portare il pasto da casa ed usufruire del locale mensa con la possibilità di riscaldare il pasto nel forno a microonde presente nel locale. (come da regolamento aziendale non si può accedere in divisa) <p>Accesso a internet in qualsiasi momento del suo tirocinio attraverso le credenziali dell' infermiere affiancatore.</p> <p>Indirizzo via Cibrario, 72 Torino Telefono 0114393391/397 Fax 0114393334</p> <p>Mezzi pubblici: 9 - 13 - 16 - 71</p>
---	---



Allegato 1

Problemi di salute / Problemi clinici / Percorso diagnostico terapeutici prevalentemente trattati

Selezionare (X) i problemi di salute prevalenti e indicare le patologie più frequenti

Malattie Cardiovascolari

X

Sindrome coronarica acuta (STEMI,NSTEMI e angina instabile), scompenso cardiocircolatorio con eventuale stimolazione biventricolare, pericardite e miocardite, endocardite valvolare, malattie della conduzione atrio-ventricolare con impianto di pace-maker e/o di defibrillatore definitivo,cardiopatie congenite.



Allegato 2

Diagnosi Infermieristiche prevalentemente trattate

Selezionare (X) le caselle relative alle Diagnosi Infermieristiche e ai fattori correlati di interesse
(riferimenti bibliografici: L.J.Carpenito-Diagnosi infermieristiche – 5th. ed. C.E.A. Edizioni, 2010)

Ansia	X
Fattori correlati	
Fisiopatologici	
X Qualsiasi fattore che interferisca con i bisogni relativi ad alimentazione, respirazione, comfort, sicurezza	
Situazionali (personali, ambientali)	
X Minaccia reale o percepita al concetto di sé (fallimento, modificazione dello status, mancato riconoscimento da parte degli altri...)	
X Minaccia reale o percepita all'integrità biologica (per malattia, violenza, procedure invasive, stato terminale)	
X Cambiamento ambientale reale o percepito (trasloco, ospedalizzazione, pensionamento, condizione di rifugiato, reclusione, calamità naturali, rischi per la sicurezza...)	
Fasi di sviluppo	
X Adulto: minaccia al concetto di se per gravidanza, ruolo genitoriale, cambiamento di carriera, effetti dell'invecchiamento, complicanze di una precedente gravidanza, aborto, o morte del feto, insufficiente conoscenza dell'esperienza del travaglio	
X Persona anziana: minaccia al concetto di se secondaria a perdite sensoriali, motorie, problemi finanziari, cambiamenti legati al pensionamento	

Attività, intolleranza all'attività	X
Fattori correlati	
Fisiopatologici	
Compromissione del sistema di apporto di ossigeno per	
X Sistema cardiaco (insufficienza cardiaca, valvolare, aritmie, infarto del miocardio, cardiopatia congenita, angina)	
X Sistema circolatorio (anemia, ipovolemia, arteriopatia periferica)	
Aumento del fabbisogno metabolico per	
X Infezioni acute o croniche (virali, epatite, mononucleosi, disordini endocrini/ metabolici)	
X Malattie croniche (renali, infiammatorie, neurologiche, epatiche, muscolo scheletriche)	
X Inadeguatezza delle fonti energetiche (per obesità, dieta inadeguata, malnutrizione)	
Trattamenti	
X Aumento del fabbisogno metabolico (per tumore maligno, intervento chirurgico, indagini diagnostiche, orario e frequenza trattamenti)	
X Compromissione del trasporto dell'ossigeno (per ipovolemia, prolungato riposo a letto)	
Situazionali (personali, ambientali)	
X Inattività (secondaria a depressione, mancanza di motivazione, stile di vita sedentario, insufficiente conoscenza)	
X Aumento del fabbisogno metabolico (per utilizzo di ausili come deambulatore /stampelle /tutori, stress, dolore, barriere ambientali come ad es. scale, estremi climatici, inquinamento dell'aria)	
X Inadeguata motivazione (secondaria ad utilizzo di ausili, paura di cadere, depressione, obesità, dolore, dispnea)	
Fasi di sviluppo	
X Processo di invecchiamento con diminuzione della forza e del tonico muscolare, comparsa di deficit sensoriali	



Cadute, rischio Vedere lesione, rischio	X
---	----------

Caregiver, tensione nel ruolo di /Rischio di	X
<p>Fattori correlati</p> <p>Fisiopatologici</p> <ul style="list-style-type: none"> X Esigenza di assistenza continua/ complessa (per condizioni debilitanti acute/progressive, tossicodipendenza, malattia dal decorso imprevedibile, demenza progressiva, malattia mentale cronica, disabilità) <p>Trattamenti</p> <ul style="list-style-type: none"> X Responsabilità assistenziali legate per tutto l'arco delle 24 ore o assistenza che richiede tempo (dialisi, trasporto) <p>Situazionali (personali, ambientali)</p> <ul style="list-style-type: none"> X Aspettative non realistiche dell'assistito nei confronti del caregiver X Modello di coping inefficace X Salute fisica compromessa X Relazioni inadeguate o disfunzioni familiari X Durata dell'assistenza richiesta X Isolamento X Pause di riposo/svago insufficienti o X Risorse economiche insufficienti X Assenza o non disponibilità di sostegno <p>Fasi di sviluppo</p> <ul style="list-style-type: none"> X Esigenza di assistenza continua secondaria a disabilità fisiche (specificare) 	

Casa, compromessa gestione	X
<p>Fattori correlati</p> <p>Fisiopatologici</p> <ul style="list-style-type: none"> X Compromissione delle capacità funzionali secondarie a malattia cronica debilitante (diabete mellito, sclerosi multipla, ictus cerebrale, cancro, artrite, insufficienza cardiaca, m. Parkinson, BPCO, distrofia muscolare) <p>Situazionali (personali, ambientali)</p> <ul style="list-style-type: none"> X Modificazioni delle capacità funzionali di un membro della famiglia (specificare) per lesione (es. frattura di un arto/lesione del midollo spinale), intervento chirurgico, alterazione dello stato mentale (vuoti di memoria, depressione, ansia-panico grave), abuso di sostanze. X Mancata disponibilità di un sistema di sostegno X Perdita di un familiare X Deficit di conoscenze X Insufficienza di risorse economiche <p>Fasi di sviluppo</p> <ul style="list-style-type: none"> X Persona anziana (correlata all'esigenza di cure molteplici per un familiare che presenta deficit cognitivi, motori, sensoriali) 	



Comunicazione, compromissione e Comunicazione verbale, compromissione (incapacità a pronunciare le parole ma è in grado di comprendere)	X
---	----------

<p>Fattori correlati</p> <p>Situazionali (personali, ambientali)</p> <ul style="list-style-type: none"> X Mandata disponibilità di apparecchio acustico o suo malfunzionamento X Barriere psicologiche (paura, timidezza) X Mancanza di riservatezza X Barriera linguistica (non disponibilità di interprete) <p>Fasi di sviluppo</p> <ul style="list-style-type: none"> X Persona anziana (perdite uditive) 	
---	--

Concetto di se, disturbo del	X
-------------------------------------	----------

<p>Fattori correlati</p> <p>Fisiopatologici</p> <ul style="list-style-type: none"> X Variazioni dell'aspetto, dello stile di vita, di un ruolo o delle risposte altrui (per malattia cronica, dolore, trauma grave, perdita parti del corpo / funzioni organiche) <p>Situazionali (personali, ambientali)</p> <ul style="list-style-type: none"> X Immobilità o perdita di funzioni X Rapporti insoddisfacenti parentali /coniugali <p>Fasi di sviluppo</p> <ul style="list-style-type: none"> X Persona anziana (perdita di ruoli/responsabilità) 	
---	--

Confusione mentale acuta	X
---------------------------------	----------

<p>Fattori correlati</p> <p>Fattori di rischio</p> <p>Improvvisa insorgenza di ipossia cerebrale o disturbi del metabolismo cerebrale per</p> <ul style="list-style-type: none"> X Squilibri idroelettrolitici (disidratazione, ipovolemia, acidosi/alcalosi, iper/ipo calcemia, ipopotassiemia, ipo/ipernatremia, ipo/iperglicemia) X Disturbi cardiovascolari (infarto miocardio, insufficienza cardiaca congestizia, aritmie, blocco cardiaco, arterite temporale, ematoma subdurale) X Disordini respiratori (BPCO, embolia polmonare, TBC, polmonite) X Infezioni (sepsi, meningite, encefalite, infezione delle vie urinarie nell'anziano) 	
---	--

Coping inadeguato della famiglia	X
---	----------

<p>Fattori correlati</p> <p>Biofisiopatologici</p> <ul style="list-style-type: none"> X Compromissione della capacità di esercitare la responsabilità di ruolo per malattia acuta/cronica <p>Situazionali (personali, ambientali)</p> <ul style="list-style-type: none"> X Compromissione della capacità di gestire in modo costruttivo gli agenti stressanti (per dipendenza da sostanze, scarsa autostima, alcolismo, storia di relazioni inefficaci con i propri genitori, modelli di ruolo negativi, storia di relazioni abusive) 	
---	--



Coping inefficace	X
--------------------------	---

Fattori correlati

Fisiopatologici

- X Cronicità della condizione
- X Complessità del regime di autocura
- X Alterazione dello stato d'animo

Situazionali (personali, ambientali)

- X Criticità delle relazioni con genitori/caregiver
- X Disorganizzazione del sistema familiare
- X Inefficace capacità di problem solving
- X Sostegno insoddisfacente, sovraccarico sensoriale (ambiente di fabbrica, urbanizzazione, affollamento, inquinamento acustico, attività eccessiva)
- X Inadeguate risorse psicologiche (per scarsa autostima, considerazione di se negativa, senso di impotenza, mancanza di motivazione per reagire, modelli di ruolo negativi)

Fasi di sviluppo

- X Adulto giovane età: scelte di carriera, condizione di genitore, matrimonio, abbandono della casa dei genitori, esigenze formative.
- X Adulto mezza età: segni fisici di invecchiamento, bisogni relativi alla condizione sociale, problemi con i familiari, della cura dei figli, pressioni legate alla carriera, genitori anziani.
- X Persona anziana: inadeguatezza delle risorse psicologiche per modificazioni fisiche, reazioni degli altri verso l'anziano, pensionamento, cambiamento di residenza, di condizioni economiche

Cura di sé, deficit (alimentazione)	X
Incapacità di (specificare): X tagliare gli alimenti e/o aprire le confezioni X portare il cibo alla bocca	

Fattori correlati

Fisiopatologici

- X Debolezza muscolare

Trattamenti

- X Uso di dispositivi esterni (apparecchio gessato, tutori ortopedici, infusione endovenosa...)
- X Affaticamento e dolore post operatori

Situazionali (personali, ambientali)

- X Dolore
- X Scarsa motivazione
- X Affaticamento
- X Confusione mentale
- X Ansia che paralizza

Fasi di sviluppo

- X Diminuita capacità motoria e visiva o a debolezza muscolare



<p>Cura di sé, deficit (bagno/igiene personale) Ridotta e/o incapacità di (specificare): <input checked="" type="checkbox"/> lavare il proprio corpo o parti <input checked="" type="checkbox"/> procurarsi l'acqua <input checked="" type="checkbox"/> regolare la temperatura o il flusso dell'acqua <input checked="" type="checkbox"/> percepire il bisogno di cure igieniche</p>	X
<p>Fattori correlati Fisiopatologici <input checked="" type="checkbox"/> Debolezza muscolare Trattamenti <input checked="" type="checkbox"/> Uso di dispositivi esterni (apparecchio gessato, tutori ortopedici, infusione endovenosa...) <input checked="" type="checkbox"/> Affaticamento e dolore post operatori Situazionali (personali, ambientali) <input checked="" type="checkbox"/> Dolore <input checked="" type="checkbox"/> Scarsa motivazione <input checked="" type="checkbox"/> Affaticamento <input checked="" type="checkbox"/> Confusione mentale <input checked="" type="checkbox"/> Ansia che paralizza Fasi di sviluppo <input checked="" type="checkbox"/> Diminuita capacità motoria e visiva o a debolezza muscolare</p>	
<p>Cura di sé, deficit (bagno/igiene personale) Ridotta e/o incapacità di (specificare): <input checked="" type="checkbox"/> mettersi o togliersi vestiti, allacciare i vestiti <input checked="" type="checkbox"/> curare il proprio aspetto <input checked="" type="checkbox"/> acquistare o cambiare capi di vestiario <input checked="" type="checkbox"/> o il flusso dell'acqua <input checked="" type="checkbox"/> percepire il bisogno di cure igieniche</p>	X
<p>Fattori correlati Fisiopatologici <input checked="" type="checkbox"/> Debolezza muscolare Trattamenti <input checked="" type="checkbox"/> Uso di dispositivi esterni (apparecchio gessato, tutori ortopedici, infusione endovenosa...) <input checked="" type="checkbox"/> Affaticamento e dolore post operatori Situazionali (personali, ambientali) <input checked="" type="checkbox"/> Dolore <input checked="" type="checkbox"/> Scarsa motivazione <input checked="" type="checkbox"/> Affaticamento <input checked="" type="checkbox"/> Confusione mentale <input checked="" type="checkbox"/> Ansia che paralizza Fasi di sviluppo</p>	



X Diminuita capacità motoria e visiva o a debolezza muscolare

<p>Cura di sé, deficit (eliminazione urinaria e fecale) Incapacità o mancanza di volontà per (specificare): <input checked="" type="checkbox"/> servirsi del gabinetto/comoda <input checked="" type="checkbox"/> trasferirsi sul gabinetto/comoda <input checked="" type="checkbox"/> eseguire pratiche igieniche adeguate <input checked="" type="checkbox"/> pulire il gabinetto o la comoda <input checked="" type="checkbox"/> sistemare gli indumenti per servirsi del gabinetto</p>	X
<p>Fattori correlati Fisiopatologici <input checked="" type="checkbox"/> Debolezza muscolare per (specificare) Trattamenti <input checked="" type="checkbox"/> Uso di dispositivi esterni (apparecchio gessato, tutori ortopedici, infusione endovenosa...) <input checked="" type="checkbox"/> Affaticamento e dolore post operatori Situazionali (personali, ambientali) <input checked="" type="checkbox"/> Dolore <input checked="" type="checkbox"/> Scarsa motivazione <input checked="" type="checkbox"/> Affaticamento <input checked="" type="checkbox"/> Confusione mentale <input checked="" type="checkbox"/> Ansia che paralizza</p> <p>Fasi di sviluppo <input checked="" type="checkbox"/> Diminuita capacità motoria e visiva o a debolezza muscolare</p>	

<p>Cura di sé, deficit (strumentale) Difficoltà a (specificare) <input checked="" type="checkbox"/> usare il telefono <input checked="" type="checkbox"/> accedere ai mezzi di trasporto <input checked="" type="checkbox"/> lavare e stirare <input checked="" type="checkbox"/> preparare i pasti <input checked="" type="checkbox"/> fare la spesa <input checked="" type="checkbox"/> gestire il denaro <input checked="" type="checkbox"/> assumere i farmaci</p>	X
<p>Fattori correlati Fisiopatologici <input checked="" type="checkbox"/> Debolezza muscolare per (specificare) Trattamenti <input checked="" type="checkbox"/> Uso di dispositivi esterni (apparecchio gessato, tutori ortopedici, infusione endovenosa...) <input checked="" type="checkbox"/> Affaticamento e dolore post operatori</p>	



Situazionali (personali, ambientali)

- X Dolore
- X Scarsa motivazione
- X Affaticamento
- X Confusione mentale
- X Ansia che paralizza

Fasi di sviluppo

- X Diminuita capacità motoria e visiva o a debolezza muscolare

Deambulazione, compromissione, rischio

Vedere mobilità, compromissione, rischio

X

Dolore acuto (Grave fastidio o disagio che dura da 0 a 6 mesi)

X

Fattori correlati

Fisiopatologici

Trauma tissutale e spasmi muscolari riflessi secondari a

- X Disordini viscerali (cardiaci, renali, epatici, intestinali, polmonari)
- X Disordini vascolari (vasospasmo, occlusione, flebite, vasodilatazione/cefalea)
- X Fatigue, malessere o prurito secondari a malattie infettive (rosolia, pancreatite, epatite, mononucleosi, varicella)

Trattamenti

- X Trauma tissutale e spasmi muscolari riflessi (per intervento chirurgico, ustione, indagini diagnostiche/venipuntura/biopsia, scansiometria invasiva)
- X Per nausea e vomito secondari a chemioterapia, anestesia, effetti collaterali (specificare)

Situazionali (personali, ambientali)

- X Febbre
- X Immobilità/posizionamento inappropriato
- X Punti di pressione (es.ingessatura o bendaggio stretti)
- X Risposta allergica
- X Bisogno di dipendenza non soddisfatto
- X Ansia grave e repressa

Dolore cronico (Continuo/ intermittente che dura da più di 6 mesi)

X

Fattori correlati

Fisiopatologici

Trauma tissutale e spasmi muscolari riflessi secondari a

- X Disordini viscerali (cardiaci, renali, epatici, intestinali, polmonari)
- X Disordini vascolari (vasospasmo, occlusione, flebite, vasodilatazione/cefalea)
- X Fatigue, malessere o prurito secondari a malattie infettive (rosolia, pancreatite, epatite, mononucleosi, varicella)

Trattamenti

- X Trauma tissutale e spasmi muscolari riflessi (per intervento chirurgico, ustione, indagini diagnostiche/venipuntura/biopsia, scansiometria invasiva)
- X Per nausea e vomito secondari a chemioterapia, anestesia, effetti collaterali (specificare)

Situazionali (personali, ambientali)



- X Febbre
- X Immobilità/posizionamento inappropriato
- X Punti di pressione (es.ingessatura o bendaggio stretti)
- X Risposta allergica
- X Bisogno di dipendenza non soddisfatto
- X Ansia grave e repressa

Eliminazione urinaria compromessa

X

Per Incontinenza urinaria (specificare):

- X Totale (continua, senza presenza di distensione della vescica e/o ritenzione di urine)
- X Da sforzo (perdita involontaria di urine per aumento della pressione addominale)
- X Da urgenza (perdita involontaria di urine per urgenza minzionale)
- X Funzionale (per incapacità di raggiungere in tempo il gabinetto)
- X Riflessa (senza sensazione di pienezza vescicale o urgenza minzionale)
- X Da rigurgito (presenza di distensione della vescica e/o ritenzione di urine)

Fattori correlati

Fisiopatologici

- X Anomalie congenite delle vie urinarie
- X Diminuita capacità vescicale/irritazione vescicale (per infezione, glicosuria, carcinoma, uretrite, trauma)
- X Diminuzione dei segnali vescicali o del loro riconoscimento (per infezioni/tumori/lesioni midollo spinale, neuropatia alcolica e/o diabetica, malattie demielinizzanti, ictus cerebrale, parkinsonismo, sclerosi multipla, farmaci alfa adrenergici)

Trattamenti

- X Effetti di intervento chirurgico sullo sfintere vescicale (prostatectomia, dissezione pelvica estensiva)

Fatigue

X

Fattori correlati

Fisiopatologici

- X Inadeguata ossigenazione tissutale (per BPCO, insufficienza cardiaca, anemia, malattia vascolare periferica)
- X Alterazioni biochimiche (per malattie endocrine e metaboliche come diabete mellito, ipotiroidismo, malattie ipofisarie, AIDS, M Addison, cirrosi epatica, insufficienza renale)
- X Debolezza muscolare (per miastenia gravis, sclerosi multipla,, SLA, M. Parkinson, AIDS)

Situazionali (personali, ambientali)

- X Diminuzione prolungata dell'attività (per ansia, febbre, diarrea, dolore, isolamento sociale, nausea/vomito, depressione, obesità)



- X Stress emotivo
- X Disturbi del sonno

Immobilizzazione, sindrome da

X

Fattori correlati

Trattamenti

- X Intervento chirurgico
- X Linee venose
- X Immobilità prescritta

Situazionali (personali, ambientali)

- X Depressione
- X Fatigue
- X Stato di debilitazione
- X Dolore

Fasi di sviluppo

- X Persona anziana: ridotta agilità motoria, debolezza muscolare, demenza presenile

Incontinenza fecale

X

Fattori correlati

Fisiopatologici

- X Compromissione dello sfintere rettale (per chirurgia anale/rettale, lesioni ostetriche, neuropatia periferica)
- X Compromissione delle funzioni cognitive
- X Iperdistensione rettale per stipsi cronica
- X Mancato controllo dello sfintere volontario (per malattia neuromuscolare progressiva compressione/lesione del midollo spinale, ictus cerebrale, sclerosi multipla)
- X Trattamenti
- X Compromessa capacità del di fungere da serbatoio fecale per colectomia, proctite da radiazioni.

Situazionali (personali, ambientali)

- X Incapacità di riconoscere, interpretare o rispondere ai segnali intestinali (per depressione, compromissione delle funzioni cognitive)

Incontinenza urinaria da sforzo

X

Fattori correlati

Fisiopatologici

- X Anomalie congenite delle vie urinarie
- X Alterazioni degenerative della muscolatura pelvica e dei legamenti per deficienza estrogenica

Situazionali (personali, ambientali)

- X Elevata pressione intra-addominale e debolezza della muscolatura pelvica per obesità, attività sessuale, gravidanza, inadeguata igiene personale
- X Debolezza della muscolatura pelvica e dei legamenti per parto, recente rilevante calo ponderale

Fasi di sviluppo

- X Persona anziana: perdita di tono muscolare



Incontinenza urinaria da urgenza	X
Fattori correlati	
Fisiopatologici	
X Diminuzione della capacità vescicale per infezione, malattie demielinizzanti, ictus cerebrale, trauma, uretrite, neuropatia diabetica, neuropatia alcolica, disturbi/lesioni neurologiche/tumori/infezioni, parkinsonismo	
Trattamenti	
X Diminuzione della capacità vescicale per intervento chirurgico addominale, X Periodo successivo a cateterismo vescicale a permanenza	
Situazionali (personali, ambientali)	
X Irritazione dei recettori vescicali da stiramento per uso di alcol, caffeina, eccessiva assunzione di liquidi X Diminuzione della capacità vescicale secondaria a minzioni frequenti	
Fasi di sviluppo	
X Bambino: limitata capacità vescicale X Persona anziana: diminuita capacità vescicale	

Incontinenza urinaria funzionale	X
Fattori correlati	
Fisiopatologici	
X Diminuzione di stimoli vescicali/compromessa capacità di riconoscerli per trauma, infezione, tumore cerebrale, parkinsonismo, sclerosi multipla, neuropatia alcolica, malattie demielinizzanti, ictus cerebrale, demenza progressiva	
Trattamenti	
X Riduzione del tono vescicale per uso di antistaminici, terapia immunosoppressiva, adrenalina, diuretici, anticolinergici, tranquillanti, sedativi, miorilassanti	
Situazionali (personali, ambientali)	
X Compromissione della mobilità X Diminuita attenzione nei confronti degli stimoli vescicali per depressione, soppressione intenzionale, confusione mentale X Barriere ambientali per l'accesso al bagno (gabinetto distante, letto troppo alto, scarsa illuminazione, spondine laterali, ambiente non familiare)	
Fasi di sviluppo	
X Persona anziana: perdite motorie/sensitive	

Incontinenza urinaria totale (compromessa eliminazione urinaria)	X
Fattori correlati	
Fisiopatologici	
X Anomalie congenite delle vie urinarie X Diminuita capacità vescicale o irritazione vescicale per trauma, carcinoma, infezione uretrite, glicosuria X Diminuzione dei segnali vescicali o compromessa capacità di riconoscerli per infezione/tumore/lesione del midollo spinale, neuropatia diabetica/alcolica, malattie	



demyelinizzanti, ictus cerebrale, parkinsonismo, lesione cerebrale, sclerosi multipla

Trattamenti

- X Effetti del trattamento chirurgico sullo sfintere vescicale per prostatectomia, dissezione pelvica estensiva
- X Strumentazione diagnostica
- X Riduzione del tono muscolare per per anestesia generale o spinale, terapia farmacologica e iatrogenesi (farmaci miorellassanti, anestetici, diuretici, antistaminici, anticolinergici, immunodepressori, adrenalina, ansiolitici)

Situazionali (personali, ambientali)

- X Compromissione della mobilità
- X Diminuita attenzione nei confronti degli stimoli vescicali per depressione, soppressione intenzionale, confusione mentale
- X Barriere ambientali per l'accesso al bagno (gabinetto distante, letto troppo alto, scarsa illuminazione, sponde laterali, ambiente non familiare)

Fasi di sviluppo

- X Persona anziana: perdite motorie/sensitive

Infezione, rischio di

X

Fattori correlati

Fisiopatologici

- X Compromissione della circolazione per linfedema, obesità, malattia vascolare periferica

Trattamenti

- X Sede di possibile invasione di microorganismi per intervento chirurgico, intubazione, linee invasive, nutrizione parenterale totale, dialisi, nutrizione enterale

Situazionali (personali, ambientali)

- X Compromissione delle difese dell'ospite per malattie infettive, stress, malnutrizione, prolungata degenza in ospedale, fumo, prolungata immobilità

Fasi di sviluppo

- X Persona anziana: maggiore vulnerabilità per diminuzione della risposta immunitaria, condizione debilitante, malattia cronica)

Insonnia

X

Fattori correlati

Fisiopatologici

- X Compromissione del trasporto di ossigeno (per angina, disturbi circolatori/respiratori, arteriosclerosi periferica)
- X Compromissione dell'eliminazione fecale o urinaria (per diarrea, disuria, ritenzione, incontinenza, stipsi, pollacchiuria)

Situazionali (personali, ambientali)



- X Eccessivo dormire di giorno
- X Depressione
- X Inadeguata attività fisica durante il giorno
- X Dolore cronico
- X Risposte ansiose
- X Modifiche ambientali (specificare)
- X Paura

Integrità mucosa orale, compromissione

X

Fattori correlati

- X Inadeguata igiene orale
- X Incapacità di provvedere all'igiene orale

Lesione, rischio di

X

Fattori correlati

Fisiopatologici

- X Alterazioni della mobilità (ictus cerebrale, artrite, parkinsonismo, perdita di un arto, compromissione della vista/udito)
- X Fatigue
- X Ipotensione ortostatica
- X Inadeguata consapevolezza dei rischi ambientali (confusione mentale)

Trattamenti

- X Lungo allettamento
- X Effetti sulla mobilità/sensorio (sedativi, miorilassanti...specificare)

Situazionali (personali, ambientali)

- X Diminuzione o perdita memoria a breve termine
- X Alterata capacità di giudizio (per stress, droghe, alcol, disidratazione, depressione)
- X Ambiente non familiare (es. Ospedale)
- X Scarpe inadatte,
- X Uso improprio degli ausili
- X Storia di incidenti
- X Andatura instabile

Fasi di sviluppo

- X Persona anziana: alterata capacità di giudizio (per deficit cognitivi), stile di vita sedentario, perdita di forza muscolare

Liquidi, eccessivo volume di

X

Fattori correlati

Fisiopatologici

- X Compromissione dei meccanismi regolatori (per insufficienza renale acuta/cronica, disfunzioni endocrine, anomalie sistemiche metaboliche, lipoedema)
- X Anomalie venose e arteriose (vene varicose, vasculopatia periferica,. Trombosi, flebite, immobilità, linfoedema, infezioni, trauma, neoplasie)

Trattamenti

- X Ritenzione di sodio e acqua (terapia corticosteroidea)

Situazionali (personali, ambientali)

- X Eccessivo apporto di sodio/liquidi
- X Inadeguato apporto proteico (dieta squilibrata, malnutrizione)



- X Ristagno venoso declive/venostasi (per immobilità, prolungata stazione eretta/posizione seduta, gesso/fasciatura stretta)

Fasi di sviluppo

- X Persona anziana: compromissione del ritorno venoso per aumento delle resistenze periferiche e diminuzione dell'efficienza valvolare

Liquidi, insufficiente volume di

X

Fattori correlati

Fisiopatologici

- X Eccessiva emissione di urine (per diabete mellito insipido, diabete mellito scompensato)
X Perdite (febbre, aumento del metabolismo, drenaggio accentuato, ferite, peritonite, diarrea, menorragia)

Situazionali (personali, ambientali)

- X Vomito/nausea
X Diminuita motivazione a bere (depressione, fatigue)
X Dieta scorretta/digiuno
X Difficoltà a deglutire/assumere alimenti (dolore orale, fatigue)
X Perdita eccessiva (cateteri a permanenza, drenaggi)
X Uso eccessivo di lassativi o clisteri, diuretici, alcol, caffeina

Fasi di sviluppo

- X Persona anziana: aumentata vulnerabilità a ridotta riserva idrica, ridotta sensazione di sete

Mobilità, compromissione /rischio di

X

Fattori correlati

Fisiopatologici

- X riduzione della forza e della resistenza per compromissione muscoloscheletrica (fratture, malattie del tessuto connettivo, condizioni cardiache)
X edemi
X apparecchi esterni (gesso/splint, corsetto ortopedico, catetere venoso)

Situazionali (personali, ambientali)

- X fatigue
X obesità
X mancanza di motivazione
X dispnea

Fasi di sviluppo

- X Persona anziana: diminuzione dell'agilità e debolezza muscolare

Mobilità nel letto, mobilità con la sedia a rotelle, compromissione /rischio

Vedere mobilità, compromissione, rischio

X

Nausea

X

Fattori correlati

Trattamenti

- X Effetti dell'anestesia



Non adesione (a indicazioni terapeutiche)	X
Fattori correlati	
Fisiopatologici	
X Compromessa capacità di prestazione a causa di una disabilità (scarsa memoria, deficit motori/sensitivi)	
X Aumento dei sintomi correlati alla malattia nonostante la precedente adesione al regime terapeutico consigliato	
Trattamenti	
X Effetti collaterali della terapia	
X Ambiente non terapeutico	
X Terapia complessa non controllata/prolungata	
X Costo economico della terapia	
X Pregresse esperienze di regime terapeutico consigliato inefficace	
Situazionali (personali, ambientali)	
X Presenza di barriere per l'accesso (per problemi di mobilità/trasporto/economici, mancanza di assistenza per i figli, tempo inclemente)	
X Barriere all'assistenza secondarie a mancanza di alloggio	
X Modificazione dello stato lavorativo	
Nutrizione inferiore al fabbisogno, rischio di	X
Fattori correlati	
Fisiopatologici	
X Disfagia (per ictus cerebrale, M.di Parkinson, palatoschisi, distrofia muscolare, paralisi cerebrale, paralisi facciale, SLA, disturbi neuromuscolari)	
X Diminuzione dell'appetito (per alterazioni dello stato di coscienza)	
Situazionali (personali, ambientali)	
X Diminuzione dell'appetito (per nausea, vomito, isolamento sociale, stress, depressione, allergie)	
X Incapacità di procurarsi gli alimenti (per limitazioni fisiche, problemi finanziari/ di trasporto)	
X Incapacità di masticare (per adentulia, carie, protesi non adatta)	
X Diarrea	
Stipsi	X
Fattori correlati	
Fisiopatologici	
X Diminuita risposta al bisogno di defecare (disturbi dell'umore)	
X Dolore alla defecazione (per emorroidi, lesione dorsale)	
X Diminuita peristalsi secondaria a ipossia cardiaca/polmonare	
Trattamenti	
X Effetti collaterali di farmaci (specificare)	
X Uso abituale di lassativi	
Situazionali (personali, ambientali)	
X Diminuzione della peristalsi (per immobilità, gravidanza, stress, mancanza di esercizio fisico)	
X Modello di evacuazione irregolare	
X Mancanza di riservatezza	
X Dieta priva di scorie, assunzione di liquidi inadeguata	
X Paura di dolore rettale o cardiaco	



- | |
|---|
| <input checked="" type="checkbox"/> Valutazioni errate
<input checked="" type="checkbox"/> Incapacità di percepire i segnali intestinali |
|---|

Stress, sovraccarico psicofisico	X
---	----------

Fattori correlati

Fisiopatologici

- | |
|--|
| <input checked="" type="checkbox"/> Necessità di far fronte a malattie acute, croniche, terminali, nuove diagnosi, condizioni deturpanti |
|--|



Allegato 3

PROBLEMI COLLABORATIVI PRELEVALEMENTEMENTE TRATTATI	
Selezionare (X) le caselle relative ai problemi collaborativi di interesse (riferimenti bibliografici: L.J.Carpenito-Diagnosi infermieristiche - 5th. ed. C.E.A. Edizioni, 2010)	
Rischio di complicanze (RC) per disfunzione cardiaca/ vascolare	
RC per emorragia	X
RC per riduzione della gittata cardiaca	X
RC per aritmie	X
RC per edema polmonare	X
RC per trombosi venosa profonda	X
RC per ipovolemia	X
RC per sindrome compartimentale	X
RC per embolia polmonare	X
Rischio di complicanze (RC) per disfunzione respiratoria	
RC per ipossiemia	X
RC per pneumotorace	X
Rischio di complicanze (RC) per disfunzione metabolica/immunitaria/ematopoietica	
RC per ipo/iperglicemia	X
RC per squilibri elettrolitici	X
RC per sepsi	X
RC per acidosi (metabolica, respiratoria)	X
RC per alcalosi (metabolica, respiratoria)	X
RC per reazione allergica	X
Rc per trombocitopenia	X
RC per infezioni opportunistiche	X
Rischio di complicanze (RC) per disfunzione renale / urinaria	
RC per ritenzione urinaria acuta	X
RC per insufficienza renale	X
Rischio di complicanze (RC) per disfunzione gastrointestinale / epatica / biliare	
RC per sanguinamento gastrointestinale	X
Rischio di complicanze (RC) per effetti avversi (EA) della terapia farmacologica	
RC per effetti avversi della terapia con farmaci anticoagulanti	X
RC per effetti avversi della terapia con farmaci ansiolitici	X
RC per effetti avversi della terapia con farmaci adrenocorticosteroidi	X
RC per effetti avversi della terapia con farmaci antidepressivi	X
RC per effetti avversi della terapia con farmaci antiaritmici	X
RC per effetti avversi della terapia con farmaci antipsicotici	X
RC per effetti avversi della terapia con farmaci antipertensivi	X
RC per effetti avversi della terapia con farmaci betabloccanti	X



RC per effetti avversi della terapia con farmaci calcioantagonisti	X
RC per effetti avversi della terapia con farmaci inibitori dell'enzima di conversione dell'angiotensina	X
RC per effetti avversi della terapia con farmaci inibitori dei recettori dell'angiotensina	X
RC per effetti avversi della terapia con farmaci diuretici	X

Allegato 4

APPRENDIMENTO OFFERTO

In relazione alle diagnosi infermieristiche / problemi collaborativi sopra indicati, descrivere le opportunità formative per lo studente che caratterizzano la sede di apprendimento. Esempio: interventi assistenziali infermieristici, modelli organizzativi e/o di presa in carico assistenziale, attività di ricerca e innovazione.

Presso l'unità operativa di Cardiologia lo studente potrà apprendere i principali interventi assistenziali rivolti alla persona assistita affetta da patologie cardiache ischemiche, aritmiche e valvolari, collaborando con l'équipe multidisciplinare presente in reparto.

Potrà inoltre imparare a interpretare ed utilizzare i sistemi di monitoraggio dell'attività cardiaca ed assistere alle principali procedure diagnostico-terapeutiche cardiologiche.