

OFFERTA FORMATIVA DELLA SEDE DI TIROCINIO

Contesto	
<p>Tutor clinici Contatti e riferimenti</p>	<p>Nome MICHELA Cognome MAGAGNA</p> <p>Telefono 0114393374-0114393372</p> <p>e-mail michela.magagna@unito.it</p>
<p>Struttura/servizio Nominativo, ubicazione, ecc N°locali, n° posti letto</p> <p>Orari apertura al pubblico, Orari di lavoro, Figure professionali Risorse strumentali</p> <p>Servizi agli studenti (mensa, biblioteca, accesso internet, ecc)</p> <p>Contatti e riferimenti</p> <p>Come raggiungere il servizio Mappa percorso Mezzi pubblici</p>	<p>Piastre chirurgiche 3° piano OMV Quattro letti operatori, due sale risveglio, due zone separate (pulita e sporca), due postazioni con accesso a internet, una centrale di sterilizzazione.</p> <p>7.30-15.12 14.00-21.42 CPSE-CPSI-OSS Apparecchiature elettromedicali (autoclave-sistema sterilizzazione, laser-elettrobisturi, ecografi, intensificatore di brillanza, colonne laparoscopiche-microscopi, materassino scaldaletto, video-laringoscopio, fibroscopio, respiratori, defibrillatore, monitor, pompe-siringa,), letto operatorio, presidi antidecubito (materassini in gel)</p> <p>Possibilità di accesso a: mensa, accesso a internet, spogliatoi sul piano, possibilità di accesso a banche dati.</p> <p>Indirizzo via Cibrario 72 Torino Telefono 0114393374-0114393372 Fax 0114393431 e-mail lucamariapaolo.dantoni@unito.it michela.magagna@unito.it</p> <p>Tram: 9 – 16 - 13 Bus 71 -13 Metro</p>

Problemi di salute / Problemi clinici / Percorso diagnostico terapeutici prevalentemente trattati

Selezionare (X) i problemi di salute prevalenti e indicare le patologie più frequenti

Malattie Endocrinologiche, metaboliche **X**

 Tumore della tiroide
 Tiroiditi autoimmuni
 Patologie del surrene
 Patologie del pancreas (cisti - tumori)

Malattie Intestinali / digestive **X**

 Tumore del colon
 Colecistiti
 Appendicopatie
 Diverticolite
 Infarto intestinale
 Occlusione intestinale
 Volvolo
 Ernia inguinale, ombelicale

Malattie Nefrologiche, genito/urinarie **X**

 Fimosi
 Varicocele
 Torsione del testicolo
 Calcolosi renale

Malattie Oncologiche **X**

 Tumore della mammella Tumore della prostata
 Tumore della vescica
 Tumore del rene
 Tumore della laringe
 Tumore della parotide
 Tumore del testicolo

Malattie Osteoarticolari **X**

 Sindrome del tunnel carpale
 Rizartriosi
 Sindrome di dupuytren

Malattie Respiratorie **X**

 Tonsilliti
 Sinusiti
 Deviazioni del setto nasale
 Tracheotomie

Malattie Traumatologiche / incidenti	X
Traumatologia della mano (fratture, amputazioni con ricostruzione nervosa/vascolare/tendinea) Traumatologia maxillo- facciale Fratture di orbita e zigomo Fratture del setto nasale Splnectomie Emo e pneumotorace	
Salute in area Materno / infantile	X
Chirurgia pediatrica (ORL- PLASTICA)	
Altro (specificare)	X
Malattie dell'orecchio interno	

Allegato 2

Diagnosi Infermieristiche prevalentemente trattate

Selezionare (X) le caselle relative alle Diagnosi Infermieristiche e ai fattori correlati di interesse
(riferimenti bibliografici: L.J.Carpenito-Diagnosi infermieristiche – 5th. ed. C.E.A. Edizioni, 2010)

Ansia	X
<p>Fattori correlati</p> <p>Fisiopatologici</p> <p>X Qualsiasi fattore che interferisca con i bisogni relativi ad alimentazione, respirazione, comfort, sicurezza</p> <p>Situazionali (personali, ambientali)</p> <p>X Minaccia reale o percepita al concetto di sé (fallimento, modificazione dello status, mancato riconoscimento da parte degli altri...)</p> <p>X Minaccia reale o percepita all'integrità biologica (per malattia, violenza, procedure invasive, stato terminale)</p> <p>X Cambiamento ambientale reale o percepito (trasloco, ospedalizzazione, pensionamento, condizione di rifugiato, reclusione, calamità naturali, rischi per la sicurezza...)</p> <p>X Cambiamento reale o percepito delle condizioni socioeconomiche (disoccupazione, cambiamento di lavoro, licenziamento, promozione)</p> <p>Fasi di sviluppo</p> <p>X Neonato/bambino: separazione, ambiente e persone sconosciuti</p> <p>X Adolescente: minaccia del concetto di se correlato all'ingresso in sala operatoria, mancanza di conoscenze</p> <p>X Adulto: minaccia al concetto di se per effetti dell'intervento e/o delle potenziali conseguenze post-intervento</p> <p>X Persona anziana: minaccia al concetto di se secondaria a perdite sensoriali, motorie</p>	
Aspirazione, rischio di	X
<p>Fattori correlati</p> <p>Fisiopatologici</p> <p>X Riduzione del livello di coscienza (coma)</p> <p>X Ritardato svuotamento gastrico (interventi in urgenza, ostruzione intestinale, sindrome da reflusso, ileo)</p> <p>X Aumento della pressione gastrica (ascite, obesità)</p> <p>X Fistola tracheo-esofagea</p> <p>X Compromissione dei riflessi protettivi (chirurgia o trauma facciale/orale/del collo)</p> <p>Trattamenti</p> <p>X Depressione dei riflessi laringeo/glottico (per tracheostomia/trachetomia, sedazione, nutriz. enterale)</p> <p>X Compromissione della capacità di tossire (per immobilizzazione della mandibola, posizione prona)</p>	

Attività, intolleranza all'attività	X
<p>Fattori correlati</p> <p>Trattamenti</p> <ul style="list-style-type: none"> X Aumento del fabbisogno metabolico (per tumore maligno, intervento chirurgico, indagini diagnostiche, orario e frequenza trattamenti) X Compromissione del trasporto dell'ossigeno (per ipovolemia, prolungato riposo a letto) <p>Situazionali (personali, ambientali)</p> <ul style="list-style-type: none"> X Inattività (paura di cadere, dolore, secondaria a depressione, mancanza di motivazione, variazione dello stile di vita, insufficiente conoscenza) X Aumento del fabbisogno metabolico (stress, dolore,) 	
Autostima, Disturbo/Rischio di	X
<p>Fattori correlati</p> <p>Fisiopatologici</p> <ul style="list-style-type: none"> X Variazione dell'aspetto (per perdita di parti del corpo, di una o più funzioni organiche) X Deturpazione 	
Comunicazione, compromissione e Comunicazione verbale, compromissione (incapacità a pronunciare le parole ma è in grado di comprendere)	X
<p>Fattori correlati</p> <p>Fisiopatologici</p> <ul style="list-style-type: none"> X Alterazione della funzionalità motoria dei muscoli del linguaggio X Trauma orale o facciale, patologie ostruttive del collo X Compromissione della capacità di produrre il linguaggio (per compromissione respiratoria, dispnea, edema, deformità del cavo orale, mal occlusione o frattura mascellare, disfagia) <p>Trattamenti</p> <ul style="list-style-type: none"> X Compromissione della capacità di produrre il linguaggio (per intubazione endotracheale, tracheotomia, tracheostomia, laringectomia, intervento chirurgico al viso, collo, alla bocca, dolore alla bocca o faringeo, depressione cognitiva da farmaci deprimenti il SNC/anestetici) <p>Situazionali (personali, ambientali)</p> <ul style="list-style-type: none"> X Diminuita attenzione (per affaticamento collera, ansia, o dolore) X Barriera linguistica (non disponibilità di interprete) <p>Fasi di sviluppo</p> <ul style="list-style-type: none"> X Persona anziana (perdite uditive) 	
Concetto di se, disturbo del	X
<p>Fattori correlati</p> <p>Fisiopatologici</p> <ul style="list-style-type: none"> X Variazioni dell'aspetto, dello stile di vita, di un ruolo o delle risposte altrui (dolore, trauma grave, perdita parti del corpo / funzioni organiche) <p>Situazionali (personali, ambientali)</p> <ul style="list-style-type: none"> X Immobilità o perdita di funzioni 	

Confusione mentale acuta, rischio	X
<p>Fattori correlati</p> <p>Fattori di rischio</p> <p>Improvvisa insorgenza di ipossia cerebrale o disturbi del metabolismo cerebrale per</p> <ul style="list-style-type: none"> X Squilibri idroelettrolitici (disidratazione, ipovolemia, acidosi/alcalosi, iper/ipo calcemia, ipopotassiemia, ipo/iper natremia, deficit magnesio, ipo/iper glicemia) X Deficit nutrizionali (anemia) X Disturbi cardiovascolari (infarto miocardio, insufficienza cardiaca congestizia, aritmie) X Disordini respiratori (BPCO, embolia polmonare, TBC, polmonite) X Infezioni (sepsi, meningite, infezione delle vie urinarie nell'anziano) X Disordini metabolici ed endocrini (iper/ipo tiroidismo, disturbi paratiroidei, del corticosurrene, ipotensione posturale) <p>Trattamenti</p> <ul style="list-style-type: none"> X Anestesia generale, sedativi/ipnotici, effetti collaterali dei farmaci (neurolettici/narcotici, anestesia generale, effetti collaterali da farmaci come diuretici, atropina, ipoglicemizzanti) <p>Situazionali (personali, ambientali)</p> <ul style="list-style-type: none"> X Dolore, immobilità 	
Deglutizione, compromissione	X
<p>Fattori correlati</p> <p>Trattamenti</p> <ul style="list-style-type: none"> X Ricostruzione chirurgica della bocca/faringe/mandibola/naso X Riduzione della coscienza per anestesia X Ostruzione meccanica secondaria a cannula tracheostomica <p>Situazionali (personali, ambientali)</p> <ul style="list-style-type: none"> X Alterazione del livello di coscienza 	
Dolore acuto / cronico (Grave fastidio o disagio che dura da 0 a 6 mesi)	X
<p>Fattori correlati</p> <p>Fisiopatologici</p> <p>Trauma tissutale e spasmi muscolari riflessi secondari a</p> <ul style="list-style-type: none"> X Disordini muscolo scheletrici (fratture) X Cancro X Infiammazione di nervi, tendini, capsula articolare, articolazioni, muscoli, strutture articolari. X Dolore addominali X Infiammazione e spasmi della muscolatura liscia per calcoli renali, infezioni gastrointestinali <p>Trattamenti</p> <ul style="list-style-type: none"> X Trauma tissutale e spasmi muscolari riflessi (per intervento chirurgico, puntura/biopsia) X Per nausea e vomito secondari a chemioterapia, anestesia, effetti collaterali (specificare) <p>Situazionali (personali, ambientali)</p> <ul style="list-style-type: none"> X Immobilità/posizionamento inappropriato X Iperattività X Punti di pressione (es. ingessatura o bendaggio stretti) X Risposta allergica 	



Eliminazione urinaria compromessa	X
<p>Per Incontinenza urinaria (specificare):</p> <ul style="list-style-type: none"> <input checked="" type="checkbox"/> Totale (continua, senza presenza di distensione della vescica e/o ritenzione di urine) <input checked="" type="checkbox"/> Da sforzo (perdita involontaria di urine per aumento della pressione addominale) <input checked="" type="checkbox"/> Da urgenza (perdita involontaria di urine per urgenza minzionale) <input checked="" type="checkbox"/> Funzionale (per incapacità di raggiungere in tempo il gabinetto) <input checked="" type="checkbox"/> Riflessa (senza sensazione di pienezza vescicale o urgenza minzionale) <input checked="" type="checkbox"/> Da rigurgito (presenza di distensione della vescica e/o ritenzione di urine) 	

<p>Fattori correlati</p> <p>Fisiopatologici</p> <ul style="list-style-type: none"> <input checked="" type="checkbox"/> Anomalie delle vie urinarie <input checked="" type="checkbox"/> Diminuita capacità vescicale/irritazione vescicale (fimosi, trauma) <p>Trattamenti</p> <ul style="list-style-type: none"> <input checked="" type="checkbox"/> Effetti di intervento chirurgico sullo sfintere vescicale (prostatectomia, dissezione pelvica estensiva) 	
--	--

Immagine corporea, Disturbo/Rischio di	X
---	----------

<p>Fattori correlati</p> <p>Trattamenti</p> <ul style="list-style-type: none"> <input checked="" type="checkbox"/> variazione dell'aspetto (per intervento chirurgico) 	
---	--

Incontinenza urinaria funzionale	X
---	----------

<p>Fattori correlati</p> <p>Trattamenti</p> <ul style="list-style-type: none"> <input checked="" type="checkbox"/> Riduzione del tono vescicale per uso di adrenalina, diuretici, anticolinergici, tranquillanti, sedativi, miorilassanti 	
---	--

Incontinenza urinaria totale (compromessa eliminazione urinaria)	X
---	----------

<p>Fattori correlati</p> <p>Trattamenti</p> <ul style="list-style-type: none"> <input checked="" type="checkbox"/> Effetti del trattamento chirurgico sullo sfintere vescicale per prostatectomia, dissezione pelvica estensiva <input checked="" type="checkbox"/> Strumentazione diagnostica <input checked="" type="checkbox"/> Riduzione del tono muscolare per per anestesia generale o spinale, terapia farmacologica e iatrogenesi (farmaci miorilassanti, anestetici, diuretici, antistaminici, anticolinergici, immunodepressori, adrenalina, ansiolitici) 	
---	--



Infezione, rischio di	X
<p>Fattori correlati</p> <p>Trattamenti</p> <ul style="list-style-type: none"> X Sede di possibile invasione di microorganismi per intervento chirurgico, intubazione, linee invasive, nutrizione parenterale totale, dialisi, nutrizione enterale X Compromissione delle difese dell'ospite per terapia radiante, terapia farmacologica (specificare) <p>Situazionali (personali, ambientali)</p> <ul style="list-style-type: none"> X Compromissione delle difese dell'ospite per malattie infettive, stress, malnutrizione, prolungata degenza in ospedale, fumo, prolungata immobilità X Contatto con agenti contaminanti (infezioni nosocomiali o di comunità) <p>Fasi di sviluppo</p> <ul style="list-style-type: none"> X Persona anziana: maggiore vulnerabilità per diminuzione della risposta immunitaria, condizione debilitante, malattia cronica 	
Insonnia	X
<p>Fattori correlati</p> <p>Fisiopatologici</p> <p>Situazionali (personali, ambientali)</p> <ul style="list-style-type: none"> X Dolore cronico X Risposte ansiose X Paura 	
Ipotermia	X
<p>Fattori correlati</p> <p>Situazionali (personali, ambientali)</p> <ul style="list-style-type: none"> X Esposizione a freddo intraoperatorio X Diminuzione della circolazione (per persona sovrappeso/sottopeso, consumo di alcol, disidratazione, inattività) <p>Fasi di sviluppo</p> <ul style="list-style-type: none"> X Inefficacia della termoregolazione secondaria all'età (es. bambino, anziano) 	
Lesione, rischio di	X
<p>Fattori correlati</p> <p>Trattamenti</p> <ul style="list-style-type: none"> X Effetti sulla mobilità/sensorio (sedativi, miorilassanti...specificare) <p>Situazionali (personali, ambientali)</p> <ul style="list-style-type: none"> X Ambiente non familiare (es. Ospedale) 	



Lesione da posizionamento perioperatorio, rischio	X
<p>Fattori correlati</p> <p>Fisiopatologici</p> <ul style="list-style-type: none"> X Aumentata vulnerabilità (per malattia cronica, cancro, corporatura esile, terapia radiante, osteoporosi, compromissione del sistema immunitario, disfunzione renale/epatica, infezione) X Compromissione della perfusione tissutale (per diabete mellito, anemia, ascite, malattia cardiovascolare, ipotermia, disidratazione, vasculopatia periferica, trombosi, edemi) X Vulnerabilità della stomia durante il posizionamento X Contratture preesistenti/alterazioni fisiche (artrite reumatoide, poliomielite) <p>Trattamenti</p> <ul style="list-style-type: none"> X Necessità di posizionamento e perdita delle abituali risposte sensoriali/protettive per anestesia X Procedure chirurgiche della durata di 2 o più ore X Vulnerabilità degli impianti/protesi durante il posizionamento <p>Situazionali (personali, ambientali)</p> <ul style="list-style-type: none"> X Compromissione circolatoria (obesità, consumo di tabacco, gravidanza, neonato, temperatura bassa in sala operatoria, anziano) <p>Fasi di sviluppo</p> <ul style="list-style-type: none"> X Aumentata vulnerabilità alle lesioni tissutali (condizione infantile, età avanzata) 	

Liquidi, eccessivo volume di	X
<p>Fattori correlati</p> <p>Fisiopatologici</p> <ul style="list-style-type: none"> X Compromissione dei meccanismi regolatori (per insufficienza renale acuta/cronica, disfunzioni endocrine, anomalie sistemiche metaboliche) X Iperensione portale, diminuzione della pressione colloidale-osmotica e ritenzione di sodio (per epatopatia, cancro, cirrosi, ascite) X Anomalie venose e arteriose (vene varicose, vasculopatia periferica, Trombosi, flebite, immobilità, linfoedema, infezioni, trauma, neoplasie) <p>Trattamenti</p> <ul style="list-style-type: none"> X Ritenzione di sodio e acqua (terapia corticosteroidea) <p>Situazionali (personali, ambientali)</p> <ul style="list-style-type: none"> X Inadeguato apporto proteico (dieta squilibrata, malnutrizione) X Ristagno venoso declive/venostasi (per immobilità) <p>Fasi di sviluppo</p> <ul style="list-style-type: none"> X Persona anziana: compromissione del ritorno venoso per aumento delle resistenze periferiche e diminuzione dell'efficienza valvolare 	

Liquidi, insufficiente volume di	X
<p>Fattori correlati</p> <p>Fisiopatologici</p> <ul style="list-style-type: none"> X Eccessiva emissione di urine (per diabete mellito insipido, diabete mellito scompensato) X Perdite (febbre, aumento del metabolismo, drenaggio accentuato, ferite, peritonite) 	

Mobilità, compromissione /rischio di	X
<p>Fattori correlati</p> <p>Fisiopatologici</p> <ul style="list-style-type: none"> X riduzione della forza e della resistenza per compromissione muscoloscheletrica (fratture, condizioni cardiache) X rigidità delle articolazioni o contratture X dolore <p>Fasi di sviluppo</p> <ul style="list-style-type: none"> X Persona anziana: diminuzione dell'agilità e debolezza muscolare 	
Nausea	X
<p>Fattori correlati</p> <p>Trattamenti</p> <ul style="list-style-type: none"> X Effetti dell'anestesia 	
Respirazione, inefficace funzionalità, rischio	X
<p>Fattori correlati</p> <p>Fisiopatologici</p> <ul style="list-style-type: none"> X Secrezioni eccessive o dense (per infezione, infiammazione, allergia, patologie cardiopolmonari, fumo) <p>Trattamenti</p> <ul style="list-style-type: none"> X Immobilità (per effetto sedativo di farmaci, anestesia) X Soppressione del riflesso della tosse X Effetti della tracheostomia (alterazione delle secrezioni) <p>Situazionali (personali, ambientali)</p> <ul style="list-style-type: none"> X Immobilità (per intervento chirurgico/ dolore, paura, ansia) 	
Stipsi, rischio di	X
<p>Fattori correlati</p> <p>Fisiopatologici</p> <ul style="list-style-type: none"> X Dolore alla defecazione (per emorroidi) <p>Trattamenti</p> <ul style="list-style-type: none"> X Effetti sulla peristalsi dell'anestesia e della manipolazione chirurgica 	
Stress, sovraccarico psicofisico	X
<p>Fattori correlati</p> <p>Fisiopatologici</p> <ul style="list-style-type: none"> X Necessità di far fronte a condizioni invalidanti, perdite funzionali 	
Trasloco, stress da	X
<p>Fattori correlati</p> <p>Situazionali (personali, ambientali)</p> <ul style="list-style-type: none"> X Trasferimento in sala operatoria X Scarsa/nessuna preparazione per l'imminente spostamento 	

Allegato 3
PROBLEMI COLLABORATIVI PRELEVALEMENTE TRATTATI

 Selezionare (X) le caselle relative ai problemi collaborativi di interesse
 (riferimenti bibliografici: L.J.Carpenito-Diagnosi infermieristiche - 5th. ed. C.E.A. Edizioni, 2010)

Rischio di complicanze (RC) per disfunzione cardiaca/ vascolare	
RC per emorragia	X
RC per riduzione della gittata cardiaca	X
RC per aritmie	X
RC per edema/ embolia polmonare	X
RC per trombosi venosa profonda	X
RC per ipovolemia	X
Rischio di complicanze (RC) per disfunzione respiratoria	
RC per ipossiemia	X
RC per costrizione tracheobronchiale	X
RC per pneumotorace	X
Rischio di complicanze (RC) per disfunzione metabolica/immunitaria/ematopoietica	
RC per ipo/iperglicemia	X
RC per squilibri elettrolitici	X
RC per sepsi	X
RC per acidosi (metabolica, respiratoria)	X
RC per alcalosi (metabolica, respiratoria)	X
RC per reazione allergica	X
Rischio di complicanze (RC) per disfunzione renale / urinaria	
RC per ritenzione urinaria acuta	X
RC per insufficienza renale	X
RC per calcoli renali	X
Rischio di complicanze (RC) per disfunzione neurologica / sensoriale	
RC per astinenza da alcol	X
Rischio di complicanze (RC) per disfunzione gastrointestinale / epatica / biliare	
RC per ileo paralitico	X
Rischio di complicanze (RC) per effetti avversi (EA) della terapia farmacologica	
RC per effetti avversi della terapia con farmaci anticoagulanti	X
RC per effetti avversi della terapia con farmaci antiaritmici	X
RC per effetti avversi della terapia con farmaci antipertensivi	X
RC per effetti avversi della terapia con farmaci betabloccanti	X
RC per effetti avversi della terapia con farmaci diuretici	X

Allegato 4

APPRENDIMENTO OFFERTO

In relazione alle diagnosi infermieristiche / problemi collaborativi sopra indicati, descrivere le opportunità formative per lo studente che caratterizzano la sede di apprendimento.
Esempio: interventi assistenziali infermieristici, modelli organizzativi e/o di presa in carico assistenziale, attività di ricerca e innovazione.

PERCORSO IN CENTRALE STERILIZZAZIONE:

Obiettivi

- Acquisizione di conoscenze relative alla sicurezza ed alla prevenzione e controllo delle infezioni
- Acquisizione di conoscenze del processo di sterilizzazione in autoclavi a vapore.

Modalità operative

- Presentazione dei locali e della loro destinazione d'uso con particolare attenzione al concetto di percorso sporco-pulito.
- Conoscenza delle principali normative / tecniche riguardanti il processo di sterilizzazione
- Acquisizione di conoscenze sullo strumentario base per le procedure chirurgiche.
- Acquisizione di conoscenze per l'utilizzo degli strumenti per la rintracciabilità

Durata percorso: Tirocinio 4 settimane: 2-3 giorni; Tirocinio 5-8 settimane: 3-4 giorni

PERCORSO IN SALA OPERATORIA:

- Conoscere ed utilizzare le principali procedure organizzative della struttura.
- Conoscere l'utilizzo dei principali strumenti operativi, le attrezzature, le tecnologie in uso nella sala operatoria.
- Sviluppare competenze infermieristiche per l'assistenza in sala operatoria per alcuni problemi assistenziali tra quelli descritti, riferiti alla gestione pre-intra e post operatoria.